




1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks  
Sectional Library









I. Born

WILLIAM H. DALL  
SECTIONAL LIBRARY  
DIVISION OF MOLLUSKS






Ignatii a Born Equ.


Academiae Imp. Naturae Curiosorum, Petropolit.  
Londinens. Holmens. Göttingens. Upsaliensis, Londin.  
gothorum, Senens. Monacensis, Burghaus. Pata.  
vinæ nec non Physicorum Bercliniensium Sodalit.

INDEX  
Rerum Naturalium  
Musei  
Cesarei Vindobonensis  
Pars I.<sup>ma</sup>  
Testacea

Verzeichniß  
Der natürlichen Seltenheiten  
des k.k.  
Naturalien Cabinets  
zu Wien  
Erster Theil  
Schalthiere

Vindobonæ, ex Officina Krausiana. 1778.





## AD LECTOREM.

*Si publicas rerum naturalium collectiones  
opportuna atque efficacia ad dilatandam  
bistoriae naturalis cognitionem subsidia esse  
conuenit, finis hic nulla alia ratione obti-  
netur, quam si cuiusvis naturae scrutatori  
aditus aperiatur ad ea ex thesauris istis de-*

\*

*pro-*

## AD LECTOREM.

*promenda, quae siue ad vniuersale aliquod systema concinnandum, perpoliendumue, siue ad singulares obseruationes instituendas vsui ipsi esse possunt.*

*Patent quidem Musea rerum naturalium passim curiosorum conspectui, & quidquid in iis rarum & singulare admirandum est, a Praefectis diligenter ostenditur. At vero si perpendimus, quam velocibus, & quasi fugientibus oculis, totum hunc corporum naturalium apparatus, ob temporis, quod ei exhibendo definitum est, angustias, percurrere oporteat; quam exigua mora in hoc illoue corpore, quod animaduer-*

*uer-*

## AD LECTOREM.

*uersionem nostram maxime excitat, obtutum attentionemque defigere liceat; quam raro singulae partes naturali & continua serie sua exhiberi possint, ac demum quam plena molestiae tardique eorum, qui Museis istis praesunt, sit occupatio, eandem, ut ajunt, crabem fere quotidie recoquere, operamque suam saepius apud homines scientiae naturalis prorsus ignaros & magis curiositati suae, quam scientiae amplificandae studio seruientes perdere; facile profecto videbimus: Musea haec semper aliena fore a proposito, donec res naturales iis contentae accurate describantur, atque ea*

## AD LECTOREM.

*ratione ad notitiam manusque omnium, qui  
iisdem uti volent, perueniant. Sane si-  
ne tali instituto pretiosissima licet & varif-  
sima naturae cimmelia exteris maximam  
partem incognita, indigenis vero inutilia  
remanere necesse est.*

*Id animo reuoluens AVGVSTA on-  
stra, non patriae tantum, sed & scien-  
tiarum artiumque Mater, cuius gloriosif-  
simi, sapientissimique imperii haec aeterna  
& peculiaris erit memoria, prouidisse ip-  
sam singulari sollicitudine omnia, quaecum-  
que ad institucendos excolendosque subdito-  
rum animos conducere valeant, locupletif-  
si-*

AD LECTOREM.

*simum ac pretiosissimum rerum natura-  
lium thesaurum, qui in palatio Caesa-  
reo Viennae adservatur, quemque FRAN-  
CISCO Augusto, Diuo illius Conjugi,  
sagacissimo rerum istarum aestimatori,  
conquisitorique solertissimo, acceptum re-  
ferimus, publici juris facere, atque ad id  
peragendum opera mea — quamvis praeter  
meritum — uti decrevit. Parui, ut par  
erat ILLIUS mandato, atque una cum ex-  
quisitis artificibus operi concinnando, exor-  
nando, perficiendoque illico manus admo-  
ui, cuius Volumen primum propediem typis  
exscriptum prodibit in lucem.*

*Quo-*

## AD LECTOREM.

Quoniam vero neque omnes officii mei partes exsecutus, neque totam beneficentiae *AVGVSTAE* amplitudinem complexus videri poteram, si diligentiam meam soli illi operi adornando impenderem, majoris utpote pretii, quam ut a quolibet historiae naturalis studioso comparari possit, ad indicem hunc, facile cuius parabilem, conscribendum, animum adjeci. Is enim & iis, quibus Museum hoc Caesareum videndi est facultas, quidquid eodem continetur, intento velut digito commonstrabit, & aliis, qui alibi degunt, scientiae naturalis cultoribus, baud mediocri adjumento erit.

Ni-

AD LECTOREM.

*Nil aliud Indici huic inferi poterat, nisi quod re ipsa in Museo nostro reperitur. Vnde & corpora eodem contenta non secundum novum quodpiam, a me fortasse condendum systema, sed secundum aliquod ex his, quae jam ab aliis constituta habemus, disponi oportebat. Qua re & illa difficultate me expediui, qua naturalis historiae scriptores in novis novarum rerum nominibus apte imponendis passim implicantur.*

*In prima hac parte, quae Conchyliorum indicem exhibet, diligenti omnium prope Conchyliographorum instituto examine, mag-*

AD LECTOREM.

*ni Linnaei systema secutus sum, propterea :  
quod omnium, quae adhuc extant — quid-  
quid alii obloquantur — sit absolutissimum ;  
quod characteres generum, familiarum, spe-  
cierumque singularum, quoad in systemate,  
quod sola testarum figura nititur, fieri po-  
tuit, accuratissime designet ; quodque tam-  
diu praestantiam suam, auctoritatemque  
tuebitur, donec Adansonii, Basteri, Otto-  
nes Mülleri consequentium seculorum, stu-  
dio, sagacitate & industria Svammerda-  
mii, Bradleii, Pouparti, & Reaumurii  
animati, accuratam descriptionem formae,  
partium, generis, vivendique rationis, quae*

## AD LECTOREM.

unicuique testaceorum animalium propria sunt, praebeant; ut tandem genuinum Conchyliorum systema naturale, aut saltem ad naturam proxime accedens constitui possit.

Linnaei igitur, ut dixeram, systema secutus, nequaquam tamen presse adeo vestigiis ipsius institi, ut non interdum generum ac specierum definitiones ab ipso propositas distinctius enarrare, & si dicere fas est, emendare ausus fuerim. Neque non conatus sum, singulas Concharum partes decentioribus nominibus insignire; figuras a Linnaeo commemoratas rectius indicaui, du-

bias

AD LECTOREM.

*lias omisi, easque ex recentioribus Conchyliologis supplui, parum curans: quid teutonica Linnaeani systematis editio, Index Linnaeanus in Knorrjana Conchyliographia, & Jo. Sam. Schröterus in Bibliothecae lithologico conchyliographiae Tomo IV. peccauerit.*

*Eas Conchyliorum species, quas Linnaei systema haud complectitur, methodo, summo huic viro usitata, descripsi, illis familiis, quibus procul dubio ipse easdem inserturus erat, singulas inserui, notas omnes characteresque fusius declaravi, &*  
*ad*

A D L E C T O R E M.

*ad accuratas earundum effigies, quae in maiori opere comparebunt, prouocauit.*

*Denique singulorum testaceorum nomina triuialia, quibus gallica, anglica & belgica lingua compellantur, ex optimis harum nationum scriptoribus adjeci; generaque, familias, species, & varietates eorum, quae hoc indice continentur, apposita alphabeti littera distinxi, ut ii, qui Museum lustraturi sunt, omnia facilius inueniant.*

*Eadem methodo & in aliis thesauri hujus Caesarei rerum naturalium Classibus describendis progrediar, quarum quidem*  
*ma-*

AD LECTOREM.

*maturationem , tametsi pluribus aliis negotiis destinear , tanto certius polliceri audeo , quod Viri doctissimi Georgii Sebastiani Helbling de Hirzenfeld , qui pro singulari , qua in rerum naturalium cognitionem fertur , studio , eximiam hoc in genere doctrinam sibi comparavit , amica opera me non parum adjuvari hic gratus profitear.*

# An den Leser.

Sollen öffentliche Naturaliensammlungen wirksame Hilfsmittel zu Erweiterung der Kenntnisse in der Naturgeschichte seyn, so wird dieser Entzweck nur dadurch erreicht, wenn jedem Naturforscher Gelegenheit verschafft wird, aus diesen Behältnissen natürlicher Seltenheiten die erforderlichen Materialien herzuholen, deren er etwann zur Darstellung eines allgemeinen Natursystems, zur Vervollkommnung desselben oder zu seinen einzelnen Beobachtungen bedarf. Zwar

\* \*

ste

An den Leser.

stehen die meisten Naturalien Kabinete dem  
Wißbegierigen offen , und werden von den  
Vorstehern derselben vorgezeigt. Wenn man  
aber weiß , wie flüchtig man meistens in dem  
kurzen Zeitraume , der zu diesen Vorzeigungen  
bestimmt ist , den ganzen Vorrath natürlicher  
Körper durchzugehen gezwungen werde ; wie  
wenig man sich bei einem oder dem andern Ge-  
genstände , welcher etwann unsre Aufmerksam-  
keit mehr reizet , verweilen dürfe ; wie selten  
alle einzelne Stücke in ihrem Zusammenhange  
vorgezeigt werden können ; wie unangenehm  
es den Vorstehern dieser Sammlungen fallen  
müsse , eine und eben dieselbe Sache fast täg-  
lich

## An den Leser.

lich zu wiederholen , und ihre Mühe öfters an Leute zu verschwenden , welche ohne alle Vorbereitung und Kenntniß in diesem Fache mehr aus Neugierde , als aus Verlangen sich zu unterrichten herbeigelockt werden ; und daß endlich bei derlei Anstalten dennoch immer diese Schätze der Natur dem auswärtigen oder entfernten Gelehrten verborgen bleiben ; so wird man sich leicht überzeugen , daß der Hauptzweck , welcher die Errichtung öffentlicher Naturalienkabinete veranlasset hat , in so lang verfehlet werde , bis diese nicht durch eine vollständige Beschreibung aller einzelnen Theile derselben allgemein bekannt gemacht und

## An den Leser.

auf diese Art gleichsam in die Hände eines jeden, der solche benützen kann, gebracht werden.

Unsere erhabene Monarchinn, deren weiseste Regierung sich durch eine unumschränkte Sorgfalt für alles, was zum Unterrichte und zur Aufklärung ihrer Unterthanen beitragen kann, vorzüglich auszeichnet, hat aus diesen Beweggründen die öffentliche Bekanntmachung des k. k. Naturalienkabinetts, dessen Entstehung und Daseyn wir Allerhöchst Ihrem vereinigten Gemahl verdanken, anzubefehlen, und diese Arbeit — wieder meine Verdienste — mir aufzutragen geruhet, an welche sowohl ich, als die zur Vervollkommnung und Verschönerung

die-

dieses Werks ausersehenen Künstler unverzüglich Hand angelegt haben; so daß wir im kurzen den ersten Band der Beschreibung des **K.K. Naturalienkabinets zu Wien** herauszugeben, im Stande seyn werden.

Vielleicht würde ich aber meiner Pflicht und der allerhöchsten Absicht nicht ganz Genüge leisten, wenn ich mich bloß auf jene kostbare Ausgabe, die ihres höhern Preises wegen nicht gemeinnützig genug werden dürfte, einschränken sollte. In dieser Rücksicht habe ich das gegenwärtige, minder kostbare Verzeichniß entworfen, welches jenen, die dieses Cabinet selbst zu besehen Gelegenheit haben, zu einem

## An den Leser.

Handbuche dienen, den von dieser Hauptstadt entfernten Naturforschern aber immer noch einen zureichenden Begriff von den darinn befindlichen Seltenheiten geben kann.

Da ich in diesem Verzeichnisse bloß diejenigen natürlichen Körper, welche sich wirklich in diesem Kabinete befinden, anführen darf, so folgt aus diesem Umstande, daß ich solches nach keinem eigenen Systeme, welches immer sehr unvollkommen ausgefallen seyn würde, ordnen konnte, sondern hiezu eines der schon bekannten Systeme wählen mußte, wodurch ich zugleich der unvermeidlichen Schöpfung neuer

Benennungen , welche das Studium der Naturgeschichte so sehr erschweren , auswich.

Bei diesem ersten Theile , welcher das Verzeichniß der Konchylien enthält , habe ich nach einer sorgfältigen Prüfung der meisten Konchylien Werke das Linneische System gewählt , weil es , was man auch immer dagegen einwenden mag , unter den bisher bekannten , das vollständigste ist , die unterscheidenden Kennzeichen der Geschlechter , Abtheilungen und Arten — so viel es sich in einem künstlichen Systeme , welches sich bloß auf die Gehäuse der Schalthiere gründet , thun läßt — am richtigsten und bündigsten angiebt , und diesen

## An den Leser.

seinen Vorzug in so lang behaupten wird; bis uns nicht die Adansone, Bastere, und Otto Müllere der künftigen Zeiten, mit dem Scharfsinn dem Beobachtungsgeist und der Genauigkeit eines Swammerdams, Bradley, Poupert, und Reaumur ausgerüstet, die vollständige Beschreibung der Gestalt, Theile und Lebensart eines jeden Schalthieres liefern werden, um alsdenn ein natürliches, oder der Natur sich mehr näherndes Konchyliensystem zu erbauen.

So pünktlich ich nun in dieser Beschreibung der Konchylien, der Linneischen Ordnung und Eintheilung nachgegangen bin, so habe ich dennoch meinem Führer nicht so knechtlich folgen

gen

gen wollen, daß ich mir nicht hätte erlauben  
sollen, die meisten Bestimmungen seiner Ge-  
schlechter und Arten deutlicher zu erklären,  
und — wenn ich mich so was zu sagen er-  
kühnen darf — vielleicht zu verbessern. Auch wag-  
te ich es die Benennungen der einzelnen Theile  
der Muscheln anständiger auszudrücken; dann  
berichtigte ich die von Linne angeführten Figu-  
ren, ließ die zweydeutigen hinweg, und er-  
gänzte dieselben aus den neuern Konchyliologen,  
ohne mich durch die Deutsche Ausgabe des Linnei-  
schen Natursystems, und durch die Linneischen  
Register in dem Knorr'schen Konchylienwerke,  
und in dem vierten Bande des Schröter'schen

## An den Leser.

rischen Journals für die Liebhaber des Steinsreichs und der Konchyliologie irre führen zu lassen.

Diejenigen Konchylien, welche in dem Linneischen Systeme nicht enthalten sind, beschrieb ich nach dieses berühmten Systematikers Methode, ordnete sie in jene Familien, wohin er sie vermuthlich selbst gesetzt haben würde, erklärte sie durch eine weitläuftigere Beschreibung ihrer Kennzeichen, und berief mich auf die Abbildungen, welche wir in der Beschreibung des k. k. Kabinetts sowohl von diesen als von allen jenen, die bisher in keinem Konchylienswerke

## An den Leser.

werke gemälet, oder etwan nicht gut gemälet sind, liefern werden.

Endlich habe ich die holländischen, französischen und englischen Trivialnamen aus den bessern Schriftstellern einer jeden Nation hinzugefügt, und die in diesem Verzeichnisse enthaltenen Geschlechter, Unterabtheilungen, Arten und Abarten mit einem nach alphabetischer Ordnung hinzugesetzten Buchstaben bezeichnet, um denjenigen, welche dieses Kabinet besuchen, die Auffindung der Stücke, die sie etwann vorzüglich zu sehen wünschen, zu erleichtern.

Nach diesem Plane werde ich in der Beschreibung der übrigen Theile dieser kais. Sammlung

lung


An den Leser.

lung fortschreiten ; deren baldige Vollendung ich — ungeachtet meiner übrigen Beschäftigungen — um so gewisser versprechen darf, da mir diese Arbeit durch die freundschaftliche Mitwirkung des Hrn. Helbling von Hirzenfeld — eines Mannes der von einem seltenen Hange zur Naturgeschichte hingerissen, diese Wissenschaft, in welcher er sich die ausnehmendsten Kenntnisse erworben hat, sein einziges Geschäft seyn läßt, treflich erleichtert wird.




# EXPLICATIO

## CITATIONVM ABBREVIATARVM.



### Erklärung der angeführten Verkürzungen.



*Adans. Seneg.* Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages par M. Adanson, avec des figures. a Paris 1757. 4.

*Argenv. Conch. Zoom.* L'histoire naturelle éclaircie dans une des ses partie principales la Conchyliologie, augmentée de la Zoomorphosie; nouvelle edition, avec des figures en taille douce, par M. (Argenville) a Paris 1757. 4.

*Aldrov. Test.* Ulyssis Aldrovandi de exanguibus. Libri quatuor &c. cum figuris, Bononiae 1642. fol.

*Bast. Subf.* Jobi Basteri Opuscula subseciva, Tomus I. & II. cum Figuris, Harlemi 1762. 1765.

*Bell.*

## EXPLICATIO

*Bell. aq. Petr.* Bellonii de aquatilibus, cum figuris  
Parif. 1553. fol.

*Berlin. Mag.* (Hrn. D. Martini) Abhandlung von  
Erdschnecken mit Kupfern im II. und III. Ban-  
de des berlinifchen Magazins. Berlin 1766. 8.

— — (Ebendes.) Abhandl. von Conchylien der füßen  
Wäſſer, mit Kupfern im IV. Bande des Ber-  
linifchen Mag. 1767.

*Bonan. Mus. Kirch.* Museum Kircherianum a Philip-  
po Bonnano S. I. cum figuris, Romae 1709.  
fol.

*Brown. Hiſt. Jam.* The civil and natural history  
of Jamaica with figures, by Patrik Browne.  
London 1756. fol.

*Chem. Naturf.* Herrn Paſt. Chemnitz Abhandlung  
von dem innern Wunderbau mancher Schne-  
cken, mit einer ausgemalten Kupfertafel im  
IX. Stücke des Naturforſchers. Halle 1776. 8.

*Column. purp.* Fabii Columnae opusculum de Pur-  
pura cum figuris. Kiliae 1675. 4.

*Da Coſt. Elem.* Elements of Conchology by Emanuel  
Mendes Da Coſta with ſeven illuminated Pla-  
tes. London 1776. m. 8.

*Dav.*

CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Dav. Cat. syst.* Catalogue systématique , & raisonné de Curiosités de la nature , & de l'art , qui composent le cabinet de M. Davila. avec figures en taille douce. Tome I. a Paris 1776. 8.

*Ellis. Transact.* An Account of several rare species of Barnacles in a Letter from. John Ellis. with figures, in the philosophical Transactions. Vol. L. Part. II. for the Year 1758. Wittenberg. 1771. 4.

*Fav.* Dictionnaire d'histoire naturelle, qui concerne le testacées ou les coquillages de Mer , de terre , & d'eau-douce par M. l'Abbé Favart d'Herbigny. Tome I. — III. a Paris 1775. 8.

*Geof.* Traité sommaire des coquilles tant fluviatiles, que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris par M. Geoffroy. a Paris 1767. 12.

*Gev. Belust.* Monatliche Belustigungen im Reiche der Natur an Conchylien und Seegewächsen mit illuminirten Kupfern. Hamburg 1755. gr. 4. mit deutsch und französischen Text.

*Ginan. adr.* Opere postume del Conte Giuseppe Ginanni Ravennate con figure. Tomo II. in Venezia 1757. fol.

*Gualt.*

## EXPLICATIO

*Gualt. Test.* Index testarum conchyliorum , quae  
adservantur in Museo Nicolai Gualtieri cum  
tabulis aeneis. Florentiae 1742. fol.

*Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm.* Georg. Sebast.  
Helblings Beiträge zur Kenntniß neuer und  
seltener Conchylien mit Kupfertafeln, im IV.  
Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft  
in Böhmen. 1778. gr. 8.

*Hill. Hist. of. Anim.* An History of Animals illustra-  
ted with figures. by John Hill. London 1752.  
fol.

*Klein Meth. Ostr.* Jac. Theod. Klein Tentamen  
methodi ostracacologicae cum figuris. Lugd.  
batav. 1753. 4.

*Knor. Del. Nat.* Deliciae naturae , von Georg  
Wolfg. Knorr , mit deutschen und französischen  
Text und ausgemalten Kupfertafeln. I. Theil.  
Nürnberg 1766. gr. fol.

*Knor. Vergn.* Vergnügen der Augen und des Ge-  
müthes in Vorstellung einer Sammlung von  
Schnecken und Muscheln , mit ausgemalten  
Kupfertafeln I. — VI. Theil. Nürnberg. 1757 —  
1772. 4.

CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Koelr. nov. com. petr.* Descriptio tubiporae maris albi indigenae, auctore J. T. Koelreuter cum tabulis aeneis in nouis commentariis academiae scientiarum petropolitanae. Tom. VII. Petropoli 1761. 4.

*Linn. S. N. Car.* a Linné Systema naturae, editio duodecima. Holmiae 1766. Tom. I. m. 8.

*Linn. It. vvestg.* Karl von Linne Reisen durch einige schwedische Provinzen II. Theil, welcher die Reise durch Westgothland enthält. mit Kupfern. Halle 1765. gr. 8.

*List. angl.* Martini Lister, Historiae animalium angliae tres tractatus, unus de araneis, alter de cochleis tum terrestribus tum fluuiatilibus, tertius de cochleis marinis. cum figuris. Londini 1678. 4.

*List. Hist. Conch.* Martini Lister, Historiae conchyliorum liber I — IV. Volumina duo cum tabulis aeneis, Londini 1685 — 1688. fol.

*Mart. berlin.* Beschaeft. Konchyliologische Rhapsodien von Friedr. Heinr. Wilh. Martini; im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, mit gemalten Kupfern. Berlin 1776. gr. 8.

Ebendesselben — Zwoschalige Konchylien überhaupt beschrieben; mit ausgemalten Kupfern im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1777. gr. 8.

\* \* \*

*Mart.*

# EXPLICATIO

*Mart. Konch. Kab.* Neues systematisches Konchylienkabinet von Friedr. Heintz. Wilh. Martini, I — IV. Band mit illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1769 — 1778. 4.

*Müll. Linn. Naturf.* Von Linne vollständiges Natursystem aus dem Lateinischen von Phil. Ludw. Statius Müller mit Kupfern. VI. Th. 1. Band. Nürnberg 1775. gr. 8.

*Müll. Hist. Verm.* Vermium terrestrium & fluviatilium succincta historia auctore Othon. Friderico Müller. Volumen II. Havniae 1774. 4.

*Müll. Zool. dan.* Zoologiae danicae icones editae ab Othone Friderico Müller. Fasciculus I, Hafn. 1777. fol.

*Murr. Fund. Test.* Fundamenta testaceologiae auctore Adolpho Murray. Upsaliae 1771. 4.

*Mus. Caes. Vindobon.* Museum Caesareum Vindobonense jussu MARIAE THERESIAE Augustissimae edidit Ignatius Eq. a Born latine & germanice cum tabulis pictis. Beschreibung des kais. kön. Naturalienkabinetts auf Befehl Ihrer Majestät der Kaiserinn Königin herausgegeben von Ignaz Edlen von Born, mit ausgemalten Kupfertafeln, deutschen und lateinischen Text. Wien 1779. fol.

*Mus.*

# CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Mus. Olear.* Adami Oleari Museum gottorpiense.  
cum figuris. Schleßv. 1674. 4.

*Mus. Tessin.* Museum Tessinianum opera Comit-  
tis Car. Gust. Tessin. latine & suecice, cum  
tabulis aeneis Havniae. 1753. fol.

*Mus. Worm.* Museum Wormianum seu Historia  
rerum tam naturalium, quam artificialium &c.  
adornata ab Olao Worm, cum iconibus. Lugd.  
batav. 1655.

*Petiv. Gaz.* Jacobi Petiveri Opera ad historiam  
naturalem spectantia. containing Gazophyla-  
cium naturae & artis &c. with figures. Vo-  
lume I. London 1712 — 1767. fol.

*Petiv. amb.* Aquatiliū animalium amboinae &c.  
icones & nomina with their latin, englisch,  
and native names, and figures by James Pe-  
tiver, London 1713. fol.

*Planc. Conch.* Jani Planci de conchis minus notis.  
Venetiis 1739. 4.

*Reaum. Mem. de Paris.* De differentes manieres  
dont plusieurs especes d'animaux de mer s'attr-  
achent au sable, aux pierres & les uns aux au-  
tres par M. de Reaumur — Decouverte d'une

## EXPLICATIO

nouvelle teinture de Pourpre &c. avec figures, par le meme, dans l'histoire de l'academie royale de sciences de l'année 1711. a Amsterdam 1715. 12.

*Regenf. Samml.* Sammlung von Muscheln, Schnecken und andern Schalthieren auf Befehl unserer Königl. Majestät von Dänemark etc. mit deutschen und lateinischen Text, und illuminirten Kupfertafeln gezeichnet und gestochen, von Franz Michael Regensfuß. Kopenhagen 1758. Regalsfolio. Ou Recueil de coquillages, de Limaçons, & de crustacés par ordre de Sa Majesté le Roi de Danemark gravés en taille douce, & illuminés de couleurs naturelles par Franc. Mich. Regensfuß, avec le text françois & allemand. Coppenhague 1758. fol. royal.

*Rondel. Test.* Guil. Rondelerii universae aquatiliū historiae pars altera, cum figuris, folio transverso. Lugd. 1555. fol.

*Rumph. amb.* Georg Ebeh. Rumph's amboinische Raritätenkammer von den steinschalichten Thieren, mit Kupfertafeln, aus dem Holländischen übersezt von Ph. Ludw. Statins Müller, und mit Zusätzen vermehret von Joh. Hieron. Chemnitz. Wien 1766. fol.

*Schlott.*

*Schlott. Act. helv.* Obseruatio physica de cochleis quibusdam, nec non de turbinibus nonnullis &c. Philipp. Jac. Schlotterbeccii, cum figuris aeneis in actis helveticis physico medicis. Volum. V. Basil. 1762. 4.

*Schroet. Erd.* Versuch einer systematischen Abhandlung über die Conchylien um Thangelstadt von Joh. Sam. Schröter m. K. Berlin 1771. 8.

*Seb. Thes.* Lucupletissimi rerum naturalium thesauri descriptio (idiomate latino & belgico) cum iconibus Albert. Seba. Tomus III. Amstelod. 1757. fol. Regal.

*Spengl. Berlin. Beschæft.* Beschreibung einer besonders schönen Korallenmuschel mit einer ausgemalten Abbildung. im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin 1775. 8.

*Ebendesselben.* Beschreibung einer seltenen Dünnmuschel mit ausgemalten Figuren, im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1776. 8.

*Swammerd. Bibl. nat. Jo.* Swammerdam Biblia naturae seu historia insectorum in classes redacta, idiomate latino & belgico, cum tabulis aeneis. Lugdun. bat. 1737 — 1738. fol.

*Valent. Abb.* Franz Valentyns Abhandlung von Schneckenmuscheln und Seegewächsen um Amboina aus dem Holländischen übersetzt von Phil. Ludw. Stätius Müller mit Kupfern. Wien 1773. fol.

*Walch. Naturf.* Beschreibung einiger Conchylien von Emanuel Walch, mit ausgemalten Figuren im achten Bande des Naturforschers. Halle 1776. 8.




# PARTEſ CONCHARVM

## NONNVLLAE EXPLICATAE.

---

### E r f l ä r u n g

einiger Benennungen der Theile an Muschel-  
schalen.



**C**ARDO, Pars ambitus, vbi  
valvae coherent.

**D**as Schloß ist derjenige  
Theil des Umfanges, an wel-  
chem die Klappen aneinander  
passen.

**L**ATVS cardinis, ANTI-  
CVM ; huicque oppositum  
POSTICVM vocatur.

Die Seite am Schlosse  
heißt die vordere ; die entge-  
gengesetzte die hintere Sei-  
te.

**L**IGAMENTVM, Hymen  
*Linn.* Membrana cartilaginea  
valvas connectens.

Das Band ist die knorpe-  
lige Haut, welche die Klap-  
pen mit einander verbindet.

**A**REA ANTICA. *Vulva*  
*Linn.* Regio extra liga-  
mentum ; quae si introrsum  
declivis sit SINVS audit.

Die Vorderfläche ist die  
Gegend außer dem Bande  
und heißt, wenn sie einwärts  
abhängig ist eine Vertiefung.

**LABIA EXTERNA** *Labia Linn.* ea vocantur, quae extra ligamentum locata sunt.

Die äußeren Lefzen heißen diejenigen welche außer dem Bunde stehen.

**LABIA INTERNA**, *Nymphae Linn.* sunt labella intra ligamentum, & cum eo devincta.

Die inneren Lefzen heißen diejenigen kleineren Lefzen, welche inner dem Bunde stehen, und mit demselben verbunden sind.

**VMBONES**, *Protuberantiae ventricosae valvae cuiusvis extra cardinem.*

Die Backen sind die häufigen Erhöhungen einer jeden Klappe außer dem Schlosse.

**APEX**, *Nates Linn.* *Protuberantiae cuiusvis finis attenuatus.*

Die Spitze ist das Ende in welches sich jede verdünnte Backe verlängert.

**RIMA**, *Hiatus a ligamento reclus.*

Die Spalte ist die Oefnung, welche von dem Bunde gedeckt wird.

**AREA POSTICA** aut **AREOLA**, *Anus Linn.*

Die Hinterfläche heißt die der Vorderfläche entgegengesetzte Seite.



# GENERA TESTACEORVM.

METHODO LINNEANA.

---

## Geschlechter der Schalthiere

nach Linneischer Ordnung.

### MVLTIVALVIA.

### Vielflappige.

	Pag.		Seite.
A. Chiton.	1.	A. Die Käfermuschel.	1.
B. Lepas.	2.	B. Die Meereichel.	2.
C. Pholas.	7.	C. Die Steindattel.	7.

### BIVALVIA.

### Zweiflappige.

D. Mya.	10.	D. Die Klafmuschel.	10.
E. Solen.	13.	E. Die Messerscheide.	13.
F. Tellina.	17.	F. Die Tellmuschel.	17.
G. Cardium.	27.	G. Die Herzmuschel.	27.
H. Mastra.	39.	H. Die Korbmuschel.	39.
I. Donax.	40.	I. Die Stumpfmuschel.	40.
K. Venus.	43.	K. Die Venusmuschel.	43.
L. Spondylus.	63.	L. Die Klappmuschel.	63.
M. Chama.	65.	M. Die Gienmuschel.	65.
N. Arca.	72.	N. Die Arche.	72.

O. Ostrea.

	Pag.		Seite.
O. Ostrea.	80.	O. Die Muschel.	80.
P. Anomia.	101.	P. Die Bastardmuschel.	101.
Q. Mytilus.	106.	Q. Die Mießmuschel.	106.
R. Pinna.	115.	R. Die Steckmuschel.	115.

### VNIVALVIA.

		Einschalige.	
A. Argonauta.	119.	A. Der Segler.	119.
B. Nautilus.	121.	B. Die Kammer Schnecke.	121.
C. Conus.	123.	C. Die Zutenschnecke.	123.
D. Cypraea.	155.	D. Die Porzellanschnecke.	155.
E. Bulla.	183.	E. Die Blasenschnecke.	183.
F. Voluta.	195.	F. Die Falten Schnecke.	195.
G. Buccinum.	228.	G. Das Rinkhorn.	228.
H. Strombus.	264.	H. Die Flügelschnecke.	264.
I. Murex.	282.	I. Die Stachelschnecke.	282.
K. Trochus.	330.	K. Die Kräuselschnecke.	330.
L. Turbo.	345.	L. Die Mondschnecke.	345.
M. Cornu. *	371.	M. Die Hornschnecke *	341.
N. Helix.	372.	N. Die Schnirkelschnecke.	372.
O. Nerita.	410.	O. Die Schwimmschnecke.	410.
P. Haliotis.	427.	P. Die Ohrschnecke.	427.
Q. Patella.	430.	Q. Die Napf schnecke.	430.
R. Dentalium.	448.	R. Die Zahnschnecke.	448.
S. Serpula.	452.	S. Die Röhrenschnecke.	452.

TE-

\* Vide tab. huius indicis.

\* Sieh die Tafel dieses Verzeichnisses.

# TESTACEA.

## Schalthiere.

Ordo primus. Erste Ordnung.

Multivalvia.

Vielflappige.

A. Chiton.

A. Die Käfermuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 300.*

Valvae plures longitudinaliter digestae, dorso incumbentes.

Die Schale bestehet aus mehreren, nach der Länge des Rückens hintereinander liegenden Klappen.

A. 1. Chiton squamosus.

A. 1. Die schuppige Käfermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 5.*

Testa octovalvi carinata; valvulis oblique angulatis, striatis, corio squamato.

Die acht Klappen der Schale sind oben keilförmig, der Quere nach eckig, und gestreift, mit einer schuppigen Haut.

*Petiv. Gaz. t. I. f. 3. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

A. 2. Chiton cinereus.

A. 2. Die kleine Käfermuschel.

A

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 8.*

Testa ovali obtuse carinata, planiuscula, cinerea. Die etwas flache aschengrau gefärbte Schale hat einen stumpfen Rücken, und bestehet aus acht Klappen.

*Insidens ostreae eduli L.*

Sie sitzt auf einer gemeinen Muschel.

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. II.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. Lepas.

B. Die Meereichel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 301.*

Valvae plures inaequales, per paria opposita affixae. Die festsetzende Schale bestehet aus mehreren ungleichen, einander paarweise entgegen gesetzten Klappen.

B. 1. Lepes Balanus.

B. 1. Die große Meereichel.

*Linn. S. N. Sp. 10.*

*Belg. Zee puitten. Gall. Gland de Mer Tulipe. Dav. Angl. The common english Barnacle. Ellis.*

Testa conica truncata, valvis longitudinaliter sulcatis; areis interjectis transverse striatis. Die kegelförmige oben abgestuzte Schale hat nach der Längsrichtung gefurchte Klappen, und in die Quere gestreifte Zwischenflächen.

Oper.

DSI



Operculum valvulis quatuor,  
binis conniuentibus, unguicula-  
tis, altioribus; binis transuerse  
falcatis, minoribus.

Der Deckel besteht aus vier klei-  
nen Klappen, deren zwei, die un-  
ter einem Winkel zusammenstoßen,  
klauenförmig und höher; zwei aber  
in die Quere gefurchet, und klei-  
ner sind.

Inſidet Musici deſpecto.

Sie ſißt auf einer nordiſchen  
Spindel feſt.

*Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 286.*

*Ellis. Tranſact. angl. 1758. t. 34. f. 17.*

*Baſter. Subs. t. 12. f. 7 — 10.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. 2. *Lepas balanoides.* B. 2. Die Seepocke.

*Linn. S. N. Sp. 11.*

*Belg. Zee pocke. Gall. Glands de mer rayés. Dav. Angl. The nar-  
row mouth'd grey Balanus Hill.*

Testa conica truncata, va- Die kegelförmige abgeſtuzte  
luis glabris, operculis obtusis. Schale hat glatte Klappen,  
und ſtumpfe Deckeln.

*Liſt. angl. t. 5. f. 41.*

— *Hiſt. Conch. l. 3. f. 287.*

*Klein. Meth. Oſtrac. t. 12. f. 94. 95.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. D.*

*Hill. Hiſt. of. Anim. 11. Pl.*

*Da Coſt. Elem. Pl. 1. f. 12.*



B. 3. *Lepas Tintinabulum*.

B. 3. Die Meertulpe.

*Linn. S. N. Sp. 12.*

*Belg.* Tulpen; *Rumph. Angl.* The great wide mouth'd Balanus.  
*Hill. Gall.* Gland de mer *Turban. Dav.*

Testa conica, gibba, arcis  
transuerso striatis.

Die kegelförmige ungleiche  
Schale hat in die Quere ge-  
streifte Zwischenflächen.

α coloris rosei.

α rosenfarbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β ex rosea violacea.

β rosenfarbig und violett.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 285.*

*Rumph. amb. t. 41. f. A.*

*Gualt. Test. t. 106. f. H.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. 34. Pl. 8. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. A.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 11.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 6. f.*

— — V. 30. t. 1. f.

B. 4. *Lepas Diadema*.

B. 4. Die Wallfischpote.

*Linn. S. N. Sp. 13.*

*Belg.* Zeefcheilling. *Rumph. Angl.* The wrinkled Star-Cake. *Petiv.*  
*Gall.* Pou de Baleine. *Dav.*

Testa



Testa subcylindrica, valvis Die etwas walzenförmige  
longitudinaliter sulcatis, costis Schale hat nach der Länge ge-  
decussatim, areis transverse furchte Klappen, mit kreuz-  
striatis, weise durchschnittenen Ribben,  
und in die Quere gestreiften  
Zwischenflächen.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 288.

Petiv. amb. t. I. f. II.

Rumph. amb. Rarit. K. t. 14. f. H.

Gualt. Test. t. 160. f. Q.

Mus. Caes. Vindobon.

B. 5. Lepas testudina-  
ria.

B. 5. Die Schildkrö-  
tenpocke.

Linn. S. N. Sp. 14.

Belg. Schildpa de Luis. Rumph. Angl. The tortoise-wart Barnacle.  
Ellis. Ital. Ballano, Gin.

Testa suborbiculari plano- Die scheibenrunde, unten fla-  
convexa laevi, intus lamellis che, oben erhabene und platte  
ferrulatis; areis excavatis, Schale hat inwendig gezähnel-  
transverse fulcatis, te Blättchen, und ausgehöhl-  
te nach der Quere gefurchte  
Zwischenflächen.

Operculum valvis sex, binis ho- Der Deckel besteht aus sechs  
rizontalibus, quatuor erectis, ob- kleinen Klappen, davon zwei wa-  
tus, conniuentibus, rima supera recht, vier stumpfe aber, auf-  
longitudinali. richtet gegen einander geneigt stehen,  
und in die Höhe eine nach der Län-  
ge laufende Spalte bilden.



*Bonan. Mus. Kirch. cl. I. f. 36.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 9.*

*Rumph. amb. 40. t. K.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 2. 3.*

*Gualt. Test. t. 106. f. M. N. O.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 12. f. 99.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. t. 34. f. 12. 13.*

*Ginan. adr. II. t. 30. f. 175.*

*Knor. Vergn. III. 30. t. 3. 4. f.*

B. 6. *Lepas anatifera*,

B. 6. Die Aentenbrut.

*Linn. S. N. Sp. 18.*

*Holl. Ende Schulpe. Angl. The goose Schell. Hill. Gall. Conque anatifere Dav. Ital. Conca anatifera, Gin.*

Testa compressa quinqueval-  
vi laeui, affixa intestino mem-  
branaceo.

Die zusammengedrückte  
Schale bestehet aus fünf glat-  
ten Klappen, und sitzt Mittels  
einer darmförmigen Haut fest.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 544.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 2.*

*Mus. Wormian. p. 256.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 282.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 106. f. A. D.*

*Seb. Thes. III. t. 16. n. I. a, b.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. II.

Ginan, adr. II. t. 30. f. 182.

Knor. Vergn. II. 30. | t. 4. 5. f.

Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 10. t. 8. f.

Da Cost. Elem. I. Pl. f. II.

## C. Pholas.

## C. Die Steindattel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 302.

Testa bivalvis, lata, utrinque diuarcata, accessoriis prope cardinem; cardinis margo replicatus, ligamento nexus intermedio. Die Schale ist zweiflügelig, breit, an beiden Enden klappend, mit einigen Nebenschalen am Schlosse. Das Schloß hat einen auswärts übergeschlagenen Saum, und ein dazwischen liegendes Band.

### C. I. Pholas Dactylus.

### C. I. Der Steinbohrer.

Linn. S. N. Sp. 20.

Belg. Steen - Scheede. Angl. The oblong withe Pidak Hill. Gall. Dail, Ital. Ballano. Ginan.

Testa lata, ventricosa, plicis transuersis, striisque longis. Die bäuchige Schale ist nach ihrer gestreckten Breite gefaltig.



gitudinalibus decussata, post- ten, der Höhe nach kreuzweise ge-  
ce reticulata. streifet, hinterwärts netzförmig.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 455. f. 3.*

*Rond. Test. t. 23. f. 2.*

*Bonsan. Recr. cl. 2. f. 25. 26. 27.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 276.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 10, 11.*

*Gualt. Test. t. 105. f. A. B. C. D.*

*Seb. Thes. III. t. 16. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. II. Pl.*

*Ginan. adr. II. t. 31. f. 184.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 3.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**C. 2. Pholas costatus.**

**C. 2. Der geribbte  
Steinbohrer.**

*Linn. S. N. Sp. 21.*

*Belg. Eoviger Gapper. Angl. The deeply furrowed Pholas. Hill.  
Gall. La grande Pholade de l'Amerique. Favart.*

Testa lata ventricosa trans-  
verse striata, costis longitudi-  
nalibus, extimis acutis remo-  
tioribus.

Die Schale ist in die Brei-  
te gestreckt, bänchig, in die  
Quere gestreifet, mit nach der  
Länge laufenden Ribben, deren  
äusserste scharf sind, und etwas  
von einander entfernt stehen.

*List.*



*List! Hist. Conch. l. 3. f. 277.*

*Gualt. Test. t. 105. f. G.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. 4. f.*



*C. Schütz.*



# Ordo secundus. Zweyte Ordnung.

Bivaluia.

Zweyflappige.

D. Mya.

D. Die Klammschel.

*Linn. S. N. Gen. 303.*

Testa bivalvis, altera extremitate hians; cardinis dente primario crasso,

Die zweyflappige Schale klappt an einem Ende; der Hauptzahn des Schlosses ist dick.

D. 1. Mya Glycimeris.

D. 1. Die bäuchige Klammschel.

Testa umbonata, extremitatibus oblique truncatis, dente antice crassissimo, longitudo ligamenti,

Die bäuchige Schale hat schiefe stumpfe Seitenende, und einen sehr dicken Vorderzahn nach der Länge des Bandes.

*Aldrov. Test. l. 9. p. 473. 474.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 258.*

*Gualt. Test. t. 9. f. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subovata umbonata laevis, pone apices utrinque coarctata, extremitates oblique truncatae hiantes; Dens anticus fere longitudo ligamenti, crassissimus, posticus minor, subjacens apicibus

Die etwas eiförmige bäuchige und glatte Schale ist an den Spitzen beiderseits ausgehölet. Die Seitenende sind schief und stumpf. Der Vorderzahn ist sehr dick, fast von der Länge des Bandes: der

in-



incurvatis, retro quos series crenularum extenditur. Color pallido griseus.

Hinterzahn ist kleiner, liegt unter den einwärts gekrümmten Spitzen, hinter welchen eine Reihe kleiner Kerbe austräuft; ihre Farbe ist lichtgrau.

D. 2. *Mya pictorum*. D. 2. Die Mahlermuschel.

*Linn. S. N. Sp.* 28.

*Cost.* Moule des peintres. *Angl.* The Pearl River Muscle. *Da Cost.* *Ital.* Concha de Pittori. *Ginan.*

Testa lata, convexa, cardinis dente primario crenulato, laterali elongato, quous in altera testa duplicato.

Die Schale ist breit, eiförmig, und bänchig, der Hauptzahn ist gekerbt, der Nebenzahn verlängert, und an einer Klappe doppelt.

*Bonani.* Recr. cl. 2. f. 40. 41.

*List.* angl. t. 2. f. 30.

— *Hist.* Conch. l. 2. f. 146. 147.

*Swammerd.* Bibl. nat. t. 10. f. 6, 7.

*Gualt.* Test. t. 7. f. E.

*Berlin.* Magaz. IV. 12. t. 66. 67. f.

*Ginan.* adriat. II. t. 4. f. 17.

*Da Cost.* Elem. 7. Pl. 12. f.

D. 3. *Mya margaritifera*. D. 3. Die Flußperlmuschel.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 29.*

*Gall. Telline fluviatile. Dav.*

*Testa lata, ovata, planiuscula, infra coarctata, dente nig, etwas platt gedrückt, primario crasso, lateralibus am Unterrande eingebogen; der elongatis.* Die Schale ist breit, eiförmig, etwas platt gedrückt, am Unterrande eingebogen; der Hauptzahn dick und die Neben Zähne verlängert.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 149.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 47.*

*Berlin. Magaz. IV. 12. t. 65. f.*

*Knor. Vergn. IV. 25. t. 2. f.*

**D. 4. Mya Vulfella.**

**D. 4. Der Bartfneiser.**

*Linn. S. N. Sp. 31.*

*Be'g. Baardnyper. Rumph.*

*Testa elongata linguiformi, cardine terminali concavo rotundato.* Die Schale ist der Höhe nach zungenförmig verlängert; das Schloß bildet am Unterende eine rundliche Höhlung.

*Rumph. amb. n. 46. t. A.*

*Gualt. Test. t. 90. f. H.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. 3.*

*Knor. Verg. V. 2. t. 1. — 3. f.*



Habitu a congeneribus diversissimo, utriusque linnaei proprium.

Dem Ansehen nach unterscheidet sich diese von allen ihren Nebenarten, sie gehöret auch mit mehr Recht unter das Geschlecht der Muscheln des Linne.

## E. Solen.

## E. Die Messerscheide.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 104.*

Testa bivalvis, aequalis, latissima, utrinque hians. Cardinis dens unus reflexus aut duplex, non infertus testae oppositae.

Die Schale bestehet aus zweien gleichen Klappen, welche in die Breite sehr verlängert sind, und an beiden Enden klaffen. Der Zahn des Schloßes ist zurückgebogen, oft doppelt, und heisset nicht in die entgegen gesetzte Klappe ein.

## E. 1. Solen. Vaginā.

## E. 1. Die Rinne.

*Linn. S. N. Sp. 33.*

Belg. Orgelpypen. *Rumph. Angl.* The thick Razor - Shell. *Hill. Gall.* Manche de Couteau. *Day. Ital.* Languetti.

Testa



Testa lineari, recta, cardine prope extremitatem alteram truncatam unidentato.

Die Schale ist gleichbreit und gerade, nahe am abgestumpften Ende mit einem einzahnen Zahne versehen.

*List. Hist. Conch. V. 3. f. 256.*

*Rumph. Amb. 45. f. M.*

*Gualt. Test. t. 95. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. K.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 11. f. 65.*

*Knor. Vergn. I. 28. t. 3. f.*

*Ginan. adriat. II. t. 27. f. 170.*

*Da Cost. Elem. Pl. 7. f. 8.*

E. 2. Solen Siliqua.

E. 2. Das Messerheft.

*Linn. S. N. Sp. 34.*

*Belg. Messerhecht. Angl. The little Strait Razor. Hist. Gall. Manche decouteau lemelle. Venet. Cappa lunga. Bonon. Pefche cancella.*

Testa lineari recta, extremitatibus rotundatis, cardine pone alteram bidentato.

Die Schale ist gleich breit, und gerade, die Ende sind rundlicht, an einem davon ist das Schloß mit zween Zähnen versehen.



*Bell. aq. t. 414. f. 2.*

*List. angl. t. 5. f. 37.*

—— *Hist. Conch. l. 2. 255. f.*

*Bonan. Reqr. cl. 2. f. 57.*

*Planc. Conch. t. 3. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 95. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Müll. Linn. N. S. VI. 1. B 11. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

### E. 3. Solen Ensis.

### E. 3. Die Erbsenschote.

*Linn. S. N. Sp. 35.*

*Belg.* Beu Idoublet. *Angl.* The blucifch crooked Razor. *Hill. Gall.* Manche de couteau courbée. *Day.*

*Testa lineari subarcuata,* Die Schale ist gleichbreit,  
*extremitate utraque rotunda-* etwas gekrümmt, an beiden  
*ta, cardine pone alteram bi-* Enden rundlich, an deren ei-  
*dentato.* nem das Schloß mit zweien  
Zähnen versehen ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 257. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. L.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Knor. Vergn. VI. 7, t. 1. f.*

E. 4.



E. 4. *Solen radiatus*.

E. 4. Die blaue Strahlscheide.

*Linn. S. N. Sp. 38.*

*Belg.* De violetblauwe. Zonnestraal. *Rumph. Gall.* Le soleil le vant.  
*Dav. Angl.* The violet-purple papyraceus *Solen.* *Hill.*

Testa lineari recta, subdiaphana, laevi, costa cardinis obliqua, depressa.

Die Schale ist gleich breit, gerad, halb durchsichtig und glatt. Die Rippe inner dem Winkel lauft schief, und ist plattgedrückt.

*Violacea radiis quatuor albis.*

Violettfarbig mit vier weissen Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 266.*

*Rumph. amb. 45. t. E.*

*Petiv. amb. t. 21. f. 16.*

*Gualt. Test. t. 91. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. P.*

*Knor. Delic. I. t. B. III. f. 9.*

— *Vergn. I. 6. t. 5. f.*

E. 5. *Solen strigilatus*.

E. 5. Die rosenrothe Strahlscheide.

*Linn. S. N. Sp. 39.*

*Belg.* Roose - roodt Zonnestraal. *Angl.* The thick red *Solen.* *Hill.*  
*Gall.* Lanterne rouge rayonnée de blanc.



Testa lineari recta, crassa, Die Schale ist gleichbreit,  
 convexa, lineis oblique in- gerad und dick, die Klappen  
 sculptis, costa cardinis nulla. gewölbt, mit schiefen ausge-  
 schnittenen Linien, ohne Aus-  
 gelippe.

Rosae, radiis duobus albis.

Rosensarbig mit zweien weißen  
 Strahlen.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 77.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 260.*

*Gualt. Test. t. 91. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 19. f. 2.*

*Knor. Vergn. VI. 5. t. 4. f.*

## F. Tellina.

## F. Die Tellmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 305.*

Testa bivalvis antice Die zweiflappige Schale  
 hinc inflexa; dentes late- le ist am Vorderrande um-  
 rales alterius testae plani. gebogen. Die Seitenzäh-  
 ne sind an einer Klappe  
 platt.

F. I. Ovatae crassiusculae.

F. I. Mit eiförmigen dicken  
 Schalen.

F. I. 1. Tellina lingua felis. F. I. 1. Die Katzenzunge.

*Linn. S. N. Sp. 45.*



Belg. Katetonge Rumph. Gall. Le Chagrin Day.

Testa lata subouata, scabra Die Schale ist breit, eyrund,  
squamis fornicatis quincuncia- und mit hohlen ins Gevierte  
libus. stehenden Schüppchen besetzt.

Rumph. amb. t. 45. f. G.

Gualt. Test. t. 76. f. B.

Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 62.

Knor. Vergn. II. 2. t. 1. f.

F. I. 2. Tellina rugosa. F. I. 2. Die runzelichte  
Tellinuschel.

Testa subouata lata, ru- Die etwas eyförmige breite  
gis membranaceis transuersis, Schale hat häutige nach der  
rima hiantes. Quere laufende Runzeln, und  
eine klaffende Spalte.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata, subouata, scabra, Die Schale ist breit, etwas eyförmig, und durch querlaufende erhabene  
membranis eleuatis rugosis trans- dünne Runzeln raub. Die Spalte klaf-  
uersis. Rima hians. Labra promi- fet. Die Lippen ragen hervor. Die  
nula. Apices acuti contingui, an- Spitzen sind dünn, vorwärts gekrümmet, und berühren einander. Die Lip-  
trorsum recurui. Ligamentum in- pen werden von dem Bande bedec-  
uestiens labra, alterumque retro ket, ein anderes dünneres Band  
apices tenuius. Color totius testae läßt sich hinter den Spitzen wahr-  
albus. nehmen. Die Farbe der ganzen  
Schale ist weiß.

F. I. 3. Tellina virgata. F. I. 3. Der gestreifte  
Sonnenstrahl.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 46.*

*Belg. Zonnentraal. Rumph. Angl. Rayed Tellin. Petiv. Gall. Telline radiée Dav.*

Testa lata subouata, antice Die breite etwas eysförmige,  
angulata, lineis eleuatis trans- und vorne eckige Schale hat  
uerlis, radiis rubentibus. erhabene Querlinien, und ro-  
the Strahlen.

*Rumph. amb. t. 45. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 19.*

*Argenv. Conch. Pl. 25. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 21. t. 4. f.*

— — — *IV. 25. t. 1. f.*

F. I. 4. *Tellina angu-*  
*lata.*

F. I. 4. Die eckige Tell-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 47. ?*

Testa lata subouata, striis Die breite etwas eynlange,  
transuersis recuruatis, antice vorne schiefseckige Schale hat  
oblique angulata, labris pro- erhabene zurückgefrännte  
minulis, dentibus lateralibus Querstreife, hervorragende  
nullis. Lippen, und keine Seitenzäh-  
ne.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 241.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



F. I. 5. Tellina Gari.

F. I. 5. Die Bacapamuschel.

*Linn. S. N. Sp. 48.*

*Belg.* Buccassina mulet *Rumph. Gall.* Telline, barfolée de violet, & de blanc. *Argenv.*

Testa lata subaequilatera, Die breite beinahe gleichseitige Schale hat zurückgebogene, striis transversis deflexis, latibris prominentibus, dentibus ne Querstreife, und keine Seitenzähne. lateralibus nullis.

Violacea, radiis pallidis.

Bluttblau mit bläuen Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 261.**Rumph. amb. t. 45. f. D.**Argenv. Conch. Pl. 22. f. F.**Mus. Caes. Vindobon.*

F. I. 6. Tellina anomala.

F. I. 6. Die unächte Tellmuschel.

Testa subovata lata, venenica, longitudinaliter rugosa, striis transversis utrinque scabra, limbo antico intus violaceo.

Die etwas eiförmige breite kauliche Schale ist der Länge nach runzelicht, und durch Querstreife an den Seitenenden rau, inwendig am Vorderende violet.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.*

— — — VI. II. t. 2. f.

Testa subovata lata ventricosa, antice utrinque obsolete carinata. Sulci longitudinales undulati, striis transversis prope extremitates exasperati. Apices umbonati incurvati. Ligamentum crassius ante apices, & retro hos tenuius alterum. Dentes primarii duo, later bifidus, laterales nulli. Limbus internus praefertim anticus violaceus.

Die Schale ist etwas eysförmig, breitet und bläulich, an beiden Seiten vorne mit einer stumpfen Ecke versehen. Nach der Länge herab laufen runzelichte Furchen, welche von Querstreifen durchkreuzet den Seitenenden ein raubes Ansehen geben. Die Spitzen sind aufgeblasen und einwärts gekrümmet. Vor den Spitzen ist das gewöhnliche dicke Band, und hinter denselben noch ein anderes dünneres. Das Schloß hat zween Hauptzähne, deren einer zwerspaltig ist. Die Seitenzähne fehlen. Der innere Rand ist besonders vorne violett.

α pallide lutescens intus lutea.

α bläßgelb, inwendig gelb.

β alba apicibus violaceis, intus tota violacea.

β weiß, mit violeten Spitzen und gleichfarbiger Höhlung.

γ violacea, alboradiata intus violacea, albaque.

γ Violett mit weißen Strahlen, mit blau und weiß gefleckter innerer Höhlung.

δ alba, cavitate & apibus miniatis.

δ weiß mit meningfarbiger Höhlung und Spitzen.

F. II. Ovatae compressae.

F. II. Mit eyrunden platgedrückten Schalen.

F. II. 1. Tellina albida.

F. II. 1. Die blaßrothe Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 50. ?*



Testa lata ovali laevi, sub- Die breite ensförmige Schale  
tus transverse inaequaliter sul- le ist glatt, unten mit unglei-  
cata, labiis prominentibus, den- chen Quersfurchen, die Lippen  
tibus lateralibus obsoletis. ragen hervor, die Seitenzäh-  
ne sind undeutlich.

Knor. Vergn. IV. 3. t. 4. f.

— — V. 9. t. 3. f.

F. II. 2. *Tellina punicea*.

F. II. 2. Die dunkelro-  
the Tellmuschel.

Testa lata ovali, sub aequi-  
latera, glabra, striis trans-  
uersis approximatis.

Die breite ensförmige glän-  
zende Schale ist beinahe gleich-  
seitig, und mit gedrängt an-  
einander stehenden Querstreifen  
überzogen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis lata complanata, la-  
teribus utrinque subaequalibus. Api-  
ces enues breues. Labia testis.  
Dentes primarii, & laterales se-  
cundum characterem generis. Co-  
lor pallide incarnatus, prope api-  
ces & in superficie interna puni-  
ceus.

Die Schale ist breit, lensförmig,  
und platgedrückt, an den Seiten  
beinahe gleichlang. Die Spitzen  
sind kurz und fein. Die Lippen  
bedeckt. Die Hauptzähne haben wie  
die Seitenzähne das gemeine Merk-  
mal dieses Geschlechtes. Die Far-  
be ist an der Oberfläche fleischroth,  
an den Spitzen und inwendig dun-  
kelroth.

F. II. 3. *Tellina pla-  
nata*.

F. II. 3. Die scharf-  
randige Tellmuschel.

Linn. S. N. Sp. 52.

Testa



Testa lata, ovata, compressa, transuersim substriata, marginibus acutis.

Die breite eysförmige Schale ist platt gedrückt, der Quere nach sehr fein gestreift, an den Rändern scharf.

*Gualt. Test. t. 89. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. II. 4. Tellina radiata.

F. II. 4. Der glatte Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 54.*

*Belg* Een roode witsfraalige Tellmossel. *Angl.* The tulip tellina. *Da Cost. Gall.* Telline rayée de couleur de chair. *Favart. Roman.* Capparozole. *Venet.* Capparole.

Testa lata substriata glabra, labris hiantibus, arcuola lanceolata.

Die breite Schale ist feinst gestreift und glänzend, mit hervorstehenden Lippen und einer lanzettförmigen Hinterfläche.

Cavitas citrina. Apices rosei. Fasciae saepe radiantes roseae.

Die Farbe der inneren Fläche ist schwefelgelb, die Spitzen und öfters auch die Strahlen sind rosenroth.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 240.*

*Gualt. Test. t. 89. f. J.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 28. f. 8. t. 22. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 1. f.*

— — — IV. 2. t. 24. f.

— — — Del. nat. I. t. B. III. f. 3.

*Da Cost. Elem. Pl. 6. Fig. 11.*

B 4

F. II. 5.



F. II. 5. Tellina rostrata. F. II. 5. Das Schindchen.

Linn. S. N. Sp. 55.

Belg Banket Hammetjes. Angl. Wedge Muscle. Petiv. Gall. Pince de Chirurgien Dav.

Testa ovata antice angulato rostrata, transuersim subcilissime striata.

Die eiförmige Schale hat vorne einen verlängerten eckigen Schnabel, und ist der Quere nach sehr fein gestreift.

α Flava, rostro breuiore.

α gelb, mit kürzerem Schnabel.

Mus. Caes. Vindobon.

β incarnata, rostro longiore.

β fleischfarbig, mit längerem Schnabel.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 225.

Petiv. amboin. t. 17. f. 20.

Gualt. Test. t. 88. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 22. f. O.

Knor. Vergn. II. 2. t. 5. f.

F. II. 6. Tellina inaequivalvis.

F. II. 6. Die Bastardtelline.

Linn. S. N. Sp. 56.

Belg. Platzydige Telline.

Teste



Testa lata ouata rostrata, Die breite eynlange schnabel-  
 valua altera plana, dentibus förmige Schale hat eine ganz  
 lateralibus nullis. flache Klappe, und keine Sei-  
 tenzähne.

*Spengl. berlin. Beschaeft. III. 7. t. 25 — 28. f.*

F. II. 7. Tellina incar-  
 nata.

F. II. 7. Der kleine  
 Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 58.*

*Belg. Rood Juffertje.*

Testa lata ouata rostrata Die Schale ist breit eynlang  
 complanata, apicibus acutis, und schnabelförmig, mit fei-  
 pallido radiata. nen Spitzen und weißen Strah-  
 len.

*List. angl. app. t. I. f. 8.*

*Gualt. Test. r. 88. f. M.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. Suborbiculatae.

F. III. Mit ründlichen Schalen.

F. III. 1. Tellina Re-  
 mies.

F. III. 1. Die Sand-  
 telline.

*Linn. S. N. Sp. 62.*

*Belg. Remies. Rumph.*



Testa subrotunda , crassa, Die rundliche dicke Schale  
transuersim tenuissime striata, ist nach der Quere sehr fein  
rima patula. gestreift , und mit einer klaf-  
fenden Spalte versehen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 102.*

*Rumph. amb. t. 43. f. J.*

*Mus Caes. Vindobon.*

F. III. 2. Tellina sco-  
binata.

F. III. 2. Die schuppige  
Tellinuschel.

*Linn. S. N. Sp. 64.*

*Gall. La guillochée. Dav.*

Testa orbiculari , scabra, Die scheibenrunde Schale  
squamis lunatis in quincun- ist wegen der mondfarbigen ins  
eem digestis. Gevierte stehenden Schüppchen  
rauh anzufühlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 143.*

*Gualt. Test. t. 76. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 3. f.*

F. III. 3. Tellina car-  
naria.

F. III. 3. Die Fleisch-  
linse.

*Linn. S. N. Sp. 66.*



Testa orbiculata, striis obliquis, deorsum reflexis, undulatis.

Die scheibenförmige Schale hat eingeschnittene schiefe und rückwärts herabgebogene wellenförmige Streifen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 176.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. 4. Tellina balrhica.

F. III. 4. Die dreneckige Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 68.*

Testa triangulo rotundata, laevi, transuersim subtilissime striata, incarnata.

Die Schale ist dreneckig, rundlicht, glänzend, in die Quere sehr fein gestreift, von fleischrother Farbe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. Cardium.

G. Die Herzmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 306.*

Testa bivaluis, aequaluis, dentibus cardinis mediis binis, alternatis; lateralibus remotis insertis.

Die Schale bestehet aus zween gleichen Klappen; an dem Schlosse stehen zween wechselweise Mittelzähne, mit entfernten einbeißenden Seitenzähnen.

G. I.



G. 1. Cardium costatum. G. 1. Die geribbte Herzmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 73.*

*Belg.* Geribte Venus doublet. *Rumph.* *Angl.* The exotick Heart Cockle. *Hill.* Gall. Conque exotique. *Dav.*

Testa lata ventricosa, costis longitudinalibus, carinatis, concavis. Die breite und bäuchige Schale ist nach der Länge herab mit kielförmigen hohlen Rippen besetzt.

*Column.* purp. t. 27.

*List.* Hist. Conch. l. 3. f. 164.

*Rumph.* amb. 48. t. 6. f.

*Gualt.* Test. t. 72. f. D.

*Argenv.* Conch. Pl. 23. f. A.

*Adans.* Seneg. Pl. 18. f. 2.

*Hill.* Hist. of. Anim. Pl. 10.

*Knor.* Vergn. I. 28. t. 2. f.

G. 2. Cardium Cardissa. G. 2. Das Menschenherz.

*Linn. S. N. Sp. 74.*

*Belg.* Venus hart. *Angl.* human Heart-Cockle. *Hill.* Gall. Coeur de Venus. *Dav.*

Testa cordata, valvis compressis carinatis, apicibus inflexis contiguis. Die herzförmige Schale hat flachgedrückte kielförmige Klappen, mit eingerollten nahe aneinander stehenden Spitzen.

α Ca-



*α* Carina valuularum integra.

*α* mit ganzem Riele.

*β* Carina valuularum crenata.

*β* mit gekerbtem Riele.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 49.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 155. 156.*

*Rumph. amb. t. 42. f. E. —*

*Gualt. Test. t. 84. f. B. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. 7.*

*Klein. Meth. Ostr. 1. 10. f. 39.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

*—— — VI. II. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 3. Cardium retu-  
sum.

G. 3. Das Nabelherz.

*Linn. S. N. Sp. 75.*

Testa cordata oblique cari-  
nata, sinu politico lunari in-  
truso.

Die herzförmige und schief  
gekielte Schale hat hinter den  
Spizen eine tief eingedrückte  
mondförmige Höhlung.

Valva solitaria.

Eine einzelne Klappe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 4. Cardium imbri-  
catum.

G. 4. Das schuppige  
Herz.

Testa



Testa cordato trilatera, inter sulcos longitudinales tenues transverse & dense squamulosa.

Die herzförmige dreiseitige Schale ist nach der Länge mit feinen Furchen, und dazwischen in die Quere mit dicht aneinander liegenden Schüppchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 152.*

*Gualt. Test. t. 83. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata trilateralis. Valvae utrinque angulatae longitudinaliter sulcatae, sulcis tenuibus, inter quos squamulae, undique arcuatae, & dense imbricatae locantur. Marg. crenatus, anticus ferratus. Color testae niueus, squamularum citrinus.

Die Schale ist herzförmig und dreiseitig. Die Klappen sind an beiden Seiten eckig erhoben, nach der Länge herab laufen linsenförmige Furchen, zwischen welchen sich allenthalben bogenförmig gedrängt aneinanderstehende Schüppchen befinden. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Schale ist von schneeweiß, die Schüppchen von zitronengelber Farbe.

G. 5. Cardium Hemicaudium.

G. 5. Das dreiseitige Herz.

*Linn. S. N. Sp. 76.*

Holl. Driezydig Venus hart. Gall. Coeur triangulaire Dax. Angl. Strawberry Heart Cockle. Petiv.

Testa cordata subtrilatera, valvis angulatis, sulcis tenuibus excavato punctatis, utrinque transverse tuberculatis.

Die Klappen der herzförmigen beinahe dreiseitigen Schale sind eckig, mit tief punktierten dünnen Furchen, und in die Quere stehenden Körnern besetzt.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. H.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 83. f. C.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 2. f.*

G. 6. Cardium medium.

G. 6. Das Mittelherz.

*Linn. S. N. Sp. 77.*

Testa subcordata, valvis longitudinaliter sulcatis, angulatis, laevibus.

Die Klappen der einigermaßen herzförmigen Schale sind nach der Länge gefurchet, eckig und glatt.

*Knor. Vergn. V. 20. t. 5. f.*

G. 7. Cardium aculeatum.

G. 7. Das Nagelherz.

*Linn. S. N. Sp. 78.*

Belg. gedornte Nageldoublet. *Angl. Coeur de boeuf. epineux Dav.*  
*Angl. The Oxheart Cockle. Hill.*

Testa subcordata costis spinoso ciliatis.

Die einigermaßen herzförmige Schale ist mit spizen Dornern besetzt.

α Spinis fornicatis compressis.

α Mit hohlen zusammengebrückten Dornern.

β Spinis fornicatis crassis inflexis.

β Mit hohlen dicken umgebogenen, oder nagelförmigen Dornern.

*Aldrov.*



*Aldrov. Test. l. 3. p. 452.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 96. 97.*

*Gualt. Test. t. 72. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. B.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 1. f.*

G. 8. *Cardium tuber-  
culatum.*

G. 8. Das knotige  
Herz.

*Linn. S. N. Sp. 81.*

*Angl. Grain Cockle Petiv.*

Testa subcordata fulcata,  
costis obtusis transverse stria-  
tis, extus nodosis.

Die etwas herzförmige ge-  
furchte Schale hat stumpfe, in  
die Quere gestreifte, und aus-  
ßen knotige Rippen.

*Rumph. amb. t. 48. f. 11.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 7.*

*Knor. Vergn. V. 30. t. 2. f.*

G. 9. [*Cardium Ico-  
fardia.*

G. 9. Das Ziegelherz.

*Linn. S. N. Sp. 82.*

*Belg. Nagelschulp. Rumph. Gall. Cœur de boeuf ruié. Argenv.  
Ang. The rough Oxheartshell. Hill.*

Testa



Testa subcordata sulcata,  
squamis fornicatis erectis.

Die einigermaßen herzför-  
mige Schale ist gefurchet, und  
mit aufgerichteten hohlen  
Schuppen besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 95.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 160.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 152. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 56. f.*

G. 10. Cardium Une-  
do.

G. 10 Die rothe Erd-  
beere.

*Linn. S. N. Sp. 84.*

*Belg. Aardbesie. Rumph. Angl. The red Straw - Berry. Gall. La Fraise rouge. Argenv.*

Testa subcordata trilatera  
obtuse angulata, multifulca-  
ta, lunulis transuerlis colora-  
tis sparlis.

Die etwas herzförmige und  
dreiseitige Schale hat an ih-  
ren Klappen stumpfe Ecken,  
viele Furchen, und zerstreute  
gefärbte Querschüppchen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 375.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 151.*



*Rumph. amb. t. 44. f. F.*

*Gualt. Test. t. 83. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 25. f.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 3. f.*

— — VI. 3. t. 4. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 8. f.*

G. 11. *Cardium magnum.*

G. 11. Die große Herzmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 86. ?*

Testa subcordata ventricosa sulcata, costis angulatis posticis transuersis, striatis.

Die etwas herzförmige, bäuchige und gefurchte Schale hat eckige Ribben, deren hintere mit nach der Quere laufenden Streifen besetzt sind.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 158.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 12. *Cardium leucostomum.*

G. 12. Das gelbmündige Herz.

Testa subouata sulcata, costis anticis muricatis, posticis transuersim crenatis, areola lanceolata,

Die etwas ensförmige gefurchte Schale ist an den Vorderribben rauh, an den Hinterribben nach der Quere gekerbt, ihre Hinterfläche ist ensförmig.

*List.*



List. Hist. Conch. l. 3. f. 168.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subouata crassa, sulcis 33. longitudinalibus. Costae compressae angulatae, posticae muricatae, anticae squamulis dense imbricatae; sulci intermedii transversum striati. Margo crenatus, antice serratus. Areola plana lanceolata, qua ab adfinibus differt. Limbus aurantii coloris.

Die Schale ist dick, einigermassen herzförmig, mit 33 nach der Länge laufenden Furchen besetzt. Die Rippen sind etwas flach gedrückt und eckig; die hinten stehenden sind rauh, die vordern mit ziegelförmigen Schüppchen dicht besetzt. Die Zwischenfurchen sind in die Quere gestreift. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Hinterfläche ist platt und lanzettförmig, wodurch sie sich besonders unterscheidet. Der innere Rand ist pomeranzensfarbig.

G. 13. Cardium flauum.

G. 13. Das gelbe Herz.

Linn. S. N. Sp. 87.

Testa subouata, longitudinaliter obsolete sulcata, marginem crenato.

Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge schwach gefurcht, und am Rande gekerbt.

Mus. Caes. Vindobon.

G. 14. Cardium laevigatum.

G. 14. Das glatte Herz.

Linn. S. N. Sp. 88.



Testa subouata glabra, Die etwas eysförmige Scha-  
striis longitudinalibus, obso- le ist glatt, und mit matten  
letis, Streifen nach der Länge besetzt.

*Gualt. Test. t. 82. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 4. f.*

— — — *V. 10. t. 7. f.*

G. 15. Cardium aeoli-  
cum.

G. 15. Die Ost- und  
Westmuschel.

*Belg. Oost en West-Doulet.*

Testa subouata sulcis tenui- Die etwas eysförmige Scha-  
bus longitudinalibus, plicis- le ist mit dünnen Furchen nach  
que transuersis obtusis postice. der Länge, und rückwärts mit  
stumpfen Quersalten besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 91.*

*Knor. Vergn. V. 26. t. 2. f. 27. t. 3. f.*

Testa subouata umbonata glabra,  
longitudinaliter sulcata, postice pli-  
cis transuersis, complanatis, fur-  
sum imbricatis. Margo anticus cir-  
ca ligamentum laevis. Labia retro  
apices crassa prominentia. Color  
albo roseoque varius.

Die Schale ist einigermaßen ey-  
förmig, bäuchig und glatt, nach  
der Länge gefurchet, und hinten  
mit platt gedrückten aufwärts  
ziegelförmig gestellten Falten verse-  
hen. Der Borderrand ist neben  
dem Bande glatt. Hinter den Spiz-  
zen ragen dicke Lippen hervor. Die  
Farbe ist weiß mit Rosenroth ver-  
menget.

G. 16.

G. 16. *Cardium latum*.

G. 16. Die breite Herzmuschel.

Belg. Blaafagtig Hart. Gall. Coeur enflé.

Testa lata ovali, longitudinaliter sulcato striata, utrinque scabra, margine antico ferrato,

Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge gefurchet und gestreift, an beiden Enden rauh, und am Vorderrande sägeförmig.

Knor. Vergn. VI. 7. t. 6. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata ovalis, longitudinaliter sulcato striata. Costae anticae posticaeque acutae, muricatae, mediae obtusae laeves, interstitiis duplicato striatis. Umbones tenuissime striati, antrorsum subcarinati; Apices incurvi laeves. Cardo, dentibus generis characterem exhibens; Limbus striatus. Margo anticus acute ferratus.

Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge mit Furchen und Streifen besetzt. Die vordern und hintern Ribben sind scharf und rauh, die mittleren stumpf und glatt, mit zweysach gestreiften Zwischenräumen. Die Wölbungen sind sehr zart gestreift und vorwärts einigermassen tielförmig. Die Spitzen sind einwärts gekrümmet und glatt. Das Schloß hat an den Zähnen das dem Geschlechte eigenthümliche Kennzeichen. Der innere Rand ist gestreift. Der Vorderrand hat scharfe sägeförmige Ausschnitte.

α alba, luteo maculata.

α weiß und gelb gefleckt.

β alba, rubro maculata.

β weiß mit rothen Flecken.

G. 17. *Cardium pectinatum*.

G. 17. Die kammbähnliche Herzmuschel.

C 3

Testa



*Testa rotundata complanata,* Die rundliche etwas flach  
*costis triangulis, lateribus mu-* gedrückte Muschel hat dreieckig-  
*ricatis.* ge Rippen, und rauhe Seiten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa suborbiculata profunde sul-*  
*cata Costae triangulae transversim cre-*  
*ratae; extimae squamulis fornicatis*  
*scabrae. Margo crenatus, anticus ser-*  
*vatus. Superficies externa albida,*  
*maculis dispersis fuscis. Cavitas*  
*longitudinaliter sulcata, alba.*

Die Schale ist einigermassen schei-  
 benrund, tiefgefurchet. Die Rippen  
 sind dreieckig in die Quere gefech-  
 tet, die äußern davon sind durch  
 hohle Schüppchen rauh. Der Rand  
 ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die  
 äußere Fläche ist weiß mit zerstreuten  
 braunen Flecken. Die innere  
 Höhlung aber ganz weiß und nach  
 der Länge gefurchet.

G. 18. *Cardium rusticum.*

G. 18. Das Hahnen-  
 herz.

*Linn. s. N. Sp. 91.*

*Belg. Bonte Kokhaan. Gall. Le Coq bigarré.*

*Testa subcordata, umbona-*  
*ta, antiquata, sulcis remotis*  
*longitudinalibus, transversim ru-*  
*gosis.*

Die etwas herzförmige häu-  
 tige Schale hat Ansätze, und  
 nach der Länge laufende von  
 einander entfernte Furchen, die  
 in die Quere runzelicht sind.

*α alba, fasciis ferrugineis.*

*α weiß, mit rothbraunen Bändern.*

*β niva.*

*β schneeweiß.*

*Aldrov. Test. l. 3. p. 480.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 166.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. K.*

*Gualt. Test. t. 71. f. M.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 24. f. 12. t. 77. 78. f.*

*Knor. Vergn. VI. 8. t. 3. f.*

## H. Mastra.

## H. Die Korbmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 307.*

*Testa bivalvis aequivalvis. Cardinis dente medio complicato, cum adjecta foueola; dentibus lateralibus remotis insertis.* Die Schale hat zwei gleiche Klappen. Der gezaltene Mittelzahn des Schlosses hat neben sich ein Grübchen, und etwas entfernte einbeißende Seitenzähne.

## H. 1. Mastra Sprengleri.

## H. 1. Die sprenglerische Korbmuschel.

*Linn. L. N. Sp. 94.*

*Testa cordato triangulari, laevi, area complanata, utrinque carinata.* Die herzförmige dreiseitige glatte Schale hat eine flache an beiden Seiten keilsförmige Vorderfläche.



Gualt. Test. t. 85. f. F.

Knor. Vergn. VI. 34. t. I. f.

H. 2. Mastra glauca.

H. 2. Die fahle Korbmuschel.

Testa subouata umbonata,  
apicibus laeuissimis, lateribus  
undique striatis.

Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an den Spizen glatt,  
und an den Seiten allenthal-  
ben gestreift.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subouata tenuis, conuexa,  
apicibus glabris. Area, areolaeque  
indistincta, tenuiter striata. Val-  
uae solitariae dens primarius  
complicatus, laterales elongati.  
Color sordide albidus.

Die eysförmige Schale ist dünn,  
bäuchig, gegen die Spizen zu glatt.  
Die Vorder- und Hinterflächen sind  
undeutlich und gestreift. Der Haupt-  
zahn der einzelnen Klappe ist zusam-  
men gesetzt, die Seitenzähne lang  
auslaufend. Die Farbe schmutzig  
weiß.

Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

I. Donax.

I. Die Stumpfmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 308.*

Testa bivaluis, margi-  
ne antico obtusissimo. Den-  
tibus insertis, marginali po-  
stice solitario, subremoto.

Die zweyklappige Scha-  
le hat einen stumpfen  
Vorderrand. Die Zähne  
am Schlosse sind einbeiß-  
end, der hintere Seiten-  
zahn stehet einzeln, und  
entfernet.

I. I.



I. 1. Donax Scortum.

I. 1. Das Dreneck.

*Linn. S. N. Sp. 102.**Gall. Came coupée. Dav. Angl. The violet and white Chama Hill.*

Testa cordato triangulari; Die Schale ist herzförmig,  
 area explanata lacui, utrin- dreiseitig, die Vorderfläche  
 que carinata, striis transver- ausgebreitet und glatt, und an  
 sis alternatim excurrentibus. beiden Seiten kielförmig. Die  
 Querstriehe verlängern sich  
 wechselweise.

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 220.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. L.**Petiv. Gaz. t. 19. f. 11.**Hill. Hist of. Animal. Pl. 9.**Müll. Linn. Natursyst. VI. 1. B. 11. t. 5. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

I. 2. Donax pubescens.

I. 2. Die stachelichte  
Stumpfmuschel.*Linn. S. N. Sp. 103.*

Testa cordato triangulari Die herzförmige dreiseitige  
 decussatim striata, area ex- Schale ist kreuzweise gestreift,  
 planata utrinque carinata, spi- die Vorderfläche platt, und  
 nisque canaliculatis armata. beiderseits kielförmig, mit rin-  
 nenförmigen Stacheln besetzt.

I. 3. *Donax Trunculus.*      I. 3. Das Stümpchen.*Linn. S. N. Sp. 105.**Belg. Stombje. Gall. La Tronquée.*

Testa cuneiformi, antice      Die keilförmige Schale ist  
oblique truncata, laevi, lim-      vorne schief abgestumpft, und  
bo crenato,      glatt, am inneren Rande ge-  
kerbet.

*List. angl. t. 5. f. 35.**Bonan. Recr. cl. 2. f. 47.**List. Hist. Conch. l. 3. f. 217.**Gualt. Test. t. 88. f. 0.**Adans. Seneg. Pl. 10. f. 1.**Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 61.**Knor. Vergn. I. 7. t. 7. f.**Mus. Caes. Vindobon.*I. 4. *Donax denticulata.*      I. 4. Die Säge.*Linn. S. N. Sp. 107.**Belg. Zaagertjes. Gall. La Scie. Dav.*

Testa cuneiformi, striata,      Die keilförmige Schale ist  
antice obtusissima, transverse gestreifet,      vorne gerad abge-  
ru-



rugosa , limbo denticulato.

stumpft und nach der Quere  
runzelicht , am inneren Rande  
gezähnelst.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 219.*

*Petiv. Gaz. t. 18. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 3, 4, 5. f.*

I. 5. *Donex cuneata.*

I. 5. Der Keil.

*Linn. S. N. Sp. 108.*

Testa cuneiformi compres-  
sa lacui, antice rugosa, mar-  
gine integerrimo.

Die keilförmige Muschel ist  
platt gedrückt und glatt, am  
Rande ganz.

*Knor. Vergn. V. 7. t. 3. f.*

K. *Venus.*

K. Die Venusmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 309.*

Testa bivalvis, aequi-  
valvis, sinu longirudina-  
li; areola vestigiata. Car-  
dinis dentes tres appo-  
ximati, laterales diuergen-  
tes,

Die Schale , welche  
aus zween gleichen Klap-  
pen bestehet , hat vorne  
eine längliche Vertiefung,  
und eine eingedrückte Hin-  
terfläche. Am Schlosse  
stehen drey Zähne nahe  
beisammen , deren äussere  
auswärts laufen.

K I.



K. I. Testae subcordatae, antice muricatae.

K. I. Herzförmige vorne rauhe Schalen.

K. I. I. Venus Dione.

K. I. I. Die achte Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 112.*

*Belg. De rechte Venus - Schulp mit Hair, Rumph. Angl. The Maiden Muscle Pet. Gall. Conque de Venus a pointes Dav.*

Testa subcordata, cingulis elevatis membranaceis, area utrinque spinosa. Die etwas herzförmige Schale hat erhabene blätterige Kei-  
fe und eine mit Stacheln be-  
setzte Vorderfläche.

*Bonan. Mus. Kirch. el. 2. f. 121.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 140.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 4.*

*Petiv. Gaz. t. 31. f. 9.*

*Olear. Mus. p. 29. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 76. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. 7.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 4. t. 3, 4. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 9.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 16. 17.*

*Müll. Linn. Naturfyst. VI. I. B. 11. t. 6. f.*

K I. 2.



K. I. 2. Venus Paphia.

K. I. 2. Das alte Weib.

*Linn. S. N. Sp. 113.*

*Belg.* Gerimpelde, oude Wyfs - schulp. *Rumph.* *Angl.* The old Woman. *Hill. Gall.* La Vieille ridée, *Argenv.*

Testa subcordata, cingulis Die etwas herzförmige Scha-  
 crassis, antice attenuatis. le hat dicke Reife, die sich  
 vorne verdünnen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 75.**Rumph. amb. t. 48. f. 5.**Gualt. Test. t. 85. f. A.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. B.**Regenf. Samml. I. 7. t. 11. f.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Knor. Vergn. II. 28. t. 2. f.*

—— — VI. 6. t. 2. f.

K. I. 3. Venus Marica.

K. I. 3. Die Bastard-  
 venus.*Linn. S. N. Sp. 114.**Belg.* De gestreepte Kousdoublet.

Testa rotundata, decussata, Die rundliche Schale ist  
 striis elevatis, antice lamel- mit erhabenen, vorne blätteri-  
 losis, areola carinata circum- gen Streifen durchkreuzt, die  
 scripta, Hinterfläche ist kielförmig er-  
 haben, und eingesägt.

*Mus.*



*Mus Caes. Vindobon.*

K. I. 4. Venus Dysera.

K. I. 4. Die Dünnribbe.

*Linn. S. N. Sp. 114.*

*Gall. La Levantine Argenv.*

Testa subcordata, cingulis remotis membranaceis, limbo crenulato.

Die etwas herzförmige Schale hat dünne erhabene in die Quere laufende Ribben, und am inneren Rande kleine Kerben.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 114. 115.*

*Petiv. Gaz. t. 24. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 10. f. 48, 49.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 3. f.*

K. II. Testae subcordatae, antice incrimae.

K. II. Herzförmige vorne unbesetzte Schalen.

K. II. 1. Venus verrucosa.

K. Die warzige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 116,*

*Gall. Cloniffe. Dav.*

Te.



Testa subcordata umbonata, cingulis arctis membrana-naceis verrucosis, limbo crenulato.

Die etwas herzförmige häu-  
chige Schale mit blätterigen  
warzenförmigen Ribben und  
gedrängt stehenden Keifen be-  
setzt, am inneren Rande mit  
feinen Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 122.*

*Gualt. Test. t. 75. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 2. Venus circi-  
nata.

K. II. 2. Die gereifte  
Venus.

Testa subcordata, mem-  
branis transuersis arctis, areo-  
la impressa ouata, limbo in-  
tegro.

Die fast herzförmige Scha-  
le ist mit häutigen Querringen  
umgeben, mit einer eysförmig-  
en eingedrückten Hinterfläche  
und ganzem Rande.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa figura V. Dionis subcorda-  
ta, umbonata transuersis eleuatis im-  
bricatis arctis. Sinus utrinque labia-  
tus, labiis subaequalibus. Areola  
cordata impressa. Limbus integer-  
rimus. Color pallide roseus, radiis  
obsoletis albis.

Die herzförmige häuchige Schale  
hat die Gestalt der achten Venus-  
muschel. Sie ist der Quere nach  
mit erhabenen ziegelstmiggestellten,  
hintereinander stehenden Ringen  
umgürtet. Die vordere Vertiefung  
ist beiderseits mit einem beinahe  
gleichgroßen Lefzen versehen. Die  
hintere Fläche ist eysförmig und ver-  
tieft. Der innere Rand ohne allen  
Einschnitt. Der Farbe nach ist  
sie blaßroth, mit matten weißen  
Strahlen.

K. II. 3.



K. II. 3. Venus cancellata.

K. II. 3. Die breitblättrige Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 118.

Testa subcordata complanata, cingulis erectis membranaceis remotis, antice elongatis, patentibus; limbo crenulato.

Die herzförmige plattgedrückte Schale ist mit erhabenen blättrigen Keifen umgeben, die sich vorne verlängern, und ausbreiten; der innere Rand ist fein gekerbet.

Gualt. Test. t. 38. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 4. Venus sinuata.

K. II. 4. Die ausgefahlte Venusmuschel.

Testa subcordata, transverse inaequaliter sulcata, sinu antico lato declivi, limbo crenulato.

Die fast herzförmige Schale hat ungleiche Quersfurchen, eine vertiefte Vorderfläche, und einen innwendig feingekerbten Rand.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 131.

Knor. Vergn. V. 14. t. 2. 5. f.

Testa subcordata complanata glabra, sulcis transuersis inaequalibus. Sinus anticus latus introrsum decliuus. Arcola plana. Limbus cre-

Die Schale ist einigermaßen herzförmig, plattgedrückt und glatt, der Quere nach mit ungleichen Furchen versehen. Die vordere  
nula



nulatus. Color pallidus fuscone-  
lofus, radiis obfolotis pallidis.

Vertiefung ift breit und einwärts  
abhängig. Die Hinterfläche ift eben.  
Der innere Rand fein gekerbet. Die  
Farbe braun nebelicht, mit matten  
bleichen Strahlen.

K. II. 5. Venus flexuo-  
fa.

K. II. 5. Die ſchiefe  
Venusmuſchel.

Linn. S. N. Sp. 121.

Teſta cordato triangula,  
transuerſum ſulcata, area ſi-  
nuoſa utrinque carinata, arco-  
la plana.

Die herzförmige dreieckige  
in die Quere gefurchte Scha-  
le hat eine ebene Hinterfläche,  
und eine vertieſte Vorder-  
fläche, die beiderſeits mit ei-  
ner erhabenen Ecke begränzt  
iſt.

Rumph. amb. t. 43. f. O.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 6. Venus Buc-  
cardium.

K. II. 6. Das unäch-  
te Ochſenherz.

Teſta cordata ſolida laevi,  
areolae excauatae veſtigio in-  
diſtincto, limbo integro.

Die herzförmige dichte glatte  
Muſchel iſt an der Hinterfläche  
ausgehöhlet ohne deutlichen  
Eindruck, und am inneren Rand  
de glatt.

D

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata solida, laevis, transuersim tenuissime striata, undique umbonata; retro apices recurvatos contiguos concava, vestigio nec intruso, nec circumscripto. Dentes generi proprii, crassi.

Die dicke herzförmige glatte nach der Quere sehr fein gestreifte Schale ist allenthalben bündig; hinter den rückwärts gebogenen Spitzen, die einander berühren, ausgehöhlet, ohne deutlichen Eindruck oder Einfassung. Die Zähne sind dick und nach der Art des Geschlechtes beschaffen.

K. II. 7. Venus Chione.  
ne.

K. II. 7. Die Spiel-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 125.*

*Belg. De Speel doublet. Gall. Came marquée de verges.*

Testa cordata glabra, transuersim obsolete sulcata, pallide radiata, arcola plana.

Die herzförmige glatte nach der Quere schwach gefurchte Schale ist mit blassen Strahlen und einer kleinen platten Hinterfläche versehen.

*Gualt. Test. t. 86. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. C.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 1. f.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 1. f.*

K. II. 8. Venus maculata.

K. II. 8. Die Algamus-  
schel.

*Linn. S. N. Sp. 126.*

*Belg.*



Belg. D'achaat - gaaper. Angl. The Agate chama. Hill. Gall. Camé truitée. Dav.

Testa cordata glabra, maculis dispersis inaequalibus; ale hat zerstreute ungleiche Flecken, und eine keilsförmig eingefasste Hinterfläche.

List. Hist. Conch. I. 3. f. 106.

Gualt. Test. t. 76. f. 7.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. H.

Adans. Seneg. Pl. 17. f. 15.

Regenf. Samml. I. 8. t. 16. f.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Knor. Vergn. II. 28. t. 5. f.

— — — V. 20. t. 4. f.

K. II. 9. Venus Meretricis.

K. II. 9. Die Braunslippe.

Linn. S. N. Sp. 127.

Gall. La Gourgandine. Argenv. Angl. The Smooth egg, truncated Chama Hill.

Testa cordata laevi, antice complanata fusca, labris hiantibus. Die herzförmige glatte Schale ist vorne plattgedrückt braun und mit weit hervorragenden Lippen versehen.



*Argenv. Conch. Pl. 21. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. VI. 6. t. 3. f.*

K. II. 10. Venus mac- K. II. 10. Die Korbvenus.  
troides.

*Belg. Gestraalde Kwaker. Gall. Quacre rayonné.*

Testa triangula umbonata Die dreyeckige bäuchige glat-  
laevi, utrinque complanata; te Schale ist beiderseits platt-  
cardinis dente laterali remoto. gedrückt, und am Schlosse  
mit einem entfernten Seiten-  
zähne versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 85.*

*Knor. Vergn. V. 15. t. 2. f.*

— — — VI. 10. t. 5. f

Testa, similis Mastrae stultorum  
2; triangula subaequilatera laevis,  
transuersim tenuissime striata, utrin-  
que prope apices complanata, pla-  
nis subaequalibus. Apices incurui.  
Dentes primores tres, structura con-  
generum, quibus accedit postice  
lateralis remotus. Color testae  
extus fulvus, radiis albis; apicem  
violaceus.

Die Schale, welche die Gestalt des  
Strahlkorbes hat, ist dreyeckig, beina-  
he gleichseitig und glatt, in die Quere  
fein gestreift, an den Seiten nächst den  
Spitzen mit zweien fast gleich groß-  
en platten Flächen versehen. Die  
Spitzen krümen sich einwärts. Drei  
Mittelzähne sind am Schlosse von  
gewöhnlicher Gestalt, außer wel-  
chen hinten ein entfernter Seiten-  
zahn steht. Die Schale ist außen  
braunroth mit weißen Strahlen,  
an den Spitzen violett.

K. II.



K. II. 11. Venus paradoxa.

K. II. 11. Die blaustreifige Aftervenus.

Testa triangula, solida, utrinque complanata, labris prominentibus.

Die dreysseitige dichte beiderseits zusammengedrückte Schale ist mit hervorragenden Lippen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ponderosa, triangula, laevis, utrinque complanata. Labra porrecta crassa. Dentes cardinis primarii duo, lateralis utrinque unus brevis solidus. Color testae albus, lateribus radiisque latis violaceis.

Die Schale ist schwer, dreyeckig, und glatt, an beiden Seiten platt gedrückt. Die dicken Lippen ragen hervor. Am Schloße sind zween Mittelzähne, und beiderseits ein dicker Nebenzahn. Die Schale ist weiß, mit breiten Strahlen, die Seitenflächen von violetter Farbe.

K. II. 12. Venus castrensis.

K. II. 12. Die Lagermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 129.*

*Belg. De griekische A Doublet. Rumph. Angl. The zizzag Chama. Hill. Gall. L'écriture greque.*

Testa triangulo rotundata, umbonata glabra, characteribus angulatis picta, areola circumscripta plana.

Die rundliche, dreyeckige, bäuchige glatte Schale ist mit eckigen Zierathen bemalt, und mit einer platten eingefassten Hinterfläche versehen.



*Bonan. Recr. el. 3. f. 376.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.*

*Rumph. amb. t. 42. f. K.*

*Gualt. Test. 1. 82. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 3. f. 4. t. 41. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 4. f.*

—— — II. 20. t. 2. f.

—— — VI. 6. t. 5, 6. f.

K. II. 13. Venus Me-  
röe.

K. II. 13. Die weitslip-  
pige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 131.*

*Gall. Le Zig - zog. Dav.*

Testa lata subovata com-  
pressa, transversim striata; sinu  
antico dilatato hiant; limbo  
crenato.

Die breite etwas eiförmige  
flachgedrückte in die Quere ge-  
streifte Schale ist vorne mit ei-  
ner erweiterten klaffenden Ver-  
tiefung versehen, und inwendig  
am Rande mit Kerben besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 321.*

*Argenv. Supp. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 7. t. 2, 4. f.*

K. II. 14. Venus un-  
dulata,

K. II. 14. Die wellen-  
förmige Venus.

Testa



Testa ovali lata, striis transuersis undulatis, planis utrinque lanceolatis.

Die eysförmige breite Schale ist der Quere nach mit runzelichten Streifen, und beiderseits mit lanzetförmigen Flächen versehen.

*Petiv. Gaz. t. 105. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 4. f.*

Testa ovalis complanata lata, glabra, striis transuersis undulatis, ad apices utrinque longitudinaliter complanata, planis laeuibus lanceolatis. Dentes cardinis duo bifidi, tertius indiuifus. Color albus, venis angulatis fuluis, planorum venis transuersis undulatis, rubro purpureis.

Die Schale ist plattgedrückt, breit, glatt, mit wellenförmigen nach der Quere laufenden Streifen umgeben, nächst den Spizen beiderseits nach der Länge flach gedrückt, mit glatten lanzetförmigen Flächen. Am Schlosse sind zween zweyspaltige Zähne, der dritte äußere ist spizig und ungetheilt. Die Farbe ist weiß mit braungelben winkelförmigen Adern, über die Quere der Flächen laufen wellenförmige purpurrothe Adern.

K. II. 15. Venus Calipyga.

K. II. 15. Die weißbackige Venus.

Testa ouata latiuscula, transuerse inaequaliter striata, lineis picta angulatis, areola ovali.

Die eysförmige breite Schale ist der Quere nach mit ungleichen Streifen besetzt, mit winkelförmigen Linien bemalt, und an der Hinterfläche eysförmig.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata latiuscula parumper  
complanata, striis transuersis inae-  
qualibus, picta lineis angulatis,  
sursum conuergentibus, fuscis.  
Areola oualis, impressa, striata.  
Color lutescens; characteribus an-  
gulatis fuscis. Umbones nivi.

Die herzförmige etwas breite  
Schale ist einigermaßen flachgedrückt,  
und in die Quere ungleichförmig  
gestreift. Die winkelförmigen Zi-  
nen, mit welchen sie bemalet ist,  
laufen aufwärts zusammen. Die  
Hinterfläche ist eysförmig, einge-  
drückt und gestreift. Die Schale  
gelblich, die Winkelzüge braun,  
und die Wölbung schneeweiß.

K. II. 16. Venus de-  
florata.

K. II. 16. Die Blau-  
lippe.

Linn. S. N. Sp. 132. ?

Testa lata umbonata ouali,  
longitudinaliter rugosa, lim-  
bo antico intus violaceo.

Die breite bäuchige eysförmige  
Schale ist der Länge nach  
runzelig, und am innwendigen  
Vorderrande violett.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 17. Venus fim-  
briata.

K. II. 17. Die Wafel-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 133.

Belg. Wafelyser Rumph. Angl. Honeycomb Cockle. Pet. Gall. La  
Tricotée. Dav.

Testa lata, umbonata ouali,  
longitudinaliter striata, trans-  
uerse sulcata, margine cre-  
nato.

Die breite bäuchige eysförmige  
Schale ist nach der Länge  
gestreift, in die Quere ge-  
furchet, und am Rande mit  
Kerben versehen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 172.*

*Rumph. amb. t. 43. f. F.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 75. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 18. Venus reticulata.

K. II. 18. Die Gitters Venus.

*Linn. S. N. Sp. 124.*

*Gall. Le Rézeau blanc. Dav.*

Testa subcordata umbonata longitudinaliter striata, cingulis eleuatis membranaceis, limbo crenulato.

Die fast herzförmige bäuchige Schale ist der Länge nach gestreift, mit erhabenen häutigen Keifen, und am inneren Rande mit Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Gualt. Test. t. 77. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 10. t. 1. f.*

K. III. Orbiculatae antice inermes. k. III. Scheibensformige, vorne unbewafnete Venusmuscheln.



K. III. 1. Venus tige-  
rina.

K. III. Die Tiegerzunge.

*Linn. S. N. Sp. 136. 141.*

*Belg. De wilde Tyger-tong. Rumph. Angl. Checker-grained  
cockle, Petiv.*

Testa orbiculata decussatim striata, areola impressa, cordata. Die scheibenförmige Schale ist kreuzweise gestreift, und mit einer eingedrückten herzförmigen Hinterfläche versehen.

*Nuca, limbo praesertim postico roseo. Weiss, und am inneren Rande besonders hinten rosenfärbig.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 69. .*

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 174.*

*Rumph. amb. t. 43. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 18. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 2. t. 1. f.*

— — — VI. 37. t. 2. f.

K. III. 2. Venus con-  
centrica.

K. III. 2. Die Gürtel-  
venus.

*Angl. The girdled Heart Cockle. Petiv.*

Testa orbiculata laevi, striis transuersis concentricis, areola impressa cordata. Die scheibenförmige glatte Schale ist mit gleichabstehenden Zirkelfurchen besetzt, und mit einer eingedrückten herzförmigen Hinterfläche versehen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 99. 102. 104.*

*Petiv. Gaz. t. 16. f. 1. t. 93. f. 15. 18.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbicularis solida, laevis, fulcis transuersis circularibus concentricis. Apices breues recurui. Areola cordiformis impressa. Limbus integerrimus. Color totius testae niueus.

Die scheibenförmige dicke glatte Schale, hat concentrische Quersurken. Die Spitzen sind kurz und rückwärts gebogen. Die Hintersfläche ist herzförmig und vertieft. Der Rand glatt. Die Farbe der ganzen Schale schneeweiß.

K. III. 3. Venus prostrata.

K. III. 3. Die Zirkelscheibe.

*Linn. S. N. Sp. 137.*

Testa orbiculata transuerse striata, antice membranaceo scabra, areola ouata impressa.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist vorne durch erhabene Häute rauh, an der Hintersfläche enfförmig eingedrückt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 4. Venus rinularis.

K. III. 4. Die aderige Venus.

Testa orbiculata, transuerse striata, umbonibus complanatis rugosis, areola plana.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist auf den flachgedrückten Wölbungen durch erhabene Adern runzelicht, und mit einer platten Hintersfläche versehen.

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata gibba, transuerse  
striata; Umbones complanati, ru-  
gis bifariam diuergentibus obsiti.  
Areola plana laeuis. Color pallide  
luteus, areolae fuscus.

Die Schale ist scheibenrund, höckerig, in die Quere gestreift. Die Wölbungen platt gedrückt, und mit Runzeln besetzt, welche nach zweien Seiten auseinander laufen. Die Hinterfläche ist eben und glatt; Die Farbe bleich gelb, die Hinterfläche braun.

K. III. 5. Venus pensylvanica.

K. III. 5. Der Abrikos-  
sen Stein.

*Linn. S. N. Sp. 138.*

*Gall. La Jamaïque. Argenv.*

Testa rotundata, umbonata,  
membranis eleuatis transuer-  
sis, antice sulco utrinque lon-  
gitudinali arcuato, areola im-  
pressa cordata.

Die runde bäuchige Schale ist in die Quere mit erhabenen Blättern umgeben, vorne beiderseits der Länge nach mit einer bogenförmigen Furche bezeichnet, an der Hinterfläche herzförmig eingedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 138.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f N.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 6. Venus incrustata.

K. III. 6. Die punktirte  
Lagervenus.

*Linn. S. N. Sp. 139. ?*

*Belg.*



Belg. Het türkische Leger. Rumph. Angl. The türkische Campe.  
Gall. Le campement turque.

Testa rotundata glabra, striis Die rundliche glänzende  
conuergentibus excauato punc- Schale hat zusammenlaufende  
tatis, areola circumscripta tiefpunktirte Streifen, und  
laui. eine eingefasste glatte Hinter-  
fläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 146.

Regenf. Samml. I. 1. t. 4. f.

K. III. 7. Venus exo-  
lera.

K. III. 7. Die Strahl-  
scheibe.

Linn. S. N. Sp. 142.

Belg. Slet.

Testa lentiformi, transuer- Die linsenförmige in die Quer-  
sim striata, albida, obsoleto re gestreifte weißlichte Schale  
radiata, areola cordata. hat schwache Strahlen und ei-  
ne herzförmige Hinterfläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.

Gualt. Test. t. 75. f. F. G.

Adans. Seneg. Pl. 16. f. 4.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 8. Venus pecti-  
nata.

K. III. 8. Die Kamme-  
venus.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 144.*

*Belg.* Scherfje. *Rumph.* *Angl.* Crofs Cockle *Petiv.* *Gall.* L'Amande *Dav.*

*Testa* rotundata, solida, Die rundliche dicke Schale  
longitudinaliter anticeque ob- le ist der Länge nach, und vor-  
lique costata, costis decussa- ne in die Quere geribbet, über  
tis, limbo crenato. die Ribben gestreifet, und am  
inneren Rande gekerbet.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 148. 149.*

*Rumph. amb. t. 42. f. D.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 72. f. E. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. P.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 3. f.*

*K. IV. Latæ, antice subangulatae, K. IV. Breite, vorne etwas eckig,*  
*inermes. ge, und unbewafnete Venusmuscheln.*

*K. IV. 1. Venus litte-  
rata.*

*K. IV. 1. Die achte  
Echldmuschel.*

*Linn. S. N. Sp. 147.*

*Belg.* De langaagtige Letter-Schulp. *Rumph.* *Angl.* The arabian  
*Shell. Hill. Gall.* L'écriture arabique. *Argenv.*

*Testa lata ouata, antice an- Die breite, eiförmige, vorne  
gulata, striis transversis und- eckige Schale hat wellenförmige  
latis. ge Querstreifen.*

*Picta.*



Picta saepe lineis angulatis.

Defters mit liniensförmigen Win-  
felzügen bemalt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 67.*

*Rumph. amb. t. 43. f. B.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 2.*

*Valent. Abb. 13. t. 6. f. 14. t. 10 — 13. f.*

*Gualt. Test. t. 86. f. E. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 39. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 4. f.*

—— — II. 28. t. 4. f.

## L. Spondylus.

## L. Die Klappmuschel.

*Linn. S. N. Gen. 310.*

Testa inaequalis, car-  
dinis dentibus duobus cras-  
sis, cum scrobiculo inter-  
medio.

Die Schale besteht aus  
ungleichen Klappen, am  
Schloße sind zweien dicke  
Zähne, zwischen eine Gru-  
be.

L. I. Spondylus Gae-  
deropus,

L. I. Die gezackte Klapp-  
muschel.

*Linn.*



Linn. S. N. 151.

Belg. Getackte Lazarus-Klappen. Angl. The great prickly Oyster  
Hill. Gall. Nuitre epineuse.

Testa subaurita spinosa, apic-  
um altero longiore secto.

Die stachlichte Schale ist  
einigermassen mit Ohren, und  
einer längeren abgesägten Spitze  
versehen.

α valvis foliaceo spinosis.

α mit blätterichten und dornigen  
Klappen.

β valvis spinosis, spinis elongatis, β mit dornigen Klappen, deren Dör-  
ner lang und stumpf sind.

β mit dornigen Klappen, deren Dör-  
ner lang und stumpf sind.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 20. 21.

Rumph. amb. t. 47. f. E.

Petiv. amb. t. 20. f. 6.

Gualt. Test. t. 100. 101. f. A, B. t. 99. f. F. G.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. B. G. I. M.

Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 37.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Seb. Test. III. t. 88. f. 1—11. t. 89. f. 4—8.

Knor. Vergn. V. 9. t. 1. f. 13. t. 1. f.

— — VI. 9. t. 1. f.

— Delic. nat. I. t. B. IV. 1. f.



L. 2. Spondylus plicatus.

L. 2. Die Faltenklappe.

Linn. S. N. Sp. 153.

Testa subspinosa, transuerse plicata.

Die Schale ist einigermaßen dornig, und in die Quere gefalten.

„ crocea,

„ safransfarbig.

Gualt. Test. t. 99. f. E.

Knor. Vergn. III. 6. t. 1. f.

—— — VI, 12. t. 3. f.

β lutea.

β gelb.

Knor. Vergn. I. 6, t. 3. f.

M. Chama.

M. Die Gienmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 311.

Testa bivaluis absque labris. Cardinis dens callosus, gibbus, insertus fossulae obliquae.

Eine zweiflappige Schale ohne Lippen. Das Schloß hat einen höckerigen schwielenförmigen Zahn, der sich in ein entgegengesetztes Grübchen versenket.

E

M. I.



M. 1. Chama cor.

M. 1. Die Narren-  
kappe.*Linn. S. N. Sp. 154.**Belg. Zotskap. Gall. Coeur de Boeuf. Day. Ital. Bucardia. Ginan.*

Testa cordata subglobosa, Die herzförmige, einigermas-  
laeni, apicibus recurvatis, sen fuglichte glatte Schale, hat  
rima lanceolata hiante. schnirkelförmig zurückgerollte  
Spizen, und eine lanzettförmis-  
ge klappende Vorderspalte.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 88.**List. Hist. Conch. l. 3. f. III.**Rumph. amb. t. 48. f. 10.**Gualt. Test. t. 71. f. E.**Seb. Thes. III. t. 86. f. 1.**Ginan. adr. II. t. 19. f. 129.**Knor. Vergn. VI. 8. t. 1. f.*

M. 2. Chama Gigas. M. 2. Das Waschbecken.

*Linn. S. N. Sp. 155.**Belg. Fonteinbak. Angl. The wife of the Nail - Scalop. Gall.  
La Fautiere, Argenw.*

Testa



Testa lata, plicata, fornica- Die breite gefaltene Schale  
 to squamosa; limbo politico ist mit hohlen Schuppen beset-  
 zt, und an der stumpfen Hin-  
 terfläche mit einer gekerbten  
 Defnung versehen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 83. 84.*

*Rumph. amb. t. 42. f. A. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 92. f. A, G. t. 93. f. B.*

*Argenw. Conch. Pl. 23. f. E.*

*Klein Meth. Ostr. t. 1. f. 53.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 48. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. III. 1. f.*

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 4. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 19, 20.*

M. 3. Chama Hippo- M. 3. Der Pferdefuß.  
 pus.

*Linn. S. N. Sp. 156.*

*Belg. Paardenoetje. Rumph. Angl. The Horse hoofs. Gall. Feuille de  
 Chou. Argenw.*



Testa plicata, squamis spinosis muricata, margine postico obtusissimo, clauso, dentato. Die gefaltene Schale ist mit dornigen Schüppchen besetzt, die stumpfe Hinterfläche ist geschlossen und am Rande gezähnt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 81. 82.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 187. 188.*

*Rumph. amb. t. 42. f. C.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 93. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 1, 2. f.*

—— ——— VI. 9. t. 3. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 10. f.*

M. 4. *Chama antiquata.* M. 4. Die Seemuß.

*Linn. S. N. Sp. 157.*

Testa subcordata, sulcis longitudinalibus, striisque transuersis. Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge gefurchet, und in die Quere gestreift.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 98.*

*Gualt. Test. t. 71. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 3. f.*

M. 5.



M. 5. Chama calycu-  
lata.

M. 5. Die Eichelmu-  
schel.

*Linn. S. N. Sp. 160.*

*Gal. Coeur allongé. Dav.*

Testa lata gibba, subtus  
coarctata, sulcis longitudina-  
libus crenulatis.

Die breite höckerige Scha-  
le ist unten eingebogen, und  
nach der Länge mit gekerbten  
Furchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 184. 185.*

*Gualt. Test. t. 90. f. F.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

M. 6. Chama phreni-  
rica.

M. 6. Die nierenför-  
mige Gienmuschel.

Testa reniformi, sulcis lon-  
gitudinalibus striisque trans-  
uersis, margine postico ser-  
rato, excurrente.

Die nierenförmige nach der  
Länge gefurchte, und in die  
Quere gestreifte Schale hat  
einen rückwärts hervorragenden  
sägeförmigen Hinterrand.

*Valent. Abb. 16. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 7. f.*

Testa reniformis, antice lata, ro-  
undata, postice angustata, supra  
arcuata, infra coarctata; sulci lon-

Die Schale ist nierenförmig, vor-  
ne breit und rundlich, hinten schmal,  
oben bogenförmig erhoben, unten  
geru-



itudinales, transversim striis decussati. Areae, areolaeque vestigium nullum. Apices subterminales recurui. Margo anticus complanatus, inferior introrsum excavatus, retrorsum in formam lobi excurrent, limbo crenato. Dentes duo crassi, posticus brevis, anticus elongatus curvatus. Ligamentum validum crassum, exviridi flavoque resplendens. Color rufus, postice prope apices] albus. Cavitas alba, limbo externo fusco.

eingedrückt. Die nach der Länge laufenden Furchen sind mit Querstreichen durchgezogen. Weder am Vorder- noch am Hinterrande zeigt sich eine merkliche Fläche. Die Spitzen sind rückwärts gekrümmt, und stehen nahe an dem einen Ende. Der Vorderrand ist flach gedrückt, der untere einwärts ausgehöhlet, und verläuft sich rückwärts in einen lappenförmigen Fortsatz. Der innere Rand ist gekerbet. Am Schlosse sind zweien starke Zähne, davon der vordere kürzer, der hintere verlängert und gekrümmt ist. Das dicke starke Band hat im Bruche einen grüngelben Glanz. Die Schale ist außen braunroth, hinter den Spitzen weiß. Die Höhlung weiß, am äußeren Rande braun.

M. 7. Chama Lazarus.

M. 7. Die Muskatensblütze.

Linn. S. N. Sp. 164.

Belg. Foelie Bladeren. Gall. Gateau feuilleté.

Testa lamellis patentibus, Die Schale ist mit ausgebreiteten krausen Blättern besetzt, mit einer schiefen und fast schnirkelförmigen Spitze.

Rumph. amb. t. 48. f. 3.

Seb. Thes. III. t. 89. f. 5, 6, 9, 11.

Knor. Vergn. I. 8. t. I. f.

Mus. Caes. Vindobon.

M. 7.



M. 8. Chama gryphoides. M. 8. Die Felsengien-  
muschel

*Linn. S. N. Sp. 165,*

*Belg.* The ockergeele Oester. *Gall.* Huître écailleuse a feuilles de couleur de citron. *Argenv.*

Testa orbiculari muricata, Die scheibenrunde rauhe  
ualua altera planiore, altera Schale hat eine flache, und  
productiore subspirali. eine beinahe schnirkelförmig ver-  
längerte Schale.

*Bonap. Recr. cl. 2. f. 22.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 47. 53.*

*Gualt. Test. t. 101. f. C — I.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.*

*Regenf. Samml. l. 4. t. 44. f.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 2. f.*

—— — VI. 16. t. 1. f.

M. 9. Chama Arcinella. M. 9. Der dornige  
Pferdhuf.

*Linn. S. N. Sp. 167.*

*Belg.* Rotz doublet,



Testa spinosa, sulcis longitudinalibus, excauato punctatis; areola postica papillosa, intrusa. Die stachelige Schale ist nach der Länge mit hohlpunktirten Furchen besetzt, und hinten mit einer warzigen eingedrückten Fläche versehen.

Knor. Vergn. IV. 14. t. 1. f.

— — VI. 36. t. 1, 2. f.

## N. Arca.

## Die Arche.

Linn. Syst. Nat. Gen. 312.

Testa bivalvis, cardine articulo, dentibus numerosis, alternatim infertis. Die zweiflappige Schale hat an dem Schlosse eine Reihe vieler wechselweise ineinander passender Zähne.

N. I. Margine integro; apicibus recurvis. N. I. Mit ganzen Rande und zurückgekrümmten Spitzen.

N. I. 1. Arca tortuosa. N. I. 1. Die gedrehte Arche.

Linn. S. N. Sp. 168.

[ Belg. Gedraaide Oester. Rumph. Angl. Twisted Lighter. Petiv. Gall. La Bistournée. Dav.

Testa inaequali, oblique parallelipeda, striata, valvula sinistra carinata, apicibus recurvis, margine integro. Die Schale hat die Gestalt eines gedrehten Parallelepipedums. Die Klappen sind gestreift, davon die linke eine keilsförmige Schneide hat. Die Spitzen sind rückwärts gerollt, der Rand ganz.



*Rumph. amb. t. 47. f. K.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 95. f. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 3. f.*

N. II. Margine integro, apicibus inflexis. N. II. Mit ganzem Rande, und einwärts gekrümmten Spizen.

N. II. I. Arca Noae. N. II. I. Die Arche Noah.

*Linn. S. N. Sp. 169.*

Belg. De rechte Noachs - Ark. *Rumph. Angl. Noachs - Lighter* *Petiv. Gall. L'Arche de Noe. Dav.*

Testa transuersa, nauculari, rhombea, striata, antice compressa, retusa, apicibus incuruatis remotissimis, margine integro, subtus hiant. Die Schale ist gestreckt, hat eine schiefartige rautenförmige Gestalt, ist gestreift, vorne zusammengedrückt und stumpf. Die Spizen sind einwärts gerollet, von einander weit entfernt; der Rand ganz und unten klaffend.

*Aldrov. Test. l. 3. t. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 32.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 208. 209.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 10.*



*Rumph. amb. t. 44. f. P.*

*Gualt. Test. t. 87. f. H. H. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 73. f.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. V, 2. f.*

— *Vergn. I. 16. t. 1. 2. f.*

*Martin. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 5. f.*

N. II. 2. Arca barbata. N. II. 2. Die Bartar-  
che.

*Linn. S. N. Sp. 170.*

*Belg. Arcke Noachs Soort. Mus. Oud. Angl. The coated Muscle.*  
*Hill. Gall. Amande à cils. Dav. Ital. Cozze, Bonan.*

<p>Testa transuerfa, striis bar- batis, apicibus incuruis ap- proximatis, margine integro, subtus hiantē.</p>	<p>Die Schale ist gestreckt, an den Streifen langharig; die Spi- zen sind einwärts gerollt, und aneinander genähert, der Rand ganz, und unten klappend.</p>
---	---

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 79.*

*Gualt. Test. t. 91. f. F.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. M.*

*Ginan. adr. II. t. 23. f. 160.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 9.*

*Knor.*



*Knor. Verg. II. 27. t. 7. f.*

*Murr. Fund. Testac. t. 2. f. 22.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 8. f.*

N. III. Margine crenato, apicibus recurvatis. N. III. Mit gekerbtem Rande, und eingerollten Spitzen.

N. III. I. Arca anti-  
quata.

N. III. I. Die Bastart-  
arche.

*Linn. S. N. Sp. 174.*

*Belg. Maagt Bloem. Rumph. Angl. Virgin Ark. Petiv. Gall. Coeur en Arche de Noe. Favart.*

Testa oblique cordata, sulcato striata, area cardinis rhomboidali, antrorsum elongata.

Die Schale ist schiefherzförmig, mit gestreiften Furchen besetzt, die Angelfläche rautenförmig, vorne lang zugespitzt.

<sup>a</sup> Testa transversim striata, antrorsum angulata, compressa, area cardinis plana.

<sup>a</sup> Die Schale ist über die Quere gestreift, vorne eckig und zusammengedrückt. Die Angelfläche eben.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 73.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 70.*

*Gualt. Test. t. 87. f. B.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 3. 4. f.*



- β Testa costis decussatim striatis, β Die Ribben sind kreuzweise gestreift, der Vorderrand ist etwas antice subexcurrente, rotundata, verlängert und rundlicht, die area introrsum declivi. Schloßfläche gegen die Mitte abhángig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 44. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 87. f. A. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 8.*

*Murray. Fund. Testac. t. 2. f. 15.*

*Mart. Berl. Beschaeft. III. 6. t. II. f.*

N. III. 2. Arca rhombea.

N. III. 2. Das Rauteuförbchen.

Testa cordata, multisulcata, Die herzförmige Schale hat costis mediis transversim viele Furchen, die Ribben sind striatis, apicibus incurvatis in die Quere gestreift, die remotis, area cardinis rhombea. Spizen einwärts gerollt, und die Angelfläche rautenförmig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 75.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 2. f.*

Testa cordata, aequivalvis, longitudinaliter sulcata, costis 26. in- Die Schale ist herzförmig, gleichklappig, nach der Länge gefurchet, mit 26. Ribben, davon die mittleren in die Quere gestreift sind. inter-



interjecta plana, vere rhombea, lineis incilis rhomborum concentricorum figuram exacte referentibus; ligamentum membranaceum aream obtegens, incisuras lineares explens. Sutura cardinis intus armata dentibus minutis, diagonalem aream majorem constituit.

Die Spitzen sind einwärts gerollt, etwas zurückgekrümmt, und von einander entfernt. Die dazwischen liegende Angelsfläche ist genau rautenförmig, auf welcher gleichfalls rautenförmige in einander liegende Linien ausgeschnitten sind. Das häutige Band bedeckt die ganze Angelsfläche und versenket sich in die ausgeschnittenen Rautenlinien. Die Naht des Engels bildet die größere Diagonallinie, und ist inwendig mit einer Reihe kleiner Zähne besetzt.

N. III. 3. Arca decussata.

N. III. 3. Die gefleckte Ruchenschel.

Linn. S. N. 177.

Gall. Furie flamboyante; Favart.

Testa orbiculari conuexa, glabra, sulcis longitudinalibus, striisque transversis obsoletis, fusco maculata, apicibus incurvis, limbo acute crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, glänzend, mit schwarzen Furchen der Länge nach, und feinen Streifen über die Quere besetzt; auf der Oberfläche braun gefleckt. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt. Der innere Rand hat scharfe Kerben.

Habitus A. pilosae, cujus forte varietas.

Sie hat die Gestalt der Sammtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 82.

Bonam. Rœr. cl. 2. f. 60.

Knor.



*Knor. Vergn. VI. 14. t. 4. f.*

N. IV. Margine crenato, apicibus inflexis.

N. IV. Mit gekerbten Rande und einwärts gekrümmten Spitzen.

N. IV. 1. Arca Pectunculus.

N. IV. 1. Die gestrahlte Kuchenschel.

*Linn. S. N. Sp. 180.*

*Belg. Geribde Poffer - doublet. Dav. Angl. Spotted Ark.*

*Mus. Leers. Gall. Petoncle sans oreilles.*

Testa orbiculari, complanata, sulcata, radiata, transuersim rugosa, apicibus incurvis, area declivi lanceolata, limbo plicato.

Die Schale ist rund und etwas platt, mit strahligen Furchen und nach der Quere laufenden Runzelstreifen. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt, die Angelfläche schmal, gegen die Mitte abhängig; der innere Rand gefalten.

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 129.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 73.*

*Knor. Vergn. V. 12. t. 4. f.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 3, 4. f.*

N. IV. 2. Arca pilosa.

N. IV. 2. Die Samtmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 182.*

*Belg. See Noot. Angl. Cockle with heavy streaks. Petiv. Gall. Noir de Mer Argen. Ital. Musculo hirsuto. Mus. Moscard.*

Testa



Testa rotunda, umbonata, longitudinaliter tenuissime striata, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale ist rund, bauchig, der Länge nach sehr feinst gestreift, die Spizen einwärts gekrümmt, der innere Rand gekerbet.

$\alpha$  holosericea, fusca.

$\alpha$  mit sammtartigen Ueberzug, von brauner Farbe.

$\beta$  glabra, fulva.

$\beta$  mit glatter gelbbrauner Schale.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 80.*

*Petiv. Gaz. t. 95. f. 7.; t. 74. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 73. f. A.*

*Knor. Vergn. VI. 12. t. 4. f.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 1. f.*

#### N. IV. 3. Arca scripta.

#### N. IV. 3. Die gezeichnete Kuchenmuschel.

Testa orbiculari convexa laevi, lineis angulatis fulvis picta, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, von glatter, und mit gelbbraunen Winkelzigen bemahlter Oberfläche. Die Spizen sind einwärts gekrümmt, der innere Rand gekerbet.

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 80.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa conuexa laevis, striis longitudinalibus tenuissimis, ut in A. pilosa, cujus forte varietas est. Area declivis, angustata; Cardo rectus linearis. Dentes intus 20 in arcum digesti, extimi utrinque crassiores. Ambitus orbicularis. Limbus crenatus.

Die Schale ist gewölbt, und der Länge nach wie die Sammtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist, sehr zart gestreift. Die Schloßfläche ist einwärts abhângig, und schmal. Die Schloßlinie gerade. Inner derselben stehen 20 Zähne in bogenförmiger Stellung. Der Umfang ist zirkelrund. Der innere Rand gekerbt.

## O. Ostrea.

## O. Die Auster.

Linn. Syst. Nat. Gen. 313.

Testa bivalvis, subaurita; Cardo edentulus, fossula media excavata ovali, striis lateralibus transversis.

Die zweyflappige Schale ist einigermaßen gekrümmt. Das Schloß ist ohne Zahn, in der Mitte mit einem ausgehohlten schalenförmigen Grübchen, an den Seiten mit Querstreifen versehen.

O. I. Pectines auriculis aequalibus.

O. I. Kammuscheln mit gleichseitigen Ohren.

O. I. I. Ostrea maxima.

O. I. I. Die Pilgrimsmuschel.

Linn. S. N. Sp. 185.

Belg.



Belg. St. Jacobs Schulp. Rumph. Angl. St. James Shell. Gall.  
Conque de St. Jacques bariolée. Argeny. Itdl. Capa santa.

Testa inaequivalui , radiis Die ungleichseitige Schale  
roduntatis , longitudinaliter hat rundliche nach der Länge  
striatis, gestreifte Schalen.

List. angl. t. 5. f. 29.

— Hist. Conch. l. 3. f. 163.

Gualt. Test. t. 98. f. A. B.

Regenf. Samml. I. 2. t. 19. f.

Knor. Vergn. I. 14. t. 1, 2. f.

— — II. 14. t. 1. f.

O. I. 2. Ostrea Jaco- O. I. 2. Die Jakobs-  
baea. muschel.

Linn. S. N. Sp. 186.

Belg. Spaansche St. Jacobs doublet. Gall. Coquille de St. Jacques  
d' Espagne.

Testa inaequivalui , radiis Die ungleichklappige Scha-  
rectangulis , longitudinaliter le hat geradwinklichte, nach  
sulcatis. der Länge gefurchte Strahlen.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 3, 4.

Gualt. Test. t. 99. f. B.

Ginan. adr. II. 1. 16. f. 123.

F

Regenf.



*Regenf. Samml. I. 7. t. 3. f.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. I. f.*

O. I. 3. Ostrea Ziczac.

O. I. 3. Die Neptunsdose.

*Linn. S. N. Sp. 187.*

*Belg. Joppe doublet.*

Testa inaequali, radiis (18) complanatis, plicis le hat (18) plattgedrückte Strahlen, mit gedoppelten Falten am inneren Rand.

*Regenf. Samml. I. II. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 3. f. 20. t. I. f.*

O. I. 4. Ostrea Pleuronectes.

O. I. 4. Die Kompassmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 190.*

*Belg. Kompass-Schulp. Angl. The thin Scallop. Hill. Gall. L'Ecu-tail. Dav.*

Testa aequali orbiculata laevi, radiis internis (24) geminatis. Die gleichklappige scheibenförmige, runde glatte Schale, hat innerlich (24) gepaarte Strahlen.

Color operculi rufus, fornicis albus. Der Deckel ist braunroth; die gewölbte Klappe weiß.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 45. f. A. B.*

*Petiv. Gaz. t. 49. f. 13.*

—— *amboin. t. 17. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 73. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. G.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 30.*

*Hill. Hist of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 3. 4. f.*

O. I. 5. Ostrea Radula. O. I. 5. Die Jägertasche.

*Linn. S. N. Sp. 191.*

*Belg. Jaegers Weytasch. Angl. Common Amboina Scallop. Petiv. Gall. Gibeciere en Manteau.*

Testa subaequali ovali, Die einigermaßen gleichklappe  
radiis (12) convexis decus- pige eysförmige Schale hat  
sata striatis, auriculis aequa- (12) erhabene kreuzweis ge-  
libus, streifte Strahlen, und gleiche  
große Ohren.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 44. f. A.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 9. t. 4. f.*



O. I. 6. Ostrea Plica.

O. I. 6. Der gewölkt  
Mantel.*Linn. S. N. Sp. 192.**Angl. The little yellow Scallop. Hill.*

Testa aequivalui glabra, Die gleichklappige glatt  
radiis (6) conuexis glabris, Schale hat (6) erhabene kreuz  
decussatim striatis. weiß gestreifte Strahlen.

*Rumph. amb. t. 44. f. O.**Argenv. Conch. Pl. 24. f. C.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.**Knor. Vergn. V. 10. t. 5. 6. f.*O. II. Pectines auriculis inaequa-  
libus, altera excisa, scabra.O. II. Rammuschel mit unglei-  
chen Ohren, deren eines ausge-  
schnitten und rauh ist.

O. II. 1. Ostrea Pallium.

O. II. 1. Der Königs-  
mantel.*Linn. S. N. Sp. 193.**Belg. Königs-Mantel. Angl. The Ducal Mantle Scallop. Gall.  
Manteau ducal.*

Testa aequivalui rotundata, Die gleichklappige rundliche  
radiis 12. obtusis striata, squa- Schale hat 12. stumpfe, ge-  
misque imbricata. streifte, und mit ziegelförmigen  
Schuppen bedeckte Strah-  
len.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. B. C.*

*Gualt. Test. t. 71. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. 7*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 59. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 2. f.*

—— — II. 21. t. 1, 2. f.

—— — V. 27. t. 2. f.

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 1. f.*

O. II. 2. *Ostrea nodosa.* O. II. 2. Die Korallen-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 194.*

*Belg. Koraal - doublet. Rumph. Gall. La Coralline. Dav. Angl*  
*The Coral Scallop. Hill.*

*Testa aequivalui, radiis* Die Strahlen der gleichklap-  
*convexis, sulcatis, nodoso* pigen Schale sind erhaben, ge-  
*articulatis.* streifet, und mit knotigen Bu-  
cheln unterbrochen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 24.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 91. f. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. F.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. IV. 13. t. 5. f.

Spengl. berlin. Beschæft. II. 13. t. 12. f.

O. II. 3. Ostrea elongata.

O. II. 3. Der lange Mantel.

Testa ovato elongata, longitudinaliter striata, radiis (8) transuersim rugosis, auricula altera minima.

Die eysförmige verlängerte und der Länge nach gestreifte Schale hat (8) in die Quere gerunzelte Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata, elongata, planiuscula subpellucida; striae elevatae longitudinales; costae 8. transuersim rugosae. Margo repandus plicatus. Auriculae inaequales supra muricatae, altera minima. Color pallide incarnatus.

Die Schale ist eysförmig, verlängert, flach und halb durchsichtig. Nach der Länge laufen erhabene Streifen. Die acht Rippen sind runzelicht. Der Rand ist ausgescheidet und gefaltet. Die ungleichen Ohren, deren eines sehr klein ist, sind oben raub. Von blasser fleischrother Farbe.

O. II. 4. Ostrea sulcata.

O. II. 4. Der gefurchte Mantel.

Testa aequivalui rotundata, longitudinaliter striata, radiis

Die gleichklappige rundliche Schale ist nach der Länge ge-



(12), auriculis subaequalibus. streifet, mit (12.) strahligen Ribben und einigermaßen ungleichen Ohren versehen.

α albo fuscoque maculata,

α Weiß und braun gefleckt,

β tota flava.

β ganz gelb.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subpellucida rotundata, connexa, aequivalvis, striis arcuatis longitudinalibus; Costis duodecim radiatis. Auriculæ fere aequales latæ.

Die Schale ist rundlich, bündig und halb durchsichtig; die Klappen von gleicher Größe, mit gedrängten nach der Länge laufenden Streifen besetzt. Die Ohren sind bet nahe gleich und breit.

O. II. 5. Ostrea cinnabarina.

O. II. 5. Der bandirte Mantel.

Belg. Gebanderde Mantel. Gall. Manteau bandé.

Testa aequivalvi, radiis numerosis inaequalibus, transversim rugulosis.

Die gleichklappige Schale ist mit sehr vielen ungleichen, und in die Quere gestreiften Strahlen versehen.

Gualt. Test. t. 73. f. C.

Regenf. Samml. I. 3. t. 36. f. 4. t. 38. f.

Knor. Vergn. V. 15. t. I. f.



Testa rotundata, magna, conuexiuscula, aequivaluis, longitudinaliter multifulcata; Radii numerosi inaequales, striis transversis undulatis decussati; Auricula altera latior, antice excisa, margine ciliato. Color extus cinnabarinus, cingulis aliquot pallidis.

Die rundliche große, etwas häu-  
chige und gleichflappige Schale ist  
der Länge nach gefurchet. Die häu-  
figen Strahlen sind ungleich, und  
mit wellenförmigen Querstreifen  
durchkreuzet. Ein Ohr ist breiter,  
vorne ausgeschnitten, und am Ran-  
de rau. Die ganze Schale ist aus-  
wendig zinnoberroth mit blassen  
Querzeilen.

O. II. 6. Ostrea mi-  
niata.

O. II. 6. Der men-  
ningrothe Mantel.

Testa inaequivalui multi-  
striata scabra, auriculis sub-  
aequalibus.

Die ungleichflappige Scha-  
le hat sehr viele raube Streife,  
und beinahe gleiche Ohren.

*Mus. Cæs. Vindobon.*

Testa rotundata, striis longitu-  
dinalibus numerosis muricatis. Val-  
vae inaequales, altera plana, altera  
conuexa, excrecentiis transversis  
lameloso laceris. Auriculae sub-  
aequales, altera excisa margine ci-  
liato. Color albus maculis con-  
fluentibus miniatis.

Die rundliche Schale ist der Län-  
ge nach mit rauhen Streifen ver-  
sehen. Die Klappen sind ungleich,  
deren eine flach, die andere erhaben,  
und in die Quere mit krausen  
Blättern besetzt ist. Die Ohren  
sind beinahe gleich, eines ausge-  
schnitten, und am Rande rau.  
Die Farbe ist weiß mit zusam-  
hängenden menningfarbigen Flecken.

O. II. 7. Ostrea varia.

O. II. 7. Der bunte  
Mantel.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 199.*

*Belg. Gellipelte Mantel. Gall. Manteau pointillé.*

Testa aequalivalui, radiis (30) fabris, auricula altera minima. Die gleichklappige Schale hat (30) rauhe Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

α cinnabarina, maculis albidis violaceisque. α zinnoberfarbig mit weißen und violeten Flecken.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 2. f.*

♂ atro violacea.

♂ schwarz violet.

γ alba nebulis violaceis.

γ weiß mit violeten Flecken.

δ lutescens, fuscoque varia.

δ gelblich, und braun gefleckt.

*Gualt. Test. t. 74. f. R.*

*Knor. Vergn. II. 18. t. 3. f.*

— — V. 11. t. 3. f.

O. II. 8. Ostrea glabra. O. II. 8. Der glatte Mantel.

*Linn. S. N. Sp. 201.*

Testa aequalivalui, radiis (10) laevis, planiusculis, striis internis eleuatis, duplicatis. Die gleichklappige Schale hat (10) glatte etwas flache Strahlen, und innwändig erhabene gedoppelte Streifen.

F 5

α flaua



$\alpha$  flava.

$\alpha$  gelb.

$\beta$  nigra.

$\beta$  schwarz.

Gualt. Test. t. 73. f. H.

Regenf. Samml. I. 1. t. 10. f.; 8. t. 15. f.

Knor. Vergn. I. 8. t. 5. f.

O. III. 9. Ostrea maculata.

O. III. 9. Der gefleckte Mantel.

Testa aequivalui, longitudinaliter striata, radiis (10) conuexis.

Die gleichklappige Schale ist nach der Länge gestreift, und mit (10) erhabenen Strahlen versehen.

Regenf. Samml. I. 3. t. 30. 31. f.

Knor. Vergn. II. 18. t. 5. f.

Testa aequivaluis conuexa glabra, longitudinaliter striata; Costae (10) conuexae. Auriculae subaequales. Color supra ex albo fuscoque nebulosus.

Die gleichklappige bäuchige glatte Schale ist der Länge nach gestreift. Die (10) Strahlrippen sind erhaben. Die Ohren fast gleich. Die Farbe ist weiß, und braun wollicht.

O. II. 10. Ostrea coarctata.

O. II. 10. Das Schüsselfchen.

Testa conuexa glabra, radiis (6) conuexis, margine coarctato.

Die bäuchige glatte Schale hat (6) erhabene Strahlen und einen eingesakten Rand.



Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

Knor. Vergn. II. 21. r. 5. f.

Testa convexa tenuis glabra, longitudinaliter obsolete striata. Radii (6) convexi crassi. Margo deorsum flexus undique coarctatus; Limbus crenulatus. Auriculæ inaequales; hinc distincta ab O. Plica.

Die bühliche dünne glatte Schale ist der Länge nach mit matten Streifen versehen. Die (6) Strahlen sind erhaben und dick. Der Rand ist mit einer Stulpe eingefast und innwändig gekerbt. Die Ohren sind ungleich, wodurch sich diese Art von dem gewölkten Mantel unterscheidet.

O. II. 11. Ostrea solaris.

O. II. 11. Der goldgelbe Mantel.

Testa rotundata glabra, radiis (20) convexis, sulcis longitudinaliter striatis.

Die rundliche glatte Schale hat (20) erhabene Strahlen, und nach der Länge gestreifte Zwischenfurchen.

Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

Mus. Caes. Vindobon.

Valua complanata rotundata, radiis (20) convexis laevibus, sulcis intermediis obsolete striatis. Auriculæ subaequales? Color vividissimus aurantiacus.

Die Klappe ist rund und flach gedrückt, die (20) Strahlen sind erhaben und glatt. Die Zwischenfurchen matt gestreift. Die Ohren etwas ungleich. Die Farbe ist ein lebhaftes goldgelb.

O. II. 12. Ostrea opercularis.

O. II. 12. Die scharfrübbige Kammuschel.

Linn.



Linn. S. N. Sp. 136. 202.

Belg. Oranje Mantel. Gall. Manteau d'Orange.

Testa rotundata, radiis (20) Die rundliche Schale hat  
carinatis, decussatim striato (20) kiefelförmige, und durch  
scabra, operculo conuexiore. Querstreife durchkreuzte Strah-  
len; und einen etwas bäuchig-  
gen Deckel.

Knor. Vergn. II. 3. t. 2. 3. f.

Regenf. Samml. I. 2. t. 17. f.

O. II. 13. Ostrea Nu-  
cleus.

O. II. 13. Der Stein-  
fern.

Testa aequivalui, radiis (20) Die gleichklappige, beider-  
conuexis glabris, valua utra- seits bäuchige Schale hat (20)  
que conuexa. erhabene glatte Rippen.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa rotunda aequivaluis costis  
elevatis (20), sulcis intermediis  
latis transverse sulcatis. Auriculae  
subaequales. Valua utraque umbo-  
nata, albo fuscoque nebulosa.

Die rundliche gleichklappige Schale hat (20) erhabene Strahlrippen-  
und breite nach der Quere gestreifte  
Zwischenfurchen. Die Ohren sind  
beinahe gleich. Beide Klappen  
bäuchig, von weiß und braun ge-  
wölfter Farbe.

O. II. 14.

O. II. 14. *Ostrea gibba*.

O. II. Die gewölbte Dose.

*Linn. S. N. Sp. 203.**Belg. Adama Doublet.*

Testa aequivalui, radiis  
(24) subangulatis, sulcis  
intermediis decussatim striatis,  
valua utraque conuexa.

Die gleichflappige, beider-  
seits bänchige Schale hat (24)  
einigermaßen eckige Strahlen,  
die mit Querstreifen durchkreuz-  
et sind.

*Brown. Hist. of. Fam. t. 40. f. 10.**Regenf. Samml. I. 2. t. 16. f.**Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

— — — II. 5. t. 4. f.

O. II. 15. *Ostrea py-  
xidata*.O. II. 15. Die gefurch-  
te Dose.

Testa inaequivalui, radiis  
(32) conuexis laevis. Val-  
ua altera plana.

Die Schale, welche aus  
einer bänchigen, und einer fla-  
chen Klappe bestehet, hat (32)  
erhabene glatte Strahlen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, radiis (32) con-  
uexis laevis. Valua una plana,  
altera conuexa, prope auriculam  
excisam ciliata. Color albus, fu-  
seo carneoque variegatus.

Die rundliche Schale hat (32)  
erhabene glatte Strahlen. Eine  
Klappe ist flach, die andere bän-  
chig und nächst dem ausgeschnitte-  
nen Ohre rauh. Weiß mit  
fleischrothen Flecken.

O. II.



O. II. 16. Ostrea undata.

O. II. 16. Die wellenförmige Tasche.

Testa aequivalui ovata, radiis (18) convexus, sulcis transuersim striatis.

Die gleichklappige Schale hat (18) erhabene Strahlen, mit nach der Quere gestreiften Zwischenfurchen.

Knor. Vergn. II. 4. t. 2. 3. f.

Valvae solitariae ovatae, radiis (18-20) convexus glabris, striis transuersis intercostalibus. Color albus, maculis transuersis undatis sulcis.

Die einzelnen Klappen haben (18-20) erhabene Strahlen, und in die Quere gestreifte Zwischenfurchen. Die Farbe ist weiß mit wellenförmigen braunen Querstreifen.

O. III. Petines cardine subobliquo, auricularis breuibus, acutis.

O. III. Rammuscheln mit etwas schiefen Schloße, und kurzen spitzigen Ohren.

O. III. 1. Ostrea fasciata.

O. III. 1. Die Eismuschel.

Linn. S. N. Sp. 204.

Testa aequivalui gibba, radiis (20) tenuibus scabris, cardine obliquo, auriculis acutis.

Die gleichklappige höckerige Schale hat (20) dünne rauhe Strahlen, ein schiefes Schloß, und spitzige Ohren.

Gualt.



Gualt. Test. t. 74. f. E. E. ?

Mus. Caes. Vindobon.

O. III. 2. Ostrea Lima, O. III. 2. Die Feile.

Linn. S. N. 206.

Belg. Rasp. Doublet. Rumph. Angl. Grater Scallop. Petiv. Gall. Ratifsoir. Argenv.

Testa aequivalui, antice com- Die gleichflappige vorne  
planata, radiis (22) forni- flachgedrückte Schale hat (22)  
cato squamosis, cardine ob- mit rinnenförmigen Schuppen  
liquo, auriculis inaequalibus. besetzte Strahlen, ein schiefes  
Schloß, und ungleiche Ohren.

List. Hist. Conch. t. 3. f. 14.

Rumph. amb. t. 44. f. D.

Petiv. amb. t. 8. f. 4.

Argenv. Conch. Pl. 24. f. E.

Knor. Vergn. VI. 34. t. 3. f.

O. III. 3. Ostrea bul- O. III. 3. Die Bla-  
lata, sentasche.

Testa ovata aequivalui um- Die gleichflappige enförmis-  
bonata, sulcis longitudinali- ge bäuchige Schale hat (22)  
bus (32); cardine transuer- nach der Länge laufende Fura-  
so, auriculis aequalibus. chen, einen schiefen Rand, und  
gleiche Ohren.

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblongo ovata, tumida, fulcis (32) longitudinalibus. Umbones attenuati in apices breves recurvos. Cardo transversus. Latus media lata. Auriculae utrinque acutae aequales. Color albus.

Die eiförmig längliche aufgebläse Schale hat (32) nach der Länge laufende Furchen. Die Wölbungen verdünnen sich in kurz, rückwärts gekrümmte Spizen. Das Schloß steht schief. Die Höhlung in der Mitte derselben ist breit. Die Ohren sind spizig, und einander gleich. Von weißer Farbe.

O. III. 4. *Ostra scabra.*

O. III. 4. Die rauhe Tasche.

Testa ovata complanata, striis longitudinalibus deorsum scabris, auriculis inaequalibus, altera emarginata.

Die eiförmige zusammenge-drückte Schale hat nach der Länge laufende abwärts rauhe Strahlen, und ungleiche Ohren, deren eines eingesäumt ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 13.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. 5. f.*

Testa ovata compressa; striae longitudinales numerosae, deorsum ad tactum scabrae. Cardo subobliquus. Auriculae inaequales, minore emarginata, inter quas testa hiat. Color niveus.

Die enlange zusammenge-drückte Schale ist nach der Länge mit sehr vielen Ritzeln besetzt, und hinabwärts rauh anzufühlen. Das Schloß steht etwas schief. Die Ohren sind ungleich, deren kleineres eingesäumt ist, zwischen welchen die Schale klapet. Von schneeweißer Farbe.

O. IV.



O. IV. Rudes. Ostreae,

O. IV. Rauhe, eigentliche Austern.

O. IV. 1. Ostrea Mal-  
leus.O. IV. 1. Der polni-  
sche Hammer.*Linn. S. N. Sp. 207.**Belg. Mes hamer. Rumph. Angl. The Hammer - Oyster. Hill. Gall.  
Le Marteau. Dav.*Testa rudi flexuosa trilo-  
ba, lobis transuersis opposi-  
tis,Die rauhe gedrehte Schal-  
le besteht aus drey Lappen, des-  
sen zweien einander entgegen  
gesetzt sind.*List. Hist. Conch. l. 3. f. 54.**Rumph. amb. t. 47. f. A.**Petiv. amb. t. 20. f. 10.**Gualt. Test. t. 96. f. D. E.**Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 14.**Seb. Thes. III. t. 91. f. 4. 5. t. 93. f. 12.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Argenv. Conch. Pl. 19. f. H.**Knor. Vergn. III. 4. t. 1. f.**Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 2. t. 2. f.*O. IV. 2. Ostrea Fo-  
lium.O. IV. Das Lorbeer-  
blatt.*Linn. S. N. Sp. 209.**Belg. Laurier-blad. Angl. The tree Oyster. Hill. Gall. La Feuille  
du Laurier.*

G

Testa



Testa ouata, margine obtuse plicato, valvae planioris rachi spinosa amplexicauli.

Die eyrunde am Rande stumpf gefaltene Schale hat an der flächeren Klappe eine stachlichte klauenförmige Mittelribbe.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 32.*

*Rumph. amb. t. 47. f. A.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 22.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 2. f.*

O. IV. 3. Ostrea cristata.

O. IV. 3. Die Kammer-auster.

Testa rotundata, lamellis imbricatis, margine obtuse plicato, dentato, apice altero porrecto.

Die rundliche Schale ist mit Blättchen ziegelförmig besetzt, am Rande stumpf, und zahnförmig gefalten. Eine Schloßspitze raget hervor.

*Gualt. Test. t. 104. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequalius membranis imbricatis rugolis. Margo repandus, obtuse plicato dentatus. Apex valvae alterius paranticae longior, prominens. Cardinis tendo medius latus conicus. Color albus, maculis dispersis nigris.

Die Schale welche aus ungleichen Klappen bestehet, ist mit runzelichten Blättern ziegelförmig besetzt. Der Rand ausgeschweifet, mit stumpfen zahnförmigen ineinander beißenden Falten. Die Spitze der aufstehenden Schale ist verlängert, und in die Höhe gestreckt. In der Mitte des Schloßes ist ein breiter kegelförmiger Knorpel. Die Farbe ist weiß mit zerstreuten schwarzen Flecken.

O. IV. 4.

O. IV. 4. *Ostrea edulis*.O. IV. 4. Die gemei-  
ne Auster.*Linn. S. N. Sp. 211.**Belg. Oester. Angl. Oyster. Gall. Huitre. Ital. Ostrea. Gin.**Testa subrotunda complana-  
ta, membranis undulatis im-  
bricata, valvula altera plana  
integerrima.*Die rundliche plattgedrückte  
Schale ist mit runzelichten  
Blättern ziegelförmig bedeckt;  
mit ganzem Rande an der fla-  
chen Klappe.*List. angl. t. 4. f. 21.**Bonan. Recr. cl. 2. f. 70.**List. Hist. Conch. l. 3. f. 195. 196.**Gualt. Test. t. 102. f. B.**Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 21.**Ginan. adr. II. t. 18. f. 127.**Bast. subs. I. t. 8. f. 12.**Knor. Vergn. III. 24. t. 2. f. 25. t. 2. f.*O. IV. 5. *Ostrea denti-  
culata*.O. IV. 5. Die gezäh-  
nelte Auster.*Testa rotundata foliacea,  
valva altera plana parasitica,  
cardine utrinque denticulato.*Die rundliche blätterige  
Schale hat eine flache aufstü-  
zende Klappe, und an beiden  
Seiten des Schloßes kleine  
Zähnen.

G 2

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequivalvis, valva altera convexa subovata glabra, altera explanata, rotunda, majore, parasitica. Cartilago latissimus nitidus, Latera postica utrinque acute denticulata, inferenda foucolis testae oppositae.

Die Klappen der Schale sind ungleich, deren eine etwas bäuchig eiförmig und glatt, die andere aber, welche aufsteht, ist flachgedrückt, rundlich und größer. Der Knorpel ist sehr breit und glänzend. An den Seiten des Schloßes ist beiderseits eine Reihe kleiner spitziger Zähne, die in die Grübchen der entgegen gesetzten Schale einbeißen.

O. IV. 6. *Ostrea cucullata.*

O. IV. 6. Die Runzelschappe.

Testa inaequivalvi plicato rugosa, margine dentato, intus striato; valva majore cucullata.

Die ungleiche Schale ist gefalten, und runzelicht, der Rand gezähnt, und innwändig gestreift, die größere Klappe kappenförmig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa solida ponderosa, plicis longitudinalibus, rugisque transuersis inaequalis. Valvae inaequales; altera cucullata, rudi, apice porrecto, postice longitudinaliter secto; altera minore plana. Margo utriusque obtuse dentatus. Limbus striis distantibus elevatis geminis. Color extus atro violaceus.

Die dicke schwere Schale ist der Länge nach mit breiten Falten, und in die Quere mit Runzeln besetzt. Die Klappen sind ungleich, die eine kappenförmig, rauh, mit hervorstechender stumpfen Spitze, die hinten flach abgeschnitten ist; die andere ist kleiner und flach. Der Rand beider Klappen hat stumpfe Zähne. Am Innerrande sind erhabene paarweis stehende Streifen. Die Farbe ist auswändig dunkelviolett.

O. IV.



O. IV. 7. Ostrea Ehip-  
pium.

Ö. IV. 7. Der polni-  
sche Sattel.

*Linn. S. N. Sp. 215.*

*Belg.* Poolische Zadel. *Angl.* Flat Pearl Oyfter. *Petiv. Gall.* Seile  
de Pologne.

Testa aequivalui rotundata Die rundliche glatt gedrückt,  
compressa membranacea, car- te häutige Schale hat gleiche  
dine transuersum sulcato. Klappen, und ein in die Quere  
gefurchtes Schloß.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 62.*

*Rumph. amb. t. 47. f. B.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 4.*

*Seb. Thes. t. 90. f. 10.*

*Knor. Vergn. VI, 21. t. I. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 6. f. 6.*

*Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 13. t. I. f.*

*Mart. Berl. Beschaeft. III. 7. t. 22. f.*

P. Anomia.

P. Die Bastardmu-  
schel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 314.*



Testa inaequivalvis, val-  
ua altera planiuscula, car-  
dinis cicatricula lineari,

Die Schale hat unglei-  
che Klappen, deren eine  
etwas flach ist, und eine  
kleine linienförmige Narbe  
am Schlosse.

P. 1. Anomia Ehip-  
pium.

Linn. S. N. Sp. 218.

Gall. Pelure d'oignon. Argenv.

Testa suborbiculata rugoso  
plicata, valua planiore per-  
forata.

Die rundliche mit Runzeln  
und Falten besetzte Schale hat  
eine flache durchbohrte Klappe.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 38.

Argenv. Conch. Pl. 19. f. C.

Ginani, adv. II. t. 27. f. 172.

Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 12. t. 3. f.

P. 2. Anomia Cepa.

P. 2. Die Zwibelschale.

Linn. S. N. Sp. 219.

Belg. Paarſche Bernſteen Oeſter. Gall. Huitre électrique.

Testa subrotunda amethy-  
stina, valua superiore conue-  
xa, inferiore perforata.

Die rundliche Schale ist  
amethystfärbig, ihre obere Klap-  
pe bäuchig, die untere durch-  
bohret.

Knor. Vergn. VI. 9. t. 5. f.

P. 3.

P. 3. *Anomia electrica.*P. 3. Die Bernstein-  
auster.*Linn. S. N. Sp. 220.**Belg.* Bernstein - Oester.  
*Huitre d'ambre jaune.**Angl.* Small Amber Oyster. *Petiv. Gall.**Testa subrotunda laevi fla-  
ua, valua altera conuexa  
gibbosa.*Die rundliche glatte gelbe  
Schale hat eine bänchige hö-  
ckerige Klappe.*Rumph. amb. t. 47. f. L.**Knor. Vergn. V. 25. t. 6. f.*P. 4. *Anomia truncata.*P. 4. Die gestumpfte  
Bastardmuschel.*Linn. S. N. Sp. 229.**Testa suborbiculata, obsole-  
te striata, cardine truncato,  
limbo denticulato.*Die rundliche feingestreifte  
Schale ist am Schloße abge-  
stumpft, am inneren Rande  
aber gezähelt.*List. angl. l. 9. f. 50.**Mus. Caes. Vindobon.*P. 5. *Anomia caput  
serpentis.*P. 5. Der Schlangenk-  
opf.*Linn. S. N. Sp. 236.**Gall. Le scarabée Dar.*



Testa ovata striata, valvae  
alterius apice longiore perfo-  
rato, margine crenulato.

Die eysförmige gestreifte  
Schale hat an der einen Klap-  
pe eine längere durchbohrte  
Spize, und am Rande feine  
Kerben.

*Colum. purp. p. 22. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 96. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

P. 6. *Anomia vitrea.*

P. 6. Die Glasbohr-  
muschel.

*Gall. La Poullete. Dav.*

Testa ovata convexa laevi,  
valvae alterius apice incurva-  
to pertuso, margine integer-  
rimo.

Die eysförmige bäuchige glat-  
te Schale ist an der schnabel-  
förmigen Spize der einen Klap-  
pe durchbohret, und am Rande  
ganz.

Ob plicarum defectum à Tere-  
bratula Linnaei distinguenda.

Sie muß wegen ihrer ungefalt-  
ten Oberfläche von der Bohrmus-  
chel des Linne unterschieden werden.

*Argenv. Conch. Suppl. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 30. t. 4. f.*

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 3. f.*

Testa



Testa ovata laevis tenuissima, instar membranae pellucida. Valvae conuexa conuexae absque striis, aut plicis. Valva superior ovata, postice in apicem incurvata prominente & pertusum; Foramen repletum ligamento filiformi. Valva inferior rotunda, postice gerens callos. Margo tenuis, clausus, integerrimus, anticus retusus. Color albus.

Die Schale ist eysförmig glatt, von der Dünne einer feinen Haut, und durchsichtig. Beide Klappen sind bühlig, ohne Streifen und Falten. Die obere ist eysförmig, und verlängert sich in eine gekrümmte oder schnabelförmige hervorragende durchbohrte Spitze, in deren Oefnung sich ein fadenförmiges Band befindet. Die untere Klappe ist rund, und hinten mit zweien Schwellen versehen. Der Rand ist dünn, geschlossen, ganz, und vorne stumpf. Die ganze Schale weiß.

### P. 7. Anomia Placenta.

### P. 7. Die Fensterscheibe.

Linn. S. N. Sp. 241.

Belg. Transparent. Angl. The chinese pellucid Oyster. Da Cost. Gall. Vitre chinoise. Dav.

Testa orbiculata complanata foliacea, cardinum callis linearibus adnatis.

Die scheibenrunde plattgestrichelte schieferige Schale hat am Schlosse zwei wulstartige angewachsene Erhöhungen.

„ valvis planis.

„ mit flachen Klappen.

Gualt. Test. t. 104. f. B.

Seb. Thes. t. 90. f. 8, 9.

Kuor. Vergn. II. 24. t. I. f.

Da Cost. Elem. 7. Pl. 13. F.



β valuis flexuoso bilobis.

β mit lappenförmig gefaltene Klappen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. Mytilus.

Q. Die Miesmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 315.*

Testa bivaluis, cardinis linea excavata, longitudinali, edentula.

Die zweiflappige Schale hat am Schlosse einen vertieften langen Streif ohne Zahn.

Q. I. Parasitici, unguibus affixi.

Q. I. Angewachsene mittelstehendes klauenförmigen Fortsatzes.

Q. I. 1. Mytilus Crista Galli.

Q. I. 1. Der Hahnenkamm.

*Linn. S. N. Sp. 243.*

Belg. Haanekam. Rumph. Angl. Curry Comb Oyster Pet. Gall. Oreille de Cochon. Dav.

Testa angulato plicata, dorso limboque punctato scabris, valua spinosa parasitica.

Die eckiggefaltene Schale ist auf dem Rücken und an dem inneren Rande mit erhabenen Punkten besetzt, und an einer Klappe stachelig und angewachsen.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 47. f. D.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. D.*

*Gualt. Test. t. 104. f. C.*

*Knor. Verg. IV. 10. t. 3, 5. f.*

—— ——— *V. 16. t. 1. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. IV. f. 8.*

Q. I. 2. *Mytilus Hyo-*

Q. I. 2. Der Blätter-

ris.

famm.

*Linn. S. N. Sp. 244.*

*Belg. Getakte Haane Kam. Rumph. Angl. Great Finger Oyster.*  
*Pet. Gall Crete de Coq. Dav.*

*Testa plicata, transuerse rugosa, valuis fornicato spinosis, limbo laeui.*

Die gefaltene und der Que-  
 re nach runzelichte Schale ist  
 auf beiden Klappen mit rin-  
 nenförmigen Stacheln besetzt,  
 und am inneren Rande glatt.

*Rumph. amb. t. 47. f. C.*

*Petiv. Gaz. t. 20. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. H.*

*Gualt. Test. t. 103.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 2. f.*

Q. I. 3.



Q. I. 3. *Mytilus Frons.*      Q. I. 3. Das Kamm-  
blatt.

*Linn. S. N. Sp. 245.*

*Belg.* Gekamd Laurierblad,    *Angl.* The Hogs Ear Oyster.    *Hill.*  
*Gall.* La Feuille.    *Dav.*

*Testa angulato plicata, val-*      Die eckig gefaltene in die  
*uis transuersim rugosis, lim-*      Quere gerunzelte Schale ist  
*bo alterius punctato scabro.*      am inneren Rande mit erha-  
benen Punkten versehen.

*Argenv. Conch. t. 19. f. D. ?*

*Gualt. Test. t. 104. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 8. t. 3. f.*

Q. II. *Plani subauriti.*

Q. II. Platte, mit unvollkom-  
menen Ohren.

Q. II. I. *Mytilus mar-*      Q. II. I. Die Perlmut-  
*garitiferus.*      ter.

*Linn. S. N. Sp. 246.*

*Belg.* Perle moer-Schulp.    *Rumph.*    *Angl.* Pearl Oyster.    *Pet. Gall.*  
*Mere* Perle    *Dav.*

*Testa compressa rotunda-*      Die plattgedrückte rundliche  
*ta subaurita, tunicis membra-*      und einigermaßen mit Ohren  
*naceis imbricata, cardine*      versehene Schale ist mit ziegel-  
*transuersim elongato.*      förmigen Blättern bedeckt,  
und mit einem in die Quere  
verlängerten Schlosse versehen.

Color



Color tunicarum sordide viridescens, radiis latis albis. Specimenis unius valua ponderosa crassa, spithamam diametro excedens, margaritam fouens adnatam praegrandem.

Die Farbe der Blätter ist schmutzgrün, mit breiten weißen Strahlen. Die Klappe eines Stückes ist schwer, dick, im Durchmesser mehr denn eine Spanne lang und enthält eine sehr große angewachsene Perle.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 1.*

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 56, 57, 58.*

*Rumph. amb.. t. 47. f. F.*

*Gualt. Test. t. 84. f. E. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. 1. f.*

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 13. t. 2, 3. f.*

Q. III. Ventricosiusculi.

Q. III. Etwas bäuchige.

Q. III. 1. Mytilus lithophagus.

Q. III. 1. Die Steinhuschel.

*Linn. S. N. Sp. 248.*

*Belg. Steen Mossel. Angl. Stone Peirceer. Pet. Gall. La Datte. Dav.*

Testa subcilindrica, extremitatibus rotundatis, apicibus recuruis.

Die einigermaßen walzenförmige Schale hat rundliche Seitenende, und zurückgekrümmte Endspitzen.

Epidermis decidua, castanea, saepe transuersim striata.

Die Oberhaut fällt ab, ist von kastanienbrauner Farbe, und öfters in die Quere gestreift.

*List.*



*List. angl. t. 8. f. 37.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 46. f. F.*

*Petiv. amb. t. 19. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 90. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. L.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 2. *Mytilus exustus.*

Q. III. 2. Die geferbte  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 251.*

Testa ovata, elongata, decussatim striata, limbo crenulato.

Die eiförmige verlängerte Schale ist in die Quere gestreift, und am Rande mit feinen Kerben versehen.

Color extus roseus.

Von rosenfarber Oberfläche:

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 206.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 3. *Mytilus edulis.*

Q. III. 3. Die gemeine  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 253.*

*Belg. Mossel. Gall. Moule. Ital. Muscolo. Gir.*

Testa



Testa ovato trilatera laeui  
violacea, antice carinata,  
apicibus acuminatis, terminali-  
bus bidentatis.

Die eysförmige dreyseitige  
glatte Schale ist von viole-  
ter Farbe, vorne mit ei-  
ner kielförmigen Schneide, und  
an den Endspitzen mit zween  
Zähnen versehen.

α violacea, unicolor.

α violet, einfärbig.

β violacea, radiis rubris.

β violet, mit rothen Strahlen.

*List. angl.* l. 4. f. 28.

— *Hist. Conch.* l. 3. f. 200.

*Bonan. Recr. cl.* 2. f. 30.

*Gualt. Test. t.* 91. f. E.

*Ginan. adr.* II. t. 23. f. 168.

*Memoir. de Paris.* 1711. t. 3. f. 4, 5.

*Bast. Subf. t.* 11. f. 11.

*Regenf. Samml.* I. 12. t. 71. 72. f.

*Knor. Vergn.* IV. 15. t. 1. f.

Q. III. 4. *Mytilus pi-*  
*etus.*

Q. III. 4. Die gefärbte  
Nießmuschel.

*Gall. Moule arborifée. Dav.*

Testa ovata trilatera, grisea,  
laeui, antice carinata, apici-  
bus acuminatis terminalibus,  
bidentatis.

Die eysförmige, dreyseitige,  
lichtgraue glatte Schale ist vor-  
ne mit einem kielförmigen Man-  
de, und an den Endspitzen mit  
zween Zähnen versehen.

α grisea



$\alpha$  grisea, unicolor.

$\alpha$  lichtgrau, einfarbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

$\beta$  grisea, lineis angulatis rufis.

$\beta$  lichtgrau, mit rothbraunen Winkelzügen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

$\gamma$  ex luteo virens, maculis late viridibus, lineis angulatis rufis.

$\gamma$  gelblich grün, mit hellgrünen Flecken, und rothbraunen Winkelzügen.

*Knor. Vergn. IV. 15. t. 5. f.*

Testa ovato elongata laevis, antice carinata, postice complanata hians, ideoque trilatera, Apices terminales acuminati, dentibus duobus acutis validis, mutuo insertis, extus conspicuis. Cavitas variegante nitore replendens. Priori similis, qua tamen gracilior, colore insuper dentiumque structura praecipue distinguitur.

Die eiförmige verlängerte glatte Schale ist vorne keilförmig erhoben, hinten flachgedrückt klappend, und daher dreiseitig. Die Spitzen stehen an einem verdünnten Ende, wo sich zwei starke spitzige von außen sichtbare Zähne befinden. Die Höhlung hat einen bunten Glanz. Diese Art ist der vorigen ähnlich, aber schwächer, und weicht davon durch die Verschiedenheit der Farbe und der Zähne vorzüglich ab.

Q. III. 5. *Mytilus ungularus*.

Q. III. 5. Die Klauenmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 254.*

Belg.



Belg. De breede purpuragtige Mossel.

Testa ouato elongata lae- Die eysförmige verlängerte  
ui, valuis conuexis postice glatte Schale hat bäuchige hin-  
incuruatis, extremitatibus at- ten eingebogene Klappen; und  
tenuatis, denticulatis. zugespizte gezähnelte Ende.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 201.

Gualt. Test. t. 91. f. E.

Regenf. Samml. I. 4. t. 47. f.

Q. III. 6. Mytilus bi-  
dens.

Q. III. 6. Die geribbte  
Mießmuschel.

Linn. S. N. Sp. 255.

Angl. Deep furrowed Cape Muscle, Petiv. Gall. Gueule de Sou-  
ris. Dav.

Testa ouato elongata, lon- Die eysförmige verlängerte  
gitudinaliter sulcata, apicibus nach der Länge gefurchte Schale  
terminalibus dentatis. le hat gezähnelte Endespitzen.

Petiv. Gaz. t. 57. f. 9.

Knor. Vergn. IV. 30. t. 3. f.

Q. III. 7. Mytilus Mo-  
diolus.

Q. III. 7. Die Papus-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 256.



Belg. Zand Mossel. Angl. The Caroline Muscle Hill. Gall. Moule de la terre des Papous. Day.

Testa ovato elongata laevi, Die eyrunde verlängerte postice coarctata, hiantē, apicibus recurvis, subterminalibus. glatte Schale ist hinten eingedrückt und klappend, mit zurückgebogenen nahe am Ende stehenden Spizen.

$\alpha$  margine cardinali obtuso.

$\alpha$  mit stumpfem Schloßrande.

$\beta$  margine cardinali excurrente, seu  $\beta$  mit austaufendem, oder, vorne antrorsum angulato. zu, eckigem Schloßrande.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 198.

Petiv. Gaz. t. 71. f. 11.

— amboin. t. 19. f. 16.

Rumph. amb. t. 46. f. B.

Gualt. Test. t. 91. f. H.

Argenv. Conch. Pl. 22. f. C.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.

Knor. Vergn. IV. 15. t. 3. f.

Q. III. 8. Mytilus Hirundo.

Q. III. 8. Die Vogel-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 262.

Belg. Vogeltje. Angl. Flying Musc. Petiv. Gall. L'hirondelle. Day.

Testa



Testa complanata laevi, Die plattgedrückte glatte  
 Valvis basi transuerfa bilobis, Schale ist an dem nach der  
 lobo altero elongato. Quere stehenden Schloßrande

mit zween Flügeln versehen,  
 deren einer verlängert ist.

α castanea, fuscoque radiata.

α kastanienfärbig, mit braunen  
 Strahlen.

β viridis, radiis obsoletis ferrugineis. β grün, mit matten eisenrosthigen  
 Strahlen.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 58.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 55.

Rumph. amb. t. 46. f. G

Petiv. amb. t. 19. f. 9.

Argenv. Conch. Pl. 19. f. B.

Gualt. Test. t. 94. f. A. B.

Knor. Vergn. IV. 8. t. 5. f.

——— V. 10. t. 1, 2. f.

——— Del. nat. I. t. B. IV. f. 7.

R. Pinna.

R. Die Steckmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 316.

Testa bivalvis, valvis Die Schale hat zwei  
 coalitis, cardine edentu- aneinander verwachsene  
 lo. Klappen, und am Schlos-  
 se keine Zähne.

R. 1. *Pinna pectinata*.

R. 1. Der geräucherte Schinken.

*Linn. S. N. Sp. 264.*

*Testa fastigiata grisea glabra, obtuse sulcata, squamis fornicatis cylindricis.*

Die graue Schale ist zugespitzt, glatt, mit stumpfen Furchen, und hohlen zylindrischen Schuppen besetzt.

*Gualt. Test. t. 79. f. A.**Seb. Thes. III. t. 91. f. 3.**Knor. Vergn. II. 26. t. 1. f.*— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 3.*R. 2. *Pinna nobilis*.

R. 2. Der edle Schinken.

*Linn. S. N. Sp. 265.*

*Testa fastigiata sulcata rubicunda, squamis canaliculato tubulosis.*

Die zugespitzte gefurchte röthliche Schale hat hohle rinnenartige Schuppen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 24.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. B.**Adans. Seneg. Pl. 15. f. 5.**Knor. Vergn. II. 26. t. 2. f.*

R. 3.



R. 3. Pinna muricata.

R. 3. Die gedornete  
Stectmuschel.

Linn. S. N. Sp. 266.

Belg. Gedoord Hammetje. Angl. Prickley Ham Muscle Petiv. Gall.  
Jamboneau épineux.

Testa striata albida, squa- Die gefurchte weißliche Scha-  
mis fornicatis, approximatis, le hat hohle, dünne, gedrängt  
acutis. stehende Schüppchen.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 215.

Rumph. amb. t. 46. f. M.

Petiv. amb. t. 19. f. 14.

Gualt. Test. t. 79. f. D.

Knor. Vergn. VI. 20. t. 1. f.

R. 4. Pinna incurvata.

R. 4. Der lange Schu-  
fen.

Testa fastigiata, ovata, squa- Die eysförmige zugespizte  
mis fornicatis breuibus, ex- Schale ist mit kurzen hohlen  
tremite altera rotundata. Schuppen besetzt, und an ei-  
nem Ende rundlich.

Seb. Thes. t. 91. f. 1.

Gualt. Test. t. 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata elongata grandis, ex- Die Schale ist eysförmig verlän-  
tremite una attenuata, altera gert, an einem Ende zugespizet, am  
rotundata, Valvae convexae super- andern rundlich, von beträchtlicher  
ficies externa vix manifeste striata, Größe. Die Klappen sind gewölbet  
testa squamulis fornicatis breuibus die äußere Oberfläche kaum merk-  
approximatis. Color praesertim ca- lich gestreift, und mit gedrängten  
H 2

uita-



uitatis carneus, Apices intus saepe margaritacei.

kurzen hohlen Schüppchen besetzt. Die Farbe besonders der Höhlung ist fleischroth. Die Spitzen haben inwendig oft einen Perlmutterglanz.

## R. 5. Pinna Vexillum.

Testa fastigiato triangula laevi, margine postico excurrente lobiformi.


## R. 5. Die Fahne.

Die zugespitzte dreyeckige glatte Schale hat einen lappenförmig ausgebreiteten Vorder- rand.

## Mus. Caes. Vindobon.

Testa fastigiata, convexa, crassa, laevis. Valvae triangulae, extremitate una attenuata, opposita obtusa, lata; Margo posticus curvilineus, supra excurrente lobiformis. Color fuscus.

Die Schale ist zugespitzt, bündig, dick und glatt. Die Klappen sind dreyeckig, das eine End zugespitzt, das andre stumpf und breit. Der Hinterrand ist krummlinig, und oben zu lappenförmig ausgebreitet. Von brauner Farbe.





# Ordo tertius. Dritte Ordnung.

## Univaluia.

## Einschalige.

### A. Argonauta.

### A. Der Segler.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 317.*

Testa unilocularis, cym- Die einfammerige, na-  
biformis, membranacea, chenförmige, dünne Scha-  
spira inuoluta. le hat einen eingerollten  
Schwirfel.

### A. 1. Argonauta Argo.

### A. 1. Der papierne Segler.

*Linn. S. N. Sp. 271.*

*Belg. Dooke huijen. Rumph. Angl. The paper Nautilus. Hill.*  
*Gall. Nautilé papyracé. Argeuv. Ital. Polpo Moscardino.*

Testa compressa, carina no-  
dulosa.

Die zusammengedrückte  
Schale hat einen knotigen Kiel.

“ carina tenui, testae rugis bi-  
furcatis.

“ mit schmalem Kieler und gabel-  
förmigen Runzeln.

*Belg. Dooke - huijsje Rumph. Angl. The great brittle Saylor, Petiv.*  
*Gall. Nautilé papyracé à carene retrecie Ital. Moscarolo. Bonan.*  
*Germ. Der schmalkeilige Seegler.*



- List. Hist. Conch.* l. 4. s. 4. f. 7.  
*Rumph. amb. t.* 18. f. A.  
*Petiv. amb. t.* 10. f. 1.  
*Gualt. Test. t.* 11. f. A. B. t. 12. f. A.  
*Klein. Meth. Ostr.* 1. 1. f. 3.  
*Seb. Tbes. III. t.* 84. f. 5, 7.  
*Gev. Belust.* 2. t. 4, 5. f.  
*Argenv. Conch. Pl.* 5. f. A.  
 ——— *Zoom. Pl.* 2. f. 2.  
*Hill. Hist. of. Anim.* 7. Pl.  
*Knor. Vergn.* I. 2. t. 1. f.  
 ——— ——— VI. 31. t.  
 ——— *Delic. nat.* I. t. B. I. f. 3.  
*Mart. Konch. Kab.* I. 17. t. 157 f.  
*Da Cost. Elem. Pl.* 3. f. 6.

‡ carina lata, obtuse serrata, cos- β mit breitem Riele und von eins-  
 tis rarioribus. ander entfernten Ribben.

† Belg. Breedkielde papiere Nautilus. Angl. The Course brittle Say-  
 lor. Petiv. Gall. Nautilé papyracé à large carene.

- List. Hist. Conch.* l. 4. f. s. 4. f. 6.  
*Rumph. amb. t.* 18. f. B.  
*Petiv. amb. t.* 10. f. 2. t. 22. f. 10.  
*Gualt. Test. t.* 12. f. C.  
*Gev. Belust.* 2. t. 6, 7. f.



*Argenv. Conch. Pl. 5. f. B.*

*Seb. Thes. III, t. 84. f. 9 — 12.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 2. f.*

— *Del. nat. I, t. B. 1. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 158, 159. f.*

*Murray. Fund. Testac. t. 1. f. 8.*

## B. Nautilus.

## B. Die Kammerschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 318.*

Testa polythalamia, dissepimentis siphone communicante perforatis.

Die Scheidewände der vielkammerigen Schale sind mit einer gemeinschaftlichen Röhre durchbohret.

B. I. Nautilus Pompi-  
lius.

B. I. Der dicke Schiff-  
boot.

*Linn. S. N. Sp. 273.*

*Belg. Parl - Slakke; Rumph. Angl. Thick Sail - Shell. Gall. Nautilé à cloisons. Argenv.*

Testa subrotunda compressa, apertura cordata, anfractibus obtectis, inuolutis, laevis.

Die rundliche zusammenge-  
drückte Schale hat eine herz-  
förmige Mündung und verborgene, eingerollte, glatte Windungen.



*Bonan. Recr. cl. I. f. 1, 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 4. f. 3, 4.*

*Rumph. amb. t. 17. f. A.*

*Valent. Abb. I. t. 4. f.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 9.*

— amb. t. 3. f. 7.

*Gualt. Test. t. 17. f. A, B.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. E.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. I. I. t. 1. f. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 18. t. 164. f.*

— — — — 19. t. 165, 166, 167. f.

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 16.*

B. 2. Nautilus Spirula.

B. 2. Das Posthorn.

*Linn. S. N. Sp. 279.*

*Belg. Posthoortje Rumph, Angl. The Rams Horn. Da Cost. Gall Corne d'Ammon.*

Testa inuoluta, tereti, anfractibus conspicuis, apertura orbiculari.

Die eingerollte walzenförmige Schale hat sichtbare Windungen, und eine runde Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 4. f. 2.*

*Bonan. Mus. Kirzb. cl. I. f. 39.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 20. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 19. f. E.*

*Swammerd. Bibl. nat. I, 7. t. 7. 8. f.*

*Gev. Belust. 3. t. 8. f. a. b.*

*Knor. Vergn, I, 2, t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 20. t. 184. 185. f.*

*Da Cost. Elem, Pl, 2. f. 19.*

## C. Conus.

## C. Die Zutenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 319.*

Testa conuoluta turbinata; apertura longitudinalis edentula; columella laevis.

Die zusammengerollte zutenförmige Schale hat eine nach der Länge herablaufende Mündung, ohne Zähne, und eine glatte Spindel.

C. I. Spira planiuscula.

C. I. Mit einem flachen Wirbel.

C. I. 1. Conus marmoreus.

C. I. 1. Die Herztute.

*Linn. S. N. Sp. 290.*

Testa



Testa conica, maculis sub-  
cordatis albis; spirae anfra-  
ctibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale hat  
herzähnliche weiße flecken, und  
rinnenförmig ausgeflehte Wir-  
belgewinde.

α nigrescens, maculis aggregatis.

α schwärzlich, mit nahe aneinander  
stehenden Flecken,

Belg. Hart-Toot. Rumph. Angl. Tyger-Shell Hill. Gall. Tigre  
noir. Argenv.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 39.

Rumph. amb. t. 32. f. N.

Petiv. Gaz. t. 47. f. 11.

Valent. Abb. t. 3. f. 25. t. 7. f. 65. A.

Gualt. Test. t. 22. f. D.

Seb. Thes. III. t. 46. f. 1 — 4. 13 — 19.  
— — — t. 47. f. 1. t. 55. f. 23.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 1.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Regenf. Samml. I. 5. t. 53. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 685. f.

β testa rufa, maculis aggregatis.

β rothbraun, mit nahe aneinander  
stehenden Flecken.

Belg. Root-Hart-Toot. Gall. Leopard rouge. Argenv.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 123.

Rumph. amb. t. 32. f. 1.

Valent.



*Valent. Abb. t. 5. f. 43.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 2. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. 0.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 2. f.*

—— ——— *IV. 17. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 686. f.*

*Testa nigra, maculis rarioribus.*    *schwarz, mit etwas zerstreuten Flecken.*

*Belg. Schout by Nagt. Gall. Contre Ammiral*

*Valent. Abb. t. 2. f. 10. t. 5. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 46. f. 5 — 12. t. 47. f. 5. 6.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 687. 688. f.*

**C. I. 2. Conus imperialis.**

**C. I. 2. Die Kroutute.**

*Linn. S. N. Sp. 291.*

*Belg. Kroon - Horn. Rumph. Angl. Crown - Stamper. Petiv. Gall. Couronne imperiale Argenv.*

*Testa conica alba, fasciis ochraceis, lineisque articulationis transuersis.*

Die kegelförmige weiße Schale hat ochergelbe Bänder, und linienförmige unterbrochene Quergürteln.

*Spi-*



*Spirae anfractus coronati.*

Die Wirbelgewinde sind mit Knoten gekrönt.

*Rumph. amb. t. 34. f. H.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 22. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 18 — 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. F.*

*Knor. Vergn. II. II. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 690. 691. f.*

C. I. 3. *Conus fusca-*  
*tus.*

C. I. 3. Die schwarz-  
braune Kroutute.

*Belg. Tueete Kron-hoorn. Angl. Blaauw's Stamper. Pet.*

*Testa alba fusco maculata,* Die weiße und braungefleck-  
*lineis transuersis obscurioribus* te Schale hat linienförmige  
*interruptis.* unterbrochene schwarzbraune  
Gürteln.

*Rumph. amb. t. 34. f. F.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 17.*

*Klein Meth. Ostr. t. 4. f. 84.*

*Seb. Thes. III. t. 3. f. 35.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. E.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 35. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 692. 693. f.*



Testa obuerse conica fusca, maculis longitudinalibus confluentibus albis. Cingula tenuia transversa, atrofusca, interdum albo articulata. Spira planiuscula. Anfractus dentibus coronati. Mucro centralis prominulus.

Die Schale ist verkehrt kegelförmig, von brauner Farbe. Nach ihrer Länge herablaufen zusammensießende weiße Flecken. Die linientförmigen schwarzbraunen Gürteln sind manchmal weiß gegliedert. Der Wirbel ist etwas flach. Die Gewinde sind mit knotigen Kronen besetzt. Die Wirbelspitze ragt in der Mitte hervor.

C. I. 4. Conus litteratus.

C. I. 4. Die Tigertute.

Linn. S. N. Sp. 292.

Belg. Letter-Hoorn. Rumph. Angl. Horn - Book - Stamper. Pet. Gall. Damier. Dav.

Testa conica alba, maculis quadratis, seriatim digessis.

Die kegelförmige weiße Schale ist mit würflichten Flecken reihenweise besetzt.

Bonan. Recr. el. 3. f. 363.

List. Hist. Conch. l. 4. 5. 10. p. 2. f. 20.

Rumph. amb. t. 31. f. D.

Petiv. Gaz. t. 41. f. D.

— amb. t. 2. f. 5.

Gualt. Test. t. 21. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. 1.



*Seb. Tbes. III. t. 45. f. 1. — 5.*

*Regeuf. I. 3. t. 29. f.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 3. f.*

—— ——— *III. 3. t. 2. f.*

—— ——— *IV. 26. t. 1. f.*

—— *'Delic nat. I. t. B. III. 4. f.*

*Mart. Konch, Kab. II, 60. t. 666 — 669. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 9.*

α punctis fuscis subaequalibus; absque fascia transversa.

α mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten, ohne Querbänd.

β punctis fuscis subaequalibus, absque fascia transversa, spira nodoso coronata.

β mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten ohne Querbänd, und gekrönter Wirbelspitze,

γ punctis fuscis confertis, fascia gemina flava.

γ mit gedrängt stehenden braunen Punkten und gedoppelten gelben Bänden.

δ punctis fuscis distinctis. fasciis tribus flavescens.

δ mit zerstreuten braunen Punkten, und drey gelblichen Bändern.

ε maculis quadratis fuscis, fasciis tribus transversis latis.

ε mit würflichten braunen Flecken, und drey breiten Querbändern.

ζ maculis punctisque confluentibus flavis.

ζ mit zusammenfließenden rothgelben Flecken, und Punkten.



C. I. 5. Conus generalis.

C. I. 5. Das Klöppel-

füßen.

*Linn. S. N. Sp. 293.*

*Belg.* Speeldewerk Kuffen. *Rumph.* *Angl.* Net - listed - Stamper  
*Petiv.* *Gäll.* La Flamboyante *Argenv.*

Testa conica ferruginea, fa-  
 sciis tribus interruptis albis,  
 anfractibus canaliculatis,

Die kegelförmige rostfar-  
 bige Schale hat drey weiße un-  
 terbrochene Bänder, und aus-  
 gefehrte Wirbelgewinde.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 34.**Petiv. Gaz. I. t. 27. f. 11.**— amb. t. 3. f. 9.**Rumph. amb. t. 33. f. 1.**Gualt. Test. t. 20. f. G.**Seb. Thes. III. t. 54. f. 11 — 13.**Argenv. Conch. Pl. 12. f. T.**Regenf. Samml. I. 6. t. 65. f.**Knor. Vergn. III. 17. t. 4, 5. f. 18. t. 3, 4. f.**Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 648 — 652. f.**Da Cost. Elem. Pl. 5. F. 8.*

a fasciis fuscis.

a mit braunen Bändern.

b fasciis fulvis.

b mit rothgelben Bändern.



C. I. 6. *Conus candi-*  
*dus.*

C. I. 6. Die weiße Kron-  
 tute.

Testa conica glabra alba,  
 spirae anfractibus coronatis.

Die kegelförmige glatte weiß-  
 se Schale hat gekrönte Wirbel-  
 gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica solida niuea; Ven-  
 ter conuexiusculus; Apex centra-  
 lis prominulus, decorticatus, ame-  
 thyllinus.

Die kegelförmige dichte Schale  
 ist weiß, einigermaßen bläulich. Die  
 abgenützte in der Mitte hervorra-  
 gende Wirbelspize ist amethystfarbig.

C. I. 7. *Conus Virgo.*

C. I. 7. Die Menmoni-  
 tentute.

*Linn. S. N. Sp. 294.*

*Belg. Mennonist Toet. Rumph. Angl. Wax - Ramper. Petiv. Gall.*  
*Bout de Chandelle. Dav.*

Testa conica pallida, trans-  
 versim rugoso striata, basi  
 violacea.

Die kegelförmige weißliche,  
 der Quere nach runzelicht ge-  
 streifte Schale hat eine violette  
 Grundspize.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 31. f. E.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 29. f. B.*

*Seb.*



*Seb. Tbes. III. t. 47. f. 8, 9.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Konch II. 53. t. 585. f.*

C. I. 8. *Conus tessula-*  
tus.

C. I. 8. Der Estrich.

*Belg. Italienische Vloerken. Angl. The italien Parement. Gall. Nappe d'Italie.*

Testa conica alba, maculis oblongis cinnabarinis; basi fulcata, amethystina.

Die kegelförmige weiße Schale hat langwürflichte zinnoberrothe Flecken und eine gefurchte amethystfarbige Grundspitze,

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 17.*

*Valent. Abb. 6. t. 52. f.*

*Gualt. Test. t. 21. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 55. f. 4 — 9.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 653. f.*

An praecedentis varietas?

Vielleicht eine Abänderung des vorhergehenden Art.

C. I. 9. *Conus Capita-*  
neus.

C. I. 9. Die Käsetute.

*Linn. S. N. Sp. 295.*



Belg. Groene Kaas Rumph. Angl. Green Ramper. Pet. Gall. L'Her-  
mine Dav.

Testa conica glabra, fasciis      Die kegelförmige glatte  
duabus albis fusco maculatis.      Schale hat zwey braun gefleck-  
te Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 27.

Rumph. amb. t. 33. f. X.

Petiv. amb. t. 9. f. 11.

Gualt. Test. t. 22. f. M.

Seb. Thes. III. t. 22. f. 26, 27, 30, 31, 33.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. K.

Regenf. Samml. I. 7. t. 7. f.

Knor. Verg. I. 15. t. 3. f.

—— ——— V. 16. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. II. 59. t. 660 - 662. f.

α olivacea.

α Olivengrün.

β nasa.

β rothbraun.

C. I. 10. Conus miles.      C. I. 10. Die Zwirnzute.

Linn. S. N. Sp. 296.

Belg. Arakans - Garen. Rumph. Angl. Garter Ramper. Petiv. Gall.  
Le Navet. Argenv.

Testa conica albida, fasciis      Die kegelförmige weiße  
duabus transuersis fuscis.      Schale hat zwey braune Quers-  
bänder.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p 2. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 33. f. W.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 20. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 23, 25.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. L.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 4. f.*

—— ——— III. 1. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 663. 664. f.*

## C. I. II. Conus Centurio.

Testa conica, basi attenuata transuersim sulcata, anfractibus canaliculatis.

## C. I. II. Der Orangen- Fegel.

Die Fegelförmige Schale ist aus dem zugespitzten Grunde in die Quere gefurchet, und an den Gewinden ausgekehlet.

## Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica, laevis; Basis attenuata, sulcis transuersis. Spira planiuscula. Anfractus contigui, canaliculati. Vertex obtusus centralis. Color aurantius. Fasciae duae transuersae albae, lineis aurantiis angulatis oblique transcurrentibus.

Die Schale ist Fegelförmig und glatt. Der Grund zugespitzt, und in die Quere gefurchet. Der Schnirkel flach. Die Gewinde berühren einander, und sind rinnensförmig ausgekehlet. Der stumpfe Wirbel steht in der Mitte. Die Farbe ist orangengelb. Zwen breite Querbänder sind mit schiefen orangensfarbigen eckigen Linien durchzogen.



C. II. Spira pyramidata.

C. II. Mit einem pyramidenförmigen Wirbel.

C. II. 1. Conus Princeps.

C. II. 1. Die Bastardbauernmusik.

. Linn. S. N. Sp. 297.

Belg. Baltert Tygers Katje. Gall. La fausse Hebraïque. Dav.

Testa turbinata fusco nigra, lineis longitudinalibus, flexuosis, pallidis.

Die spizwirblige Schale ist braunschwarz, und mit blassen gekrümmten Strichen nach der Länge herab besetzt.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 26.

Valent. Abb. II. t. 94. f.

Gualt. Test. t. 25. f. Q.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. B.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 30, 31.

Knor. Vergn. III. 4. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. II. 63. t. 699. 700. f.

C. II. 2. Conus Ammiralis.

C. II. 2. Die Admiraltute.

Linn. S. N. Sp. 298.

Belg. Opper-Admiral. Angl. Burg's-stamper. Petiv. Gall. Le grand Admiral. Argenv.

Testa



Testa fulva, maculis dispersis albis, fasciisque transuersis reticulatis.

Die rothbraune Schale ist mit zerstreuten Flecken besetzt, und mit netzförmigen Querbändern umgeben.

$\alpha$  fasciis transuersis tribus, secunda cingulo articulado bifariam diuisa.

$\alpha$  mit drey Querbändern, davon das zweyte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet ist.

*Rumph. amb. t. 34. f. B.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 18.*

*Argenv. Conch Pl. 12. f. N.*

*Adans. Seneg. Pl. 6. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 5, 6.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 2. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 6.*

$\beta$  fasciis quatuor, secunda obsoleta tenui, tertia cingulo articulado bifariam diuisa.

$\beta$  mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und schmal, das dritte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet wird.

$\gamma$  fasciis quatuor, secunda obsoleta tenui, tertia lata, cingulis articulatis duobus trifariam partita.

$\gamma$  mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und schmal ist, das dritte breite aber durch zwey gegliederte Gürteln dreymal abgetheilet wird.

*Petiv. amb. t. 15. f. II.*

*Argenv. Suppl. Pl. I. f. P.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 4, 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



C. II. 3. *Conus Senator*.

C. II. 3. Die Schild-  
krötentute.

*Linn. S. N. Sp. 300?*

*Belg. Schildpad - Toot. Gall. Ecaile de tortue.*

*Testa ovata nebulosa laevi, transuersim articulato striata.* Die eysförmige nebelichte glatte Schale ist mit unterbrochenen Querstreifen umgeben.

*Seb. Thes. III. t. 43. f. 29, 36.*

*Knor. Vergn. VI. I. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 609 — 611. f.*

C. II. 4. *Conus genuanus*.

C. II. 4. Die guineische  
Tute.

*Linn. S. N. Sp. 302.*

*Belg. Geneesche Toot. Gall. Aile de papillon. Argenv.*

*Testa pallido rubra, cingulis albo fuscoque articulatis.* Die blasfrothe Schale ist mit weiß und braun unterbrochenen Bändern umgeben.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 337.*

*List. Hist. Conch. I. 4. s. 10. p. 2. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 34. f. G.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 1 — 3.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 623 — 625.*

C. II. 5. *Conus Mo-*  
*nachus.*

C. II. 5. *Der Mönch,*

*Linn. S. N. Sp. 304.*

*Belg. Graeve Munniker. Rumph. Angl. Gray Monk. Petiv.*

Testa laevi fusca, albo &  
coerulef. ente nebulata, basi  
transuerse sulcata.

Die glatte braune, weiß  
und hellblau wolfigte Schale  
hat eine in die Quere gefurchte  
Grundspize.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 126.*

*Rumph. amb. t. 33. f. CC.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 7.*

*Valent. Abb. 9. t. 74. f.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 45.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. III. 16. t. 2. f.*

— — — V. 18. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 614. f.*



C. II. 6. *Conus minimus*.

C. II. 6. Der graue Mönch.

*Linn. S. N. Sp. 305.*

*Gall. La minime, Dav.*

Testa ovato oblonga, glauco albideque nebulosa, lineis fuscis interruptis cineta.

Die eysförmige längliche blau-licht graue Schale hat weisse Wolken und braune unterbrochene Querstreife.

Variat etiam spira coronata.

Es giebt auch eine Abänderung mit gekröntem Wirbel.

*Valent. Abb. 3. t. 24. f.*

*Argen. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Knor. Vergn. III, 27. t. 2. f.*

C. II. 7. *Conus Mercator*.

C. II. 7. Die bandirte Neztute.

*Linn. S. N. Sp. 307.*

*Belg. Net - Tootje.*

Testa ovata alba, fasciis latis reticulatis fulvis.

Die eysförmige weisse Schale hat breite eysförmige rothgelbe Bänder.

*Lift. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 41.*

*Valent. Abb. 7. t. 65. B. f.*

*Argene.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. P.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 3.*

*Knor. Vergn. II. 1. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 620. f.*

C. II. 8. *Conus reticulatus.*

C. II. 8. Das Fische-  
netz.

*Gall. Drap à réseau.*

Testa ovato oblonga niuea,  
undique fulvo reticulata.

Die eiförmige längliche  
weiße Schale ist allenthalben  
mit einem rothbraunen Netze  
überzogen.

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 621. f.*

Testa ovata, pyriformis, gla-  
berrima niuea, filis reticulatis ful-  
vis intertexta, areolis lanceolatis,  
transuersis. Basis attenuata trans-  
uersim sulcata. Spira pyramidata  
laevis, anfractibus contiguus. Ver-  
tex centralis acuminatus.

Die eiförmige birnförmige Schale  
ist glatt, schneeweiß, mit roth-  
braunen netzförmigen Fäden be-  
setzt, deren Zwischenflächen länglich,  
und in die Quere gestellet sind.  
Der Schnirkel ist pyramidenförmig  
und glatt, die Gewinde aneinander  
verwachsen. Der Wirbel raget aus  
der Mitte spizig hervor.

An prioris Varietas?

Etwa eine Abänderung der vo-  
rigen Art?

C. II. 9. *Conus betuli-*  
*mus.*

C. II. 9. Die gelbe But-  
terwecke.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 308.*

*Belg.* Boterweg. *Rumph. Angl.* Great yellow Leopard Stamper  
*Pet. Gall.* Pelote de beurre. *Dav.*

Testa turbinata laeui, maculis fuscis per series cincta, basi rugosa.

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunen Flecken reiheweise umgeben, und an der Grundspize runzelicht.

*List. Hist. Conch. l. 4, s. 10. p. 2. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 31. f. C.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 21. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 1 — 4.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. II, 60 t. 665. f.*

C. II. 10. Conus figurinus.

C. II. 10. Die Eichenholztute.

*Linn. S. N. Sp. 309.*

*Belg.* Eckenhouts-Toot. *Rumph. Angl.* The Oacken-wood stamper.  
*Gall.* Le bois de Chene.

Testa turbinata laeui, lineis transuersis fuscescentibus.

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunlichen Quersstrichen umgeben.

*List.*



*List. Hist. Conch. t. 4. s. 10. p. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 31. f. V.*

*Gualt. Test. t. 20. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 47. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 23. f.*

—— ——— *V. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 656, 657. f.*

C. II. 11. *Conus ermi-  
neus.*

C. II. 11. *Der Her-  
melinschwauz.*

*Belg. Hermelin Staart. Gall. Queue d'Hermine. Dav.*

Testa pyriformi fulva basi striis punctatis scabra, fasciis transuersis niuis. Die birnförmige rothgelbe Schale hat am Grunde erhabene punktirte Streife, und schneeweiße Querbänder.

*Valent. Abb. 5. t. 47. f.*

*Gualt. Test. t. 20. f. Q.*

*Seb. Tbes. III. t. 42. f. 31 — 40.*

*Mart. Konch. Kab. II. 57. t. 631. f.*

Testa pyriformis glabra, basi transversim striata, striis elevatis punctatoscabris. Spira conica. Anfractus glabri planiusculi. Color fulvus; spira albo maculata; ventris Die Schale ist birnförmig, und glatt, am Grunde in die Quere gestreift, und auf den erhabenen Streifen mit Körnern besetzt. Der Schnirkel ist kegelförmig. Die

cin-



cingula duo interrupta alba. Puncta eleuata alba.

Gewinde glatt und etwas flach. Die Farbe rothgelb an dem Schnir-  
tel weißgefleckt, und um den Lelt  
mit zweyen unterbrochenen Quer-  
bändern umgeben. Die erhabenen  
Punkte, oder Körner sind weiß.

C. II. 12. Conus Hebraeus.

C. II. 12. Die Bauern-  
musik.

*Linn. S. N. Sp. 310.*

*Belg.* Böeren - myfyk, *Rumph.* *Angl.* Black Diamond Stamper  
*Pet. L' Hebraique. Dav.*

Testa ouata, maculis oblongis per series transuersum cin-  
cta.

Die eysförmige Schale ist  
mit länglichen Flecken der Que-  
re nach reiheweise umgeben.

α maculis fuscis

α mit braunen Flecken.

β maculis rufis.

β mit rothgelben Flecken.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 122.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 25.*

*Rumph. amb. t. 33. f. BB.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 12.*

— *Gaz. t. 99. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 2. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. G.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 5.*

*Seb.*



*Seb. Thes. III. t. 47. f. 28 — 29.*

*Knor. Vergn. III. 6. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 617. f.*

C. II. 13. *Conus Stercus muscarum.* C. II. 13. *Die Candtute.*

*Linn. S. N. Sp. 311.*

*Belg. Vliegge - Schettje. Rumph. Angl. Sand - Stamper. Pet. Gall. Piqure de mouche.*

*Testa oblonga punctis pictis adpersa ; anfractibus canaliculatis.* Die längliche Schale ist mit gefärbten Punkten bestreuet, und an den Gewinden ausgeföhlet.

*α elongata, spirae anfractibus aequalibus.* α länglich, mit glatten Wirtelwinden.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 75. f. 1.*

— *amb. t. 15. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 33. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 25. f. N. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 1.*

*Regenf. Samml. I. 7. t. 2. f.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 5. f.*

— *Del. nat. I. t. B. 5. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 711 — 713. f.*

β ventri-



β ventricosa, spirae anfractibus coronatis. β bäuchig, mit gekrönten Wirbelgewinden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. S.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

C. II. 14. Conus varius.

C. II. 14. Die Löwenturte.

*Linn. S. N. Sp. 312.*

Belg. Westindische Landcharten. Gall. Peau de chagrin. Argenv.

Testa elongata, punctis elevatis cincta, spirae anfractibus coronatis.

Die längliche Schale ist mit erhabenen Punkten umgeben, und an den Gewinden gekrönt.

α fusca, maculis confluentibus ramosis. α braun, mit weißen zusammenfließenden Flecken.

β lutea, maculis albis dispersis solitariis. β gelb, mit weißen zerstreuten einzelnen Flecken.

*Gualt. Test. t. 20. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 20 — 22.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 5. f.*

—— II. 1. t. 5. f.

—— VI. 1. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 6. 1. t. 678. 679. f.*

C. III.



C. III. Elongati.

C. III. Lange Zuten.

C. III. 1. Conus Nuffa-  
tella.C. III. 1. Der punktir-  
te Bohrer.*Linn. S. N. Sp. 314.**Belg. Gegränuleerde Kuipers - Boor. Rumph. Angl. Grain girdled  
Stamper. Petiv. Gall. Tarriere chagrinee.*Testa subcylindrica, striis  
transuersis eleuatis punctato  
maculatis.Die fast walzenförmige  
Schale ist der Quere nach mit  
erhabenen Streifen umgeben,  
und mit gefleckten Punkten be-  
setzt.*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 35.**Rumph. amb. t. 33. f. EE.**Petiv. amb. t. 15. f. 13.**Gualt. Test. t. 25. f. L.**Argenv. Conch. Pl. 13. f. P.**Knor. Vergn. II. 4. t. 7. f.**— — — III. 19. t. 4. f.**Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 567. f.*C. III. 2. Conus Tere-  
bra.C. III. 2. Der Zirkelboh-  
rer.*Belg. Witte gevoorde Kuypers - Boor. Gall. Tarriere blanche &  
cerclée.*



Testa oblonga albida, striis Die längliche weiße Schale  
elevatis transuersis parallelis. ist mit erhabenen parallelen  
Querstreifen umgeben.

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 577. f.*

Testa oblonga crassa, transuer-  
sim striata; striis elevatis paralle-  
lis. Spira conica; anfractus decli-  
ves, striati, contigui. Color ru-  
bellus, fasciis duabus transuersis  
obsoletis albis. Vertex, & basis  
spoliata, amethystina.

Die Schale ist länglich, und dicht,  
in die Quere gestreift. Die Strei-  
fen erhaben, und gleichweit von  
einander entfernt. Der Wirbel  
kegelförmig, die Gewinde ab-  
hängig, gestreift, und aneinander  
gewachsen. Die Farbe blaßroth mit  
zweyen matten weißen Querbän-  
dern; der Wirbel, und die Grundspitze  
haben, wenn sie abgezogen sind,  
eine Amethystfarbe.

C. III. 3. Conus gra-  
nulatus.

C. III. 3. Der gefurch-  
te Bohrer.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 315.*

*Belg.* Bastert Orangie Admiraal. *Angl.* Small chain Stamper. *Petiv.*  
*Gall.* Faux Amiral orangé.

Testa oblonga transuersim  
sulcata, fasciis albis fusco  
maculatis.

Die längliche in die Quere  
gefurchte Schale ist mit weiß-  
sen braungefleckten Querbän-  
dern umgeben.

*Rumph. amb. t. 32. f. T.*

*Petiv. amb. t. 15. f. I.*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 25. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 48. f. 26.*

*Knor. Vergn. III. 6. t. 5. f.*

— — — *V. 24. t. 2. f.*

C. III. 4. Conus circum-  
ciscus.

C. III. 4. Der Draniens-  
bohrer.

Testa subcylindrica fusco-  
que maculata, striis incisis  
transuersis.

Die fast walzenförmige  
Schale ist braungesfleckt, und  
mit eingeschnittenen Querstri-  
chen umgeben.

*Valent. Abb. t. 2. f. II.*

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 571. f.*

Testa subcylindrica laevis striis  
transuersis incisis parallelis. Spira  
planiuscula. Vertex prominens, acu-  
tus centralis. Color ex flavescenti  
rubescens, fasciis transuersis obso-  
letis albis, punctis dispersis rubris.

Die walzenförmige Schale ist  
in die Quere mit eingeschnittenen,  
parallelen Strichen umgeben. Der  
Schnirkel ist flach. Der spizige  
Wirbel ragt aus der Mitte hervor.  
Die Farbe ist gelblich roth, mit  
matten weißen Querbändern, und  
zerstreuten rothen Punkten.

C. III. 5. Conus planor-  
bis.

C. III. 5. Der Platte-  
wirbel.



Testa conico ventricosa sul-  
ua, basi transuersim striato  
punctata; spira plana canali-  
culata.

Die kegelförmige rothgelbe  
Schale ist am Grunde mit  
punktirten Streifen umgeben,  
und auf dem flachen Schnirkel  
ausgekehlet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica ventricosiuscula,  
prope basin transuersim striata, striis  
eleuatis, punctato scabris. Spira  
plana. Anfractus canaliculati, mar-  
gine extimo acuto. Color ventris  
fuluus, spirae albo fuluoque ma-  
culatus. Basis intus amethystina.

Die kegelförmige etwas bäuchige  
Schale ist am Grunde in die Quere  
gestreift, die Streifen erhaben,  
und mit Körnern besetzt. Der Schnir-  
kel flach. Die Gewinde ausgekehlet,  
am äußersten Rande scharf. Die  
Schale ist rothgelb, der Schnirkel  
weiß gestreift. Der Grund inwän-  
dig amethystfärbig.

C. III. 6. Conus Magus.

C. III. 6. Das gefleck-  
te Käzchen.

*Linn. S. N. Sp. 317.*

*Belg. Geplekte Katje. Rumph. Angl. Tabby Stamper. Petiv. Gall.  
la Picotée. Argenv.*

Testa subcylindrica, fasciis  
longitudinalibus albo puncta-  
tis.

Die fast walzenförmige  
Schale hat nach der Länge  
laufende punktirte Bänder.

*Rumph. amb. t. 32. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 10.*

*Argenv. Suppl. Pl. 2. f. C?*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 20. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 27.*

*Knor. Vergn. VI. 16. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 641. f.*

C. III. 7. *Conus striatus.*

C. II. 7. Die Wolfenrolle.

*Linn. S. N. Sp. 318.*

*Belg. De Wolkhoorn. Rumph. Angl. Tyger Stamper. Petiv. Gall. l'Ecorchée. Argenv.*

Testa ouato oblonga nebulosa, lineis parallelis transversim picta.

Die ensförmig längliche wolfsichte Schale ist mit gleichweit entfernten Linien bemalet.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 6.*

*Valent. Abb. 7. t. 60. 61. f.*

*Rumph. amb. t. 31. f. F.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 4.*

— *Gaz. t. 98. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 5, 10.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 13. f.*



Knor. Vergn. I. 18. t. 1. f.

— — — III. 12. t. 5. f. 21. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 714 — 716. f.

C. III. 8. Conus Tex-  
tile.

C. III. 8. Die Spitzen-  
rolle.

Linn. S. N. Sp. 319.

Belg. Gouldlaken. Rumph. Angl. Goldbrocade Scheil. Hill. Gall.  
Le Drap d'or. Dav,

Testa ovato oblonga, venis  
reticulatis fuscis, maculis lu-  
teis fuscisque.

Die eysförmige, längliche  
gelb, und braun gefleckte Schaa-  
le ist mit netzförmigen braunen  
Adern bemalet.

Bouan. Recr. cl. 3. f. 135.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 10. p. 2. f. 43.

Rumph. amb. t. 32. f. O. P.

Petiv. amb. t. 15. f. 9.

Gualt. Test. t. 25. f. X.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. F. I.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 7.

Seb. Tbes. III. t. 43. f. 6 — 12. t. 47. f. 13 — 17.

Regensf. Samml. I. 6. t. 62. f.

Knor. Vergn. I. 18. t. 6. f.

— — — II. 8. t. 3. f.

Mart.



*Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 598 — 600.*

C. III. 9. *Conus aulius*. C. III. 9. Die Brunette.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Bruinet - Toot Rumph. Angl. The Porphyry Shell. Hill. Gall. La Brunette. Dav.*

Testa subcylindrica, maculis  
dispersis inaequalibus trigonis. Die beinahe walzenförmige  
Schale ist mit zerstreuten un-  
gleichen dreyeckigen Flecken be-  
zeichnet.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 133.*

*Rumph. amb. t. 33. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. G.*

*Seb. Thes. t. 43. f. 1, 2, 4, 5; t. 47 f. 13 — 15.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 25. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 5. t. 3. f.*

—— III. 19. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 592. f.*

C. III. 10. *Conus pen- naceus*. C. III. 10. Die Feders-  
tute,



Belg. De Zilver Lakén Rumph. Gall. Volute pannaachée.

Testa conica cinnamomea, Die kegelförmige zimmetfar-  
lineis punctatis transuersis, & bige Schale ist mit punktirten  
maculis pennatis dispersis pal- Querlinien, und zerstreuten  
lidis picta. weißlichen federsförmigen Fle-  
cken bemalt.

Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 596. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica crassa glaberrima. Die Schale ist kegelförmig, dicht  
Spira obtusa anfractibus infimis pla- und glatt, der Schnirkel stumpf,  
nis, . . . supremis eleuatis in ver- die unteren Gewinde flach, die ober-  
ticem centralem pyramidatum ob- ren in der Mitte pyramidenförmig  
tusum. Color cinnamomeus. Li- erhaben, und zugespitzt, zinno-  
neae pictae transuersae ex seriebus berfärbig mit rothbraunen aus  
punctorum ruforum. Maculae di- Punkten zusammengesetzten Quer-  
persae, albiae, aut pallide vio- linien. Die zerstreuten weißen, oder  
laceae, pennatae. weißblauen Flecken, sind federsfö-  
mig.

C. IV. Laxi, ventricosi.

C. IV. Weibbauchige Tuten.

C. IV. 1. Conus Spe-  
ctrum.

C. IV. 1. Das Gespenst.

[ Lim. S. N. Sp. 321.

Belg. Spookje. Rumph. Angl. Fairy-Stamper Petiv. Gall. Le Spec-  
tre.

Testa oblenga gibba, fas- Die längliche höckerige  
ciis longitudinalibus undula- Schale hat nach ihrer Länge  
tis. wellenförmige Bänder.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 32. f. S.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 5.*

*Valent. Abb. 5. t. 39. f.*

*Gualt. Test. t. 25. f. S.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 24.*

*Knor. Vergn. II. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 581. 583.*

C. IV. 2. *Conus bullatus.*

C. IV. 2. Die Wolfen-  
bäcke.

*Linn. S. N. Sp. 322.*

Belg. Wolkbakje.

Testa oblonga, nebulosa  
columella flexuosa, emargi-  
nata.

Die länglichte neblichte  
Schale hat eine gedrehte ein-  
gesäumte Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 1. f. 43.*

*Gualt. Test. t. 26. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 65. t. 726. 727. f.*

C. IV. 3. *Conus Tulipa.*

C. IV. 3. Die Tulpe.

*Linn. S. N. Sp. 323.*

K 5

Belg.



Belg. Achaat toot. *Angl.* The Tulip - Shell *Hill.* Gall. La Tulipe. *Argenv.*

Testa oblonga laeui, apertura patente, anfractibus super premis coronatis. Die längliche glatte Schale hat eine weite Mündung, und die obersten Gewinde gekrönt.

*List. Hist. Conch.* 1. 4. f. 10. p. 2. f. 7.

*Rumph. amb. t.* 34. f. K.

*Petiv. amb. t.* 4. f. 14.

*Argenv. Conch. Pl.* 16. f. B.

*Seb. Thes.* III. t. 42. f. 16, 20. t. 43. f. 20 - 22.

*Hill. Hist. of. Anim.* Pl. 8.

*Regenf. Samml.* I. 2. t. 20. f.

*Knor. Vergn.* V. 20. t. 1, 2. f.

*Mart. Konch. Kab.* II. 64. t. 718, 719.

C. IV. 4. Conus Geographus.

C. IV. 4. Die Kronen-  
hülle.

*Linn. S. N. Sp.* 324.

Belg. Wolkje. *Rumph.* *Angl.* Cloudy - Stamper *Petiv.* Gall. Brocard de Soie. *Argenv.*

Testa oblonga, spira coronata, apertura patente.

Die längliche Schale hat gekrönte Gewinde, und eine weite Mündung.

*Bonap.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 319.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 41.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 8.*

— amb. t. 15. f. 3. A.

*Rumph. amb. t. 31. f. G.*

*Gualt. Test. t. 26. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. A.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 1—4.*

*Knor. Vergn. III. 21. t. 2. f.*

— — VI. 17. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 717. f.*

## D. Cypraea.

## D. Die Porzellanschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 320.*

Testa convoluta, sub-  
ovata, apertura longitudi-  
nali, utrinque denticulata,  
extremitatibus effusis.

Die Schale ist zusam-  
mengerollet, einigermaßen  
eyförmig, ihre Mündung,  
welche der Länge nach he-  
rabläuft, ist beiderseits ge-  
zähnel, und an den En-  
den ausgeschnitten.



D. I. Mucronatae.

D. I. Spizwirblige,

D. I. 1. Cypraea Exanthema.

D. I. 1. Der Bastard Argus.

*Linn. S. N. Sp. 325.*

*Belg.* Bastert Argus. *Angl.* Great hebrew Gowry. *Petiv. Gall.* Le faux Argus. *Dav.*

Testa turbinata, pallide maculata, characteribus inscripta, linea longitudinali subramosa.

Die spizwirblige Schale ist weißgestreift, mit buchstabenhähnlichen Strichen bemalt, und nach der Länge des Rückens mit einer geschlängelten Linie versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 45, 46.**Petiv. Gaz. t. 96. f. 6.**Seb. Thes. III. t. 76. f. 16, 18.**Regeuf. Samml. I. 10. t. 38. f.**Knor. Vergn. I. 5. t. 3, 4. f.*

—— — II. 24. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 289. f. 29. t. 298. f.*

D. I. 2. Cypraea Mappa.

D. I. 2. Die Landcharte.

*Linn. S. N. Sp. 326.*

*Belg.* Kaaphoorn. *Angl.* The Map - Shell. *Hill. Gall.* La Carte géographique. *Dav.*

Testa



Testa turbinata, characteribus inscripta, linea longitudinali ramosa.

Die spizwirblige Schale ist mit buchstabenähnlichen Zügen bemalt, und mit einer ästigen Linie nach der Länge des Rückens durchzogen.

*Rumph. amb. t. 38. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 3, 13, 17.*

*Knor. Vergn. I. 26. t. 3. f.*

—— *Delic nat. I. t. B. IV. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 25. t. 245. f.*

D. I. 3. *Cypraea arabica.*

D. I. 3. Die arabische Buchstaben = Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 327.*

*Belg. Arabische Letters Hoorn. Gall. La fausse Arlequine. Dav.*

Testa turbinata, pallide maculata, characteribus inscripta, linea longitudinali simpliciter.

Die spizwirblige Schale ist blaßgefleckt mit arabischen Buchstaben ähnlichen Zügen und einer einfachen Linie nach der Länge des Rückens bemalt.

\* maculis inter characteres irregularibus.

\* mit unregelmäßigen Flecken zwischen den Zügen.

Litt.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 38. f. M.*

*Gualt. Test. t. 16. f. V.*

*Knor. Vergn. III. 12. t. 2. f.*

—— ——— VI. 20. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 328. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 1.*

β maculis rotundis inter caracte- β mit ründlichen matten Flecken  
res obsoletos. zwischen den Bügen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 51.*

*Argenv. Conch. Suppl. t. 2. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 331. f.*

D. I. 4. *Cypraea Argus.* D. I. 4. Der doppelte  
Argus.

*Linn. S. N. Sp. 328.*

*Belg. De dubbelde Argus. Angl. The Argus Shell. Hill. Gall.*  
*Le grand Atgus. Dav.*

Testa turbinata, subcylindrica, supra adpersa ocellis, Die spiewirblige Schale ist  
subtus maculis quatuor fuscis. walzenförmig, oben mit aus-  
genähnlichen Ringen, und  
unten mit vier braunen Fle-  
cken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 54.*

*Benan. Recr. cl. 3. f. 263.*

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 97. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 38. f. D.*

*Gualt. Test. t. 16. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 57. f.*

*Knor. Vergn. III. 11. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 285. 286. f.*

D. I. 5. *Cypraea testudinaria*.

D. I. 5. Die Schildkrötenporzellane.

*Linn. Syst. N. Sp. 329.*

*Belg. Schilpad - hoorn. Angl. Great tourtle Gowry. Petiv Gall. Le Lièvre. Dav.*

*Testa subcylindrica, pallida fuscomaculata, extremitatibus depressis.* Die einigermaßen walzenförmige Schale ist weißlich, und braungefleckt, an den Enden plattgedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 36.*

*Rumph. amb. t. 38. f. C.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 7.*

*Knor. Vergn. IV. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 271. 272. f.*

D. I.



D. I. 6. *Cypraea sterco-*  
*raria*.

D. I. 6. Das Weitz-  
aug.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Wyd - Oog.*

*Testa subturbinata, liuido*  
*testaceoque maculata, utrin-*  
*que marginata, subtus plana.*

Die einigermaßen spizwirts-  
lige Schale ist blaulich grau,  
mit ziegelfarbigen Flecken bei-  
derseits eingesäumt, und unten  
flach.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 15. f. S. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. I. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

α *pallida griseoque maculata, tu-*  
*berculo laterali mamillari.*

α *bläß und grau gefleckt, mit einer*  
*warzenförmigen Erhöhung an*  
*einer Seite.*

β *glaucio griseoque maculata ;*

β *faßl und grau gefleckt.*

γ *cerea unicolor, tuberculo laterali*  
*mamillari.*

γ *wachsweiß, einfarbig, mit einer*  
*warzenförmigen Erhöhung an ei-*  
*ner Seite.*

D. I. 7. *Cypraea Car-*  
*neola.*

D. I. 7. Der Fuchs.

*Linn. S. N. Sp. 331.*

*Belg.*



Belg. De roode Mol. Angl. Buff Gowry. Petiv. Gall. Taupe rousse.

Testa subturbinata pallida, Die blaße Schale hat eine  
fasciis incarnatis. etwas hervorstretende Wirbel-  
spitze, und fleischfarbige Quer-  
bänder.

α ore violaceo.

α mit violetter Mündung.

β ore albide, labio externo vix β mit weißer Mündung, und un-  
dentato. deutlich gezählter Lefze.

Rumph. amb. t. 38. f. K.

Petiv. Gaz. t. 80. f. 8.

Knor. Vergn. VI. 17. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 287. 288. f.

Mus. Caes. Vindobon.

D.I. 8. Cypraea Zebra. D.I. 8. Der graue Maul-  
wurf.

Linn. S. N. Sp. 332.

Belg. De grave Mol.

Testa turbinata cinerea, Die bleisfarbige Schale hat  
fasciis latis griseis, aperturæ eine hervorragende Spitze, brei-  
denticulis fuscis. te graue Querbänder, und an  
der Mündung braune Zähne.

L

Bman.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 266.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 15.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 5, 15.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. G.*

*Knor. Vergn. II. 24. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 2; 6 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 9. *Cypraea Talpa.*      D. I. 9. Der Maulwurf.

*Linn. S. N. Sp. 333.*

*Belg. Mol. Angl. The yellow zoned Porcellane Hill. Gall. La Taupe. Dav.*

*Testa turbinata subcylindrica testacea, fasciis albidis, basi incrassata atro fusca.*      Die braunlichgelbe walzenförmige Schale hat eine hervorstehende Würfelspize, blaße Querbänder, und einen aufgeschwellenen schwarzbraunen Boden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 38. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 16. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 37. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor.*



*Knor. Verg. I. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 273, 274. f.*

D. I. 10. *Cypraea lurida.*

D. I. 10. Die Maus.

*Linn. S. N. Sp. 335.*

*Belg. De Muis. Gall. La Souris. Dav.*

Testa turbinata, obsolete Die spizwirblige Schale  
fasciata, extremitatibus nigro hat matte Querbänder, an den  
bimaculatis, basi alba, Enden zwei schwarze Flecken  
und einen weißen Boden.

*Liszt. Hist. Conch. t. 4. f. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 13. f. E. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. C.*

*Adans. Seneg. t. 5. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 315. f.*

D. I. 11. *Cypraea lota.*

D. I. 11. Die Milch-  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 337.*

Testa subturbinata, utrin- Die einigermaßen spizwirb-  
que marginata, denticulis aper- lige Schale ist beiderseits ein-  
turae acutis. gesäumt, und an der Münz-  
dung mit spizen Zähnen versehen.



*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 322. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 12. *Cypraea fragilis.*

D. I. 12. Die Dünnschale.

*Linn. S. N. Sp. 338.*

*Belg. Turke Papier Porcelain - Hoorn. Gall. Porcellaine marbrée.*

Testa turbinata, ouata, glauca, picta maculis angulatis pallidis.

Die spizwirblige enförmige fahle Schale ist mit blaßen eckigen Flecken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 16. f. Q.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. Obrusac, seu absque Spira manifesta.

D. II. Stumpfwirblige, oder mit undeutlicher Wirbelspize.

D. II. 1. *Cypraea Caput serpentis.*

D. II. 1. Der Mohrenbauch.

*Linn. S. N. Sp. 339.*

*Belg. Klene Slange Kop. Angl. Smal Snake Gowry. Pet. Gall. La petite tete de Serpent.*

Testa obtusa, triquetra gibba, dorso albo maculato, labris albis.

Die stumpfwirblige dreysseitig höckerige Schale ist auf dem Rücken weißgesteckt, an den Lippen ganz weiß.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 50.*

*Rumph. amb. t. 38. f. F.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 7.*

— *Gaz. t. 96. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 15. f. O.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. G.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 316. f.*

D. II. 2. *Cypraea mauritiana.*

D. II. 2. Der große  
Schlangenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 340.*

*Belg. Slang Kop Rumph. Angl. Great turtle Leopard. Pet. Gall.  
Tete de Serpent. Dav.*

Testa obtusa plano convexa, dorso gibbo pallide maculato, basi nigricante.

Die stumpfwirbige, unten flache, oben erhabene Schale hat einen höckerigen blaß gefleckten Rücken, und schwärzlichen Boden.

α dorso fusco pallide maculato; lateribus fuscis.

α mit braunen blaßgefleckten Rücken, und braunen Seiten.

β dorso griseo albido maculato, lateribus lividis.

β mit lichtgrauen weißgefleckten Rücken, und blaulich grauen Seiten.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 52.*

*Petiv. Gaz. I. t. 96. f. 8.*

*Rumph. amb. t. 38. f. E.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 1, 2. f.*

—— — II. 27. t. 5. f.

*Mart. Kouch, Kab. I. 30. t. 317. f.*

D. II. 3. *Cypraea Vi-*  
tellus.

D. II. 3. Die Salzform  
Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 341.*

*Belg. Zout - Koreltje ; Angl. Salt - speckled Gowry Petiv. Gall. La Grêlée.*

Testa obtusa, livida, albido  
maculata,

Die stumpfwirblige Schale  
ist blaulichgrau, mit weißen Fle-  
cken.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 254.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 23.*

*Petiv. Gaz. I. t. 80. f. 2.*

*Rumph. amb. t. 38. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 3. f.*

*Mart. Konch, Kab. I. 23. t. 238. f.*

D. II. 4. *Cypraea Mus.*

D. II. 4. Die Kröte.

*Linn. S. N. Sp. 342.*

*Belg.*



Belg. Cartageense Wit-rugge. Angl. Carthagena Cowry Petiv.  
Gall. Le Crapaud Dav.

Testa obtusa, gibba, cinerea, Die stumpfwirblige höckeri-  
fascia longitudinali nigro ma- ge Schale ist von aschengrauer  
culata. Farbe, mit einem nach der  
Länge laufenden schwarzgesteck-  
ten Bande.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 2.

Rumph. amb. t. 39. f. 8.

Petiv. amb. t. 16. f. 4.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. E.

Seb. Thes. III. t. 76. f. 33, 34.

Knor. Vergn. III. 12. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 222. 223. f.

D. II. 5. Cypraea Ti-  
gris.

D. II. 5. Die Tigere  
porzellane.

Linn. S. N. Sp. 343.

Belg. Getygerde Kliphooorn. Angl. The great Leopard Pet. Gall.  
La Peau de Tigre. Dav.

Testa obtusa, antice rotun- Die stumpfwirblige vorne  
data, dorso maculato, basi rundliche Schale ist auf dem  
nivea. Rücken gesteckt, am Boden  
schneeweiß.

„ linea longitudinali nulla.

„ ohne Linie über die Länge des  
Rückens.



β linea longitudinali dorsali sa-  
uo rubente.

β mit einer nach der Länge des  
Rückens laufenden gelbrothen  
Linie.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 38. f. A.*

*Petiv. Gaz. t. 96. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. G, H, I, L.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 232. 236. f.*

D. II. 6. *Cypraea Lynx.* D. II. 6. Die Masern-  
Porzellane.

! *Linn. S. N. Sp. 344.*

*Belg. Mazelen. Rumph. Angl. Thick Saffron - tooth' dGowry. Pet.  
Gall. La Truitée. Dav.*

*Testa obtusa maculis fuscis,* Die stumpfwierblige braun-  
*linea longitudinali fulva,* ore gefleckte Schale hat nach der  
*rufo.* Länge des Rückens einen roth-  
gelben Strich, und eine braun-  
rothe Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 38. f. O, P.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 14. f. C, D.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 6, 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. 29. t. 303, 304. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. 7.



D. II. 7. *Cypraea Isabella*.

D. II. 7. Die Isabelle.

*Linn. S. N. Sp. 293.*

*Belg. Isabelle, Rumph. Angl. Isabella Gowry Pet. Gall. L' Isabelle. Dav.*

*Testa obtusa subcylindrica, extremitatibus croceis.*

Die stumpfwirblige einigermassen walzenförmige Schale hat safranrothe Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 4.*

*Rumph. amb. t. 39. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 16.*

— *amb. t. 16. f. 16.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. P.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 27. t. 275. f.*

D. II. 8. *Cypraea cylindrica*.

D. II. 8. Die Walzenporzellane.

*Testa obtusa cylindrica, vertice complanato, extremitatibus fusco bimaclatis.*

Die stumpfwirblige walzenförmige Schale ist an dem Wirbel plattgedrückt, an den Endspitzen mit zweien braunen Flecken gezeichnet.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa cylindrica, spira complanata. Dorsum pallide amethystinum; Latera maculis raris fulvis. Extremitates utrinque marginatae bimaculatae. Rima inaequalis. Dentes labii extremi remotiores. Basis niuea.

Die Schale ist walzenförmig. Die Wirbelspitze plattgedrückt. Der Rücken von bläßer Amethystfarbe. Die Seiten sind beiderseits eingesäumt, und mit braunlichen zerstreuten Flecken, die Endspitzen aber mit zweien braunen Flecken gezeichnet. Die Spalte der Mündung ist ungleich. Die Zähne der äußeren Lippe stehen etwas mehr von einander entfernt. Der Grund ist schneeweiß.

D. III. Umbilicatae.

D. III. Mit nabelförmig eingedrücktem Wirbel.

D. III. 1. Cypraea Hirundo.

D. III. 1. Die Schwalbe.

Linn. S. N. Sp. 350.

Belg. Het blaeuve Katje.

Testa umbilicata subcylindrica, extremitatibus fusco bimaculatis.

Die nabelförmig eingedrückte walzenförmige Schale hat an den Enden zweien braune Flecken.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 20.

Petiv. Gaz. t. 30. f. 3.

Mus. Caes. Vindobon.

D. III. 2. Cypraea Aesulus.

D. III. 2. Das Eselchen.

Linn. S. N. Sp. 351.

Belg.



Belg. Ezeltje. Rumph. Angl. Ass Gowry. Pet. Gall. Le petit Ane.  
Ar. env.

Testa umbilicata albida, Die nabelförmig eingedrückt-  
fasciis dorsalibus tribus fuscis. te weißliche Schale hat drey  
braune Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 21.

Rumph. amb. t. 39. f. M.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 11.

— amb. t. 16. f. 18.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. T.

Adams. Seneg. Pl. 5. f. H.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. IV. 25. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 280 f.

D. III. 3. Cypraea Er-  
rones.

D. III. 3. Das Ba-  
starddrachenhöfchen.

Linn. S. N. Sp. 352.

Belg. Poolische Muts. Angl. Freckled Olive Gowry Petiv. Gall.  
Le Bonnet polonois.

Testa umbilicata oblonga, Die nabelförmig eingedrückt-  
fauce violacea, macula dor- te längliche nebelichte Schale  
fali testacea. hat einen violeten Mund, und  
einen braun grauen Fleck auf  
dem Rücken.

Petiv.



*Pesiv. Gaz. t. 97. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 294. 295. f.*

D. IV. Marginatae.

D. IV. Eingesäumte.

D. IV. 1. *Cypraea cri-*  
*braria.*

D. IV. 1. Das Argus  
Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 353.*

*Belg.* Het Klene Wyfje van den Argus. *Angl.* The little Wife of the Argus. *Gall.* Le petit Argus *Argenv.*

<p>Testa umbilicata oblonga lutea, maculis rotundatis al- bis, basi emarginata alba.</p>	<p>Die nabelförmig eingedrückt- te, längliche, gelbliche Scha- le, ist mit runden Flecken besetzt, und mit einem einge- säumten Boden versehen.</p>
--	---

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 9. f. 42.*

*Pesiv. Gaz. t. 8. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 39. f. R.*

*Argenv. Test. t. 18. f. X.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 74. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 336. f.*

D. IV. 2. *Cypraea*  
*Moneta.*

D. IV. 2. Die guineis-  
sche Münze.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 354.*

*Belg.* Gemeene geele Kauris. *Angl.* Black moors Thooth. *Petiv. Gall.* Monnoye de Guinée.

Testa marginata albida, lateribus nodolis. Die eingesäumte weißliche Schale hat knotige Seitenränder.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 233.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 59.*

*Rumph amb. t. 39. f. C.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 14.*

—— *Gaz. t. 97. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 14. f. 4. 5.*

*Argenz. Conch. Pl. 18. f. K.*

*Knor. Vergn. IV. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 337. 338. f.*

D. IV. 3. *Cypraea Annulus.* D. IV. 3. Der Ring.

*Linn. S. N. Sp. 355.*

*Belg.* Blauwe Kauris. *Gall.* La Colique. *Dav.*

Testa marginata, annulo flavo discum dorso ambiente. Der Mittelrücken der eingesäumten Schale ist mit einem gelben Ringe eingefasst.

*Petiv.*



*Rumph. amb. t. 39. f. D.*

*Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 4. f.; 16. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 11.*

*Mart. Konch. Konch I, 24. t. 239. 240. f.*

D. IV. 4. *Cypraea caurica.*

D. IV. 4. Die gefleckte Cauris.

*Linn. S. N. Sp. 356.*

*Belg. Pockjes. Rumph. Angl. Long Massle Gowry. Petiv. Gall. La peau d'Ane. Dav.*

Testa dorso luteo alboque nebuloso, margine inaequali albido, fusco punctato. Der Rücken ist gelb und weiß nebelicht, der Rand ungleich, weißlich mit braunen Punkten.

*Rumph. amb. 38t. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 15. f. X.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 13.*

*Mart. Konch. Kab, I, 29. t. 301. 302. f.*

C. IV. 5. *Cypraea Draena.*

D. IV. 5. Das Drachenhaupt.

*Belg.*



Belg. Draackje. Angl. Dragon Gowry. Pet. Gall. Tete de Dragon.

Testa derofo marginata, lateribus albis fusco maculatis; dorso luteo nebuloso, macula media testacea.

Die Schale hat einen gleichsam zernagten Saum, die weißen Seiten sind braun gefleckt, der Rücken gelb, neblicht, mit einem braunen grauen Flecke in der Mitte.

Petiv. amb. t. 16. f. 10.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 292. 293. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa oblongo ouata. Vertex umbilicatus retusus. Dorsum carinis duabus transversis obsoletis. Latera emarginata, margine incrassato eroto. Dentes latitudinem labii extimi occupantes. Color dorsi luteo nebulosus; Latera alba punctis fuscis dispersis maculata. Basis alba.

Die Schale ist länglicht eysförmig. Der Wirbel ist mit einem stumpfen nabelsförmigen Eindruck, der Rücken mit zweien stumpfen Schnitten der Quere nach besetzt. Die Seiten sind eingesäumt, der Saum aufgeworfen, und gleichsam zernagt. Die Zähne erstrecken sich über die ganze Breite der äußeren Lefze. Der Rücken ist von gelber neblichter Farbe. Die Seiten sind weiß, mit zerstreuten braunen Punkten. Der Boden ganz weiß.

D. IV. 6. Cypraea erosa.

D. IV. 6. Das Weißaug.

Linn. S. N. Sp. 357.

Belg. Witogje. Rumph. Angl. Whis-eyed Gowry Petiv. Gall. Pointillage blanc.

Testa



Testa crenato marginata, Die weiß punktirte Schale  
albo punctata, lateribus ma- hat einen gekerbten Saum, und  
cula fuscente. an jeder Seite einen braunli-  
chen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 39.*

*Petiv. Gaz. I. t. 97. f. 19.*

— amb. t. 16. f. 12.

*Rumph. amb. t. 39. f. A.*

*Gualt. Test. t. 15. f. H.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 320, 321. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 7. *Cypraea fla-*  
*ueola.*

D. IV. 7. Der Brand-  
fleck.

*Linn. S. N. Sp. 358.*

*Belg. Brand - vlakje.*

Testa derosa, lutea albo- Die gelb und weiß neblichte  
que nebulosa, lateribus ful- Schale hat einen zernagten  
uis. Rand, und braunrothe Seiten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 14. f. E.*

*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 267, 268. f.*

D. IV. 8.



D. IV. 8. *Cypraea spur-*  
ga.

D. IV. 8. Der Gelb-  
schmuz.

*Linn. S. N. Sp. 359.*

*Belg. Geelsmetje.*

Testa subemarginata, spira  
plana orbiculari, labio exter-  
no vix dentato.

Die etwas eingesäumte Scha-  
le hat einen flachen runden Wir-  
bel, und an dem äußeren Rande  
kaum deutliche Zähnen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 9. *Cypraea sto-*  
lida.

D. IV. 9. Das Rost-  
flecken.

*Linn. S. N. Sp. 360.*

*Belg. Het Soostolakje. Angl. The Beetle Porcellane. Hill.*

Testa marginata pallida, ma-  
culis quadrangularibus testa-  
reis.

Die eingesäumte weißliche  
Schale ist mit rostfarbigen vier-  
eckigen Flecken bemalt.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 18.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. 1.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 305. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



D. IV. 10. *Cypraea*  
*heluola*.

D. IV. 10. Die Stern-  
 porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 361.*

*Belg.* Sterretje. *Angl.* Star Gowry *Petiv.* Gall. Porcellaine e toi-  
*lée.* *Dav.*

*Testa* crenato marginata, Die höckerige weißpunktirte  
*gibba*, albo punctata, sub- und unten rothbraune Schale,  
*tus ruffa.* hat einen zernagten Saum.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 39. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 17.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 326. 327. f.*

D. IV. 11. *Cypraea*  
*ocellata*.

D. IV. 11. Das Schwarz-  
 aug.

*Linn. S. N. Sp. 362.*

*Testa* subemarginata, ocellis Die einigermaßen eingesäum-  
*nigris inter annulos pallidos.* te Schale hat schwarze mit blaß-  
 gelben Ringen eingefasste Augen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 333. 334. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 12.



D. IV. 12. *Cypraea*  
poraria.

D. IV. 12. Die Frie-  
selporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 363.*

Testa marginata, ocellis  
albis, annulo fusco cinctis;  
basi amethystina.

Die eingesäumte Schale hat  
weiße mit Ringen eingefasste  
Augen, und einen amethyst-  
farbigen Boden.

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 324. 325.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 13. *Cypraea* Pe-  
diculus.

D. IV. 13. Die Laus.

*Linn. S. N. Sp. 364.*

*Belg. Zee Vloog Rumph. Angl. Louse Gowry Petiv. Gall. Pou  
de Mer. Argenv.*

Testa marginata subglobosa,  
striis eleuatis transuersis, in  
rimam usque protensis.

Die eingesäumte fast kugel-  
förmige Schale ist mit erhabes-  
nen Duerstreifen besetzt, die  
sich bis zur Spalte erstrecken.

α sulco dorfi longitudinali.

α mit einer Furche nach der Länge  
des Rückens.

β sulco dorfi longitudinali nullo.

β ohne Furche nach der Länge des  
Rückens.

*List. angl. t. 3. f. 17.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 56, 57.*



*Rumph. amb. t. 39. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 22.*

*Gualt. Test. t. 14. f. P. t. 15. f. P, R.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 3.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 6. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 29. t. 310, 311. f.*

D. IV. 14. *Cypraea*  
Nucleus.

D. IV. 14. Die Reiss-  
fornporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 365.*

*Belg. De Rys Korrel. Angl. The Rice Gowry Petiv. Gall. La petite Verole. Dav.*

Testa utrinque marginata,  
sulcis tuberculisque exaspera-  
ta,

Die beiderseits eingesäumte  
Schale ist mit Furchen, und  
Körnchen besetzt.

\* alba (major) subrostrata.

\* weiß (und größer) mit schnau-  
zenförmigen Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 58.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 12.*

— amb. t. 16. f. 11.

*Rumph. amb. t. 39. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. S.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 22.*

*Knor. Vergn. IV. 17. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 312. f.*

utrinque obtusa, punctis eleuatis annulo ferrugineo cinctis (minor). β an beiden Enden stumpf (und kleiner) die erhabenen Körner sind mit rothfarbigen Ringen eingefaßt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 15. Cypraea D. IV. 15. Die Affel.  
staphylaea.

*Linn. S. N. Sp. 366.*

*Belg. Pisseped. Gall La Cloporte. Argenv.*

Testa punctis eleuatis, sine striis, extremitatibus luteis. Die Schale ist mit erhabenen Körnern besetzt, ohne Streifen, und an den Endspitzen gelb.

*Gualt. Test. t. 14. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. S.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. t. 29. f. 313. 314. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



D. IV. 16. *Cypraea* D. IV. 16. Das Korn-  
*Cicercula*, Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 367.*

*Belg. Korelye Knoopje. Rumph. Angl. Wart Gowry. Petiv.*

*Testa utrinque rostrata, ad-* Die an beiden Enden schnau-  
*sperla punctis eleuatis.* zenförmige Schale ist mit er-  
habenem Punkten besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 62.*

*Rumph. amb. t. 39. f. K.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 243. 244. f.*

D. IV. 17. *Cypraea* D. IV. 17. Das glatte  
*Globulus*, Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 368.*

*Belg. Paerltje. Rumph. Angl. Pearl Gowry. Petiv.*

*Testa laeui, utrinque rostra-* Die Schale ist glatt und an  
*ta.* beiden Enden schnauzenför-  
mig.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 4.*

*— amb. t. 16. f. 19.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 39. f. L, N.*

*Gualt. Test. t. 14. f. M.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 242. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 12.*

E. Bulla.

E. Die Blasenschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 322.*

Testa conuoluta laevis; Die Schale ist zusammen-  
Apertura subcoarctata ob- gerollet und glatt; ihre  
longa; Columella obli- Mündung, welche der Län-  
qua edulenta, ge nach herabläuft, mei-  
stens nur an einem Ende  
ausgeschnitten; die Spin-  
del schief und ohne Zähne.

E. 1. Bulla Onum.

E. 1. Das Ey.

*Linn. S. N. Sp. 369.*

*Belg. Porselein - hoorn. Rumph. Angl. White Egg - Gowry. Petiv. Gall. L'oeuf. Dav.*

Testa ouata, obtuse biro- Die eysförmige Schale ist  
stri, labro exteriori denta- an beiden Enden mit einer  
to. stumpfen Schnauze versehen,  
an der äußeren Kefze gezähnt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 252.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 38. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 6.*

—— *Gaz. t. 97. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 15. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 76. f. 6, 10.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 205. 206. f.*

E. 2. *Bulla birostris.*

E. 2. Der kleine We-  
berspuhl.

*Linn. Syst. N. Sp. 371.*

*Belg. Bastert Wewers - Spoeltje. Gall. Petite Navette.*

Testa oblonga, margine in-  
crassato, angulato, rostris elon-  
gatis laevibus.

Die längliche Schale hat  
einen aufgeschwollen eckigen  
Rand, und glatte schnabelför-  
mige Endespitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 66.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 217. f.*

E. 3. *Bulla Spelta.*

E. 3. Das Loch.

*Linn. S. N. Sp. 372.*

*Belg.*



Belg. Jockje. Angl. Smal Leghorn Gōwrikin. Pet.

Testa oblonga utrinque ob- Die längliche Schale hat  
tusiuscula, labro arcuato in- etwas stumpfe Endespitzen, und  
crassato. eine gebogene verdickte Lefze.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 68.

Petiv. Gaz. t. 66. f. 2, 3.

Gualt. Test. t. 15. f. 4.

Ginan. adr. II. t 13. f. 95.

Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 215. 216. f.

E. 4. Bulla verrucosa. E. 4. Der Hochrücken.

Linn. S. N. Sp. 373.

Belg. Witte Jamboeze; Rumph. Angl. White Nipple Gowry - Kin.  
Petiv. Gall. La Bosue. Dav.

Testa gibbosa transuersim Die höckerige Schale hat  
carinata, extremitatibus gra- einen eckigen Quervulst, und  
no rotundo adnato. an jedem Ende ein rundes an-  
gewachsenes Knöpfchen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 67.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 22.

— amb. t. 16. f. 23.

Rumph. amb. t. 38. f. H.

Gualt. Test. t. 16. f. F.

M 5

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 17.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 220, 221.*

E. 5. *Bulla gibbosa.*

E. 5. Der Wulst.

*Linn. S. N. Sp. 374.*

*Belg. Hoogruggetje. Gall. La petite bouche.*

Testa subcylindrica, angu- Die einigermaßen walzen-  
lo dorsali eleuato transuerso. förmige Schale führt auf den  
Rücken einen in die Quere lie-  
genden erhabenen Gürtel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 249. 339.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 64.*

*Petiv. Gaz. t. 15. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 15. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 18.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 3, 4. f.*

—— — VI. 32. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 211. 212. f.*

E. 6. *Bulla Naucum.*

E. 6. Das Taubeney.

*Linn. S. N. Sp. 375.*

*Belg.*



Belg. Witte Kievits - Ey. Valent. Gall. La Bulle d'eau. Dav.

Testa rotundata subpellucida, transuersim striata, utrinque umbilicata, Die rundliche halbdurchsichtige Schale ist in die Quere gestreift, und an beiden Enden mit einem Nabelloche versehen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 4.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 73.

Rumph. amb. t. 27. f. H.

Gualt. Test. t. 13. f. G. G.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. Q.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 45.

Knor. Vergn. VI. 38. t. 2, 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 200. f.

E. 7. Bulla aperta.

E. 7. Die offene Blase.

Linn. S. N. Sp. 376.

Testa subrotunda pellucida, apertura patentissima, Die rundliche durchsichtige Schale hat eine ganz erweiterte offene Mündung.

Gualt. Test. t. 13. f. EE.

Mus. Caes. Vindobon.

E. 8. Bulla Ampulla.

E. 8. Das Kiebizey.

Linn. S. N. Sp. 378.

Belg.



Belg. Kievits - Ey. Angl. The Indian Dipper. Pet. Gall. La  
Muscade Dav.

Testa rotundata opaca, ver-  
tice umbilicato.

Die rundliche undurchsichti-  
ge Schale hat einen nabelför-  
mig eingedrückten Wirbel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 3.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.

Petiv. Gaz. t. 50. f. 13. t. 99. f. 14.

Rumph. amb. t. 27. f. G.

Gualt. Test. t. 12. f. E — F.

Adans. Seneg. Pl. 1. f. 2.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 34 — 44.

Regenf. Samml. I. 5. t. 58. f. 8. t. 21. f.

Knor. Vergn. II. 8. t. 1. f.

—— — V. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 188. f. 22. t. 202-204f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 4, 5.

E. 9. Bulla lignaria.

E. 9. Die Papierrolle.

Linn. S. N. Sp. 379.

Belg. Opgerollde Papier. Gall. 1' Oublie. Dav.

Testa obouato oblonga  
transuersim striata, vertice  
umbilicato.

Die verkehrt ensförmige läng-  
liche Schale ist in die Quere  
gestreift, und mit einem ge-  
nabelten Wirbel versehen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 71.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 115. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 194 195. f.*

E. 10. *Bulla Physis.*

E. 10. Die Staaten-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 380.*

*Belg. Staate Vlaggetje. Valent. Gall. Gondole rayée. Argenv,*

Testa ovato oblonga, picta  
lineis transuersis undulatis,  
spira horizontali.

Die ensförmige längliche  
Schale ist in die Quere mit  
wellenförmigen Linien bemalt,  
und mit einem wagrechten  
Schnitzel versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 75.*

*Bonan. Mus. Kirch, cl. 3. f. 403.*

*Valent. Abb. t. 2. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 13. f. F. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 46 — 50.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 9.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 196. 197. f.*

E. 11. *Bulla Amplu-*  
stre.

E. 11. Das rothe Band.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 381.*

*Belg. Rood - bandje.*

*Testa subglobosa albida, Die einigermaßen kugelför-*  
*cingulis transuersis fuscis, mige weißliche Schale hat brau-*  
*spira obtusa. ne Quergürteln, und einen*  
*stumpfen Schnirkel.*

*Mart. Conch. Kab. I. 21. t. 198. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**E. 12. Bulla Ficus.**

**E. 12. Die Feige.**

*Linn. S. N. Sp. 382.*

*Belg. Spaansche Vyg. Rumph. Angl. Fig - whelk. Pet. Gall, La*  
*Figue.*

*Testa obouato clauata, re- Die verkehrt kegelförmige,*  
*ticulato striata, rostro exser- kaulähnliche und nezförmig ge-*  
*to, spira oblitterata. streifte Schale hat einen vers*  
*längerten Schnabel, und un-*  
*deutlichen Schnirkel.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 15.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 46.*

*Rumph. amb. t. 27. f. K.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. 7. M.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 17. f. O.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 93.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 4. f.*

—— ——— III. 23. t. 1. f.

—— *Delic. nat. I. t. B. II. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. III. 66. t. 734. f.*

E. 13. *Bulla Rapa.*

E. 13. Die Rube.

*Linn. S. N. Sp. 383.*

*Belg. Knollhoorn. Rumph. Angl. Round Partridge. Petiv Gall.*  
*Le Radix. Dav. Ital. Il Radiccio.*

Testa rotundato turbinata, Die runde birnförmige Scha-  
 spira exserta, rostro incurua- le hat einen hervorragenden  
 to. Schnickel, und umgedrehten  
 Schnabel.

*Rumph. amb. t. 27. f. F.*

*Petiv amb. t. 9. f. 8.*

*Valent. Abb. 9. t. 82. f.*

*Gualt. Test. t. 26. f. H.*

*Argenv. Conch Pl. 17. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 4. f. 80.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 13 - 16. 18 - 20, 22, 23,*

—— t. 68. f. 7, 8.

*Knor.*



*Knor. Vergn. I. 19. t. 5. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. II f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 747-749. f.*

**E. 14. Bulla Terebellum.**      **E. 14. Der glatte Böttchenbohrer.**

*Linn. S. N. Sp. 388.*

*Belg. Kuipers - Boor. Rumph. Angl. The speckled Augur - Peg. Petiv. Gall. La Tarriere. Dav.*

*Testa cylindrica, spira subulata, basi truncata.*

Die walzenförmige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, und eine abgestumpfte Grundspize.

*α alba, punctis dispersis minutissimis.*

*α weiß, mit sehr kleinen zerstreuten Punkten.*

*β pallida, punctis maculisque nebulosis.*

*β blaß, mit nebelichten Punkten und Flecken.*

*γ pallida, lineis punctatis.*

*γ blaß, mit punktirten Linien.*

*δ pallida, lineis obliquis angularis.*

*δ blaß, mit schiefen Winkelzügen.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 57.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 30. f. S.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 13. f. 24.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. G.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 4. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 568. 569. f.*

E. 15. *Bulla Cypraea.* E. 15. Die Porzellan-  
blase.

*Linn. S. N. Sp. 389.*

*Belg. Bruin gebandeerd Bakje; Gall. Baquet bandé.*

Testa ovato oblonga, spi- Die eysförmige längliche  
rae apice prominulo, colu- Schale hat eine hervorragende  
mella torta, Wirbelspize, und eine gewun-  
dene Spindel.

*Knor. Vergn. VI. 4. t. 5. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

E. 16. *Bulla virginea.* E. 16. Die Prinzen-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 390.*

*Belg. Prince Vlag. Gall. Le Ruban. Dav,*

Testa subturrita erecta, co- Die einigermaßen gethürm-  
lumellae basi truncata, cin- te und aufrechte Schale ist an  
gulis coloratis transuersis, dem Grunde der Spindel ab-  
gestumpfet, und mit gefärbten  
Querbändern bemalt.

N

α fasciis



- α fasciis miniatis flauisque, lineis  
roseis & purpurascensibus. α mit meningrothen und gelben  
Bändern; wie auch rosenrothen  
und purpurfarbigen Linien.
- β fasciis flauis & viridibus, lineis  
purpureis & violaceis. β mit gelben und grünen Bändern;  
wie auch purpurrothen und vio-  
letten Linien.
- γ lineis fuluis, cum fasciis inter-  
ruptis, solum in anfractibus su-  
premis alternantibus. γ mit rothgelben Linien, die mit  
unterbrochenen Bändern auf den  
oberen Gewinden allein abwech-  
seln.
- δ tota alba, lineis miniatis prope  
futuras. δ ganz weiß, mit meningfarbigen  
Linien an den Näthen.
- ε fusca, anfractuum fascia media  
& utrinque saturali alba. ε braun, deren jedes Gewind in  
seiner Mitte, wie auch beider-  
seits an der Nath eine weiße Binde  
trägt.
- η alba, fasciis parallelis fulcis. η weiß, mit gleichweit abstehenden  
braunen Bändern.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 66.*

*Petiv. Gaz. t. 22. f. II. t. 151. f. I.*

*Gualt. Test. t. 6. f. A. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. N. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 116.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 62-74. t. 40. f. 38. 39.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 46. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 7. f.*

— — — V. 25. t. 4. f.

— — — Del. nat. I. t. B. II. f. 6.

E. 17. *Bulla achatina*.

E. 17. Die französische Schellenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 391.**Belg. Fransche Belhoorn.**Testa ouato oblonga, columellae basi truncata.*

Die eiförmige längliche Schale hat eine am Grunde abgestumpfte Spindel.

 $\alpha$  fasciis longitudinalibus undulatis latis, columella rubra, $\alpha$  mit nach der Länge laufenden breiten Wellen, und rother Spindel.*Bonan. Recr. cl. 3. f. 192.**List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 34.**Petiv. Gaz. t. 44. f. 7.**Gualt. Test. t. 45. f. B.**Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 60.**Seb. Thes. III. t. 71. f. 1 — 3.**Knor. Vergn. IV. 24. t. I. f.*—— *Del. nat. I. t. B. V. f. I.* $\beta$  fasciis longitudinalibus undulatis tenuibus, columella alba. $\beta$  mit nach der Länge laufenden schmalen Wellen, und weißer Spindel.*Seb. Thes. III. t. 71. f. 4, 5.**Knor. Verg. V. 12. t. 2. f.**Mus. Caes. Vindobon.* $\gamma$  ponderosa, alba unicolor. $\gamma$  schwer, weiß, einfarbig.*Mus. Caes. Vindobon.*F. *Voluta*.

F. Die Faltenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 322.*

N 2

Testa



Testa conuoluta, columella transuerse plicata.

Die zusammen gerollte Schale ist an ihrer Spindel mit Quersalten versehen.

F. I. Apertura coarctata.

F. I. Mit eingefaster Mündung.

F. I. I. Voluta Auris Midae.

F. I. I. Das Midasohr.

Linn. S. N. Sp. 392.

Belg. Midas - Oor. Rumph. Angl. Midas - Ear. Petiv. Gall. Oreille de Midas. Argenv.

Testa ouali oblonga, spira, basique rugulosa, columella bidentata.

Die eysförmige längliche Schale, ist an dem Wirbel und Grunde gerunzelt, an der Spindel mit zwei Falten versehen.

α nivea (major.)

α schneeweiß (größer.)

β fusca (minor.)

β braun (kleiner.)

Bonan. Mus. Kirch. cl. 3. f. 412.

Rumph. amb. t. 33. f. H.H.

Petiv. amb. t. 8. f. 2.

Gualt. Test. t. 55. f. G.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 122.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 21. 22.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II, 43. t. 436 — 438. f.

Testa



F. I. 2. *Voluta Auris*  
Sileni.

Testa ovali gibba umbilicata, columellae plica unica crassa flexuosa.

F. I. 2. Das Langohr.

Die eysförmige höckerige Schale hat an der Spindel eine dicke gedrehte Falte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata gibba, laevis, longitudinaliter obsolete striata. Spira obtusa, ex anfractibus quatuor convexis, subito decreascentibus, in verticem obtusum terminata. Apertura ovata coarctata. Labium exterius marginatum, interius tenue replicatum, & super columellam expansum, dente subtus oblique flexuoso, crasso. Basis perforata. Color badius, fasciis undulatis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist eysförmig, und glatt, nach der Länge herab matt gestreift. Der Schnirkel besteht aus vier gewölbten geschwinde abnehmenden Windungen, die sich in eine stumpfe Spitze endigen. Die Mündung ist eysförmig, ganz eingeklappt. Die äußere Lefze ist eingeklappt, die innere dünne über die Spindel ausgebreitet, an welcher unten eine dicke schief gedrehte Falte liegt. Der Grund ist durchbohret. Die Farbe schwarzbraun, mit rothbraunen nach der Länge herablaufenden Wellen.

F. II. *Cylindroidae effusae*,

F. II. Einigermassen walzenförmige, mit ausgeschnittener Mündung.

F. II. 1. *Voluta porphyria*.

F. II. 1. Die Lagerwalze.

*Linn. S. N. Sp. 398.*

Belg. Porphyre Daadel. Oud. Angl. The Camp. Da Cost. Porphyre Argenv.

Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus acute marginatis, infimis planiusculis, columella incrassata oblique plicata.

Die walzenförmige glatte Schale hat scharfrandige Windungen, deren unterste etwas flach sind, mit einer dichten schief gefalteten Spindel.

Picta lineis angularis.

Mit eckigen Winkelzügen bemalt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 142.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 11.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 24. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 1. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV f. 4.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 498. f.*

F. II. 2. *Voluta Oliua.* F. II. 2. *Die Olivenwalze.*

*Linn. S. N. Sp. 399.*

*Belg. Daadel. Angl. The Olive Shell. Hill. Gall. l'Olive. Day.*

*Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus planiusculis, extimo tumido reflexo; columella incrassata, oblique plicata.* Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat etwas flache Schnirkelgewinde, deren äußerstes aufgeworfen, und umgebogen ist; mit einer dichten schiefgefalteten Spindel.

α *albida lineis undulatis, fasciisque reticulatis rufis.* α weiß mit rothbraunen wellenförmigen Linien, und netzartigen rothbraunen Querbändern.

*Mart.*



*Mart. Conch. Kab. II. 51. t. 561. f.*

♂ ex viridescenti reticulata, fasciis duabus transuersis nigris, columella crocea. ♂ mit grüntlichen Netzen, zwey schwarzen Querbändern, und einer safranfarbigen Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. c. 6. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. M.*

*Mart. Conch. Kab. II. 48. t. 512. 513. f.*

γ ex coerulescente luteoque maculata, fasciis transuersis viridibus γ bläulich, und gelb gesteckt, mit grünen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 26.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. H. G.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 4. f.*

*Mart. Conch. Kab. II. 48. t. 511. f.*

δ olivacea, fasciis transuersis interruptis nigris. δ olivengrün, mit unterbrochenen schwarzen Querbändern.

*Belg. Prince- Begraafenis. Rumph. Angl. Prince Stamper. Petiv. Gall. Drap mortuaire. Dav.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 25.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 4.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 1.*

*Valent. Abb. 8. t. 68. f.*



*Argenv. Conch. Pl. 13. f. S.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. F. a.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 480. f.*

♀ lutescens, fasciis longitudinalibus ♀ gelblich, mit rothbraunen nach  
undulatis rufis. der Länge laufenden wellenförmigen Bändern.

*Mart. Konch. Kab. II. 47. t. 505. f.*

♂ alba, luteo fuscoque nebulosa, fa- ♂ weiß, mit gelben und braunen  
scis duabus transuersis fuscis. Wolken, und zwey braunen  
Querbändern.

*Belg. Porphyrssteene Daadel. Rumph. Angl. The purple Marble Date Gall. Olive satinée a bandes. Oud.*

Fauce rosea.

Mit rosenrothem Schlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 24. f. O.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. A. — D.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 476, 477. f.*

♂ aurantia; fasciis obsoletis trans- ♂ orangenroth, mit violetten matten.  
uersis violaceis. Querbändern.

*Belg. Achaatje. Rumph. Gall. La Cornaline.*

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 495. f.*

9 aurantia, fascia media transuersa 9 orangenroth mit einem schneeweißen Querbände um die Mitte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

8 pallide lutea, maculis adspersa, bläßgelb, mit bläulichen Flecken  
coeruleſcentibus, fauce violacea. beſetzt, und einem violeten Schlun-  
de.

*Liſt. Hiſt. Conch. I. 4. f. 10. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 6.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 5.*

*Gualt. Teſt. t. 23. f. H, J, E.*

*Seb. Theſ. III. t. 53. f. W.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 493, 494. f.*

α brunna unicolor.

α braun einfärbig.

*Belg. Grauwve Munnik. Valent. Olive de Satin. Pet.*

*Seb. Theſ. III. t. 53. f. K.*

*Knor. Vergn. V. 27. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Konch II, 47. t. 501. f.*

*Da Coſt. Elem. Pl. 5. F. 7.*

λ ex fuſco nigra, unicolor.

λ ſchwarzbraun.

*Belg. Svarte Daadel. Rumph. Gall. La Moresque Dar.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 27.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 23. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. L.*

*Knor. Vergn. V. 28. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 472, 473.*

F. II. 3. *Voluta gibbosa.* F. II. 3. Die dicke  
Schlauchdattel.

*Belg. Sluik - Daaſel Mus. Oud. Angl. The clouded Olive. Hill.  
Gall. Agate boſſue. Mus. Oud.*

Testa ovali ventricosa, co- Die eyförmige dickbäuchige  
lumella calloſa, & ſpirac acu- Schale, hat eine ſchwüſſige  
minatae anfractibus infimis in- Leſze, und aufgetriebene Un-  
crallatis. tergewinde an zugespizten  
Schnirkel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 24. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 4, 5. f.*

— — V. 4. t. 4. f.

*Mart.*



Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 565. 566. f.

Testa ovata, oblonga, ponderosa, glabra. Spira acuminata. Anfractus fulco futurali distincti, infimi tumidi gibbi. Labium exterius integerrimum, acutum; interius reflexum, tumidum, callosum, supra incrassatum, subtus oblique, fuscum, emarginatum. Venter extus brunneus, maculis oblongis, & fascia transversa albida. Faux alba.

Die Schale ist länglich eiförmig, schwer und glatt. Der Schnirkel zugespitzt. Die Windungen sind durch eine gefurchte Naht von einander abgesondert, deren untere aufgeschwollen und ungleich. Die äußere Lefze hat einen ganzen scharfen Rand die innere ist übergeschlagen, schwülig, und oben dick aufgeworfen, unten schief gefurchet, und eingesäumt. Der Leib ist außen braun, mit weißen länglichen Flecken und einem Quersbände. Der Schlund weiß.

F. II. 4. Voluta Ispidula.

F. II. 4. Die Spizdatstel.

Linn. S. N. Sp. 400.

Testa subcylindrica laevi, spira conica, futuris acutis, columella incrassata oblique plicata.

Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat einen glatten kegelförmigen scharf randigen Schnirkel, und eine dicke schief gespaltene Spindel,

α albida, brunno maculata.

α weißlich, mit braunen Flecken.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 10. f. 12.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. Q.

Mart. Konch. Kab. II, 49. t. 526. f.

β alba, maculis undatis fuscis.

β weiß, mit wellenförmigen braunen Flecken.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 23. f. M. 00.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. V.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 6. t.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 487. 488. f.*

♀ albida, maculis venisque fuscis. ♀ lang, mit braunen Flecken, und Adern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 18.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 553. f.*

♂ niueus unicolor.

♂ schneeweiß, einfarbig.

*Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.*

♂ alba, maculis raris, & fascia ♂ weiß, mit seltenen Flecken, und einem Querbande an dem Schnitzel von rothbrauner Farbe.

*Seb. Thes. III. t. 53. f. X.*

*Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 524. 525. f.*

♂ alba parva, undis fuscis tenuissimis. ♂ weiß, mit sehr feinen braunen Wellen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 543. 544. f.*

♀ grisea



7 grisea, parua, lineis angulatis vio- 7 lichtgrau klein mit violeten Wink-  
laceis. selzügen.

List. Hist. Conch. t. 4. f. 10. f. 13.

Petiv. Gaz. t. 152. f. 6.

Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 545. 547. f.

3 castanea.

3 Kastanienbraun.

1 fusca alboque maculata.

1 braun, und weiß gefleckt.

Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 537, 538. f.

8 alba punctis luteis, maculisque 8 weiß, mit gelben Punkten, braun-  
undatis fuscis, fauce violacea. nen Wellen, und einem violetter  
Echlunde.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 3.

Petiv. Gaz. t. 156. f. 18.

Rumph. amb. t. 98. f. 5.

Gualt. Test. t. 23. f. T.

Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 518. 521. f.

F. III. Quatas, esulac.

F. III. Eßkrümige, mit ausgeschnit-  
tener Mündung.

F. III. 1. Voluta bul-  
lata.

F. III. 1. Die Blasen-  
walze.

Testa



Testa emarginata, ouata, Die eingesäumte enförmige  
laeui, spira oblitterata, com- glatte Schale hat einen stum-  
planata, columella quadripli- pfen plattgedrückten Wirbel,  
cata. und drey Falten an der Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. II.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. I. f. 27. t. I. f.*

Testa ouata laevis. Spira oblitterata, complanata. Apertura lanceolata, extremitatibus subefusis. Columella conuexa glabra, subtus plicata, plicis crassis, obliquis, quatuor. Labrum obtusum extrorsum reflexum, incrassatum. Basis infra plicas oblique marginata. Color pallide rubescens, fasciis transuersis obsoletis albis.

Die Schale ist enförmig, und glatt. Der Schnirkel stumpf, und plattgedrückt. Die Mündung lanzettförmig. Die Ende mit unvollkommenen Auschnitten. Die erhabene glatte Spindel hat unten vier schief stehende dichte Falten. Die äußere Lefze ist stumpf, auswärts überschlagen, und aufgeworfen. Der Grund hat unter den Falten einen schiefen Saum. Die Farbe ist blasroth mit matten weißen Querbändern.

F. III. 2. Voluta Persicula.

F. III. 2. Die Kornel-  
firsche.

*Linn. S. N. Sp. 404.*

Testa emarginata laeui, spiram retuso umbilicata, columella septem plicata, labro marginato crenato.

Die eingesäumte glatte Schale ist mit einem stumpfen genabelten Schnirkel, und an der Spindel mit sieben Falten versehen; an der äußern Lefze eingesäumt und geforbet.

α lineis transuersis fuluis cincta.

α mit rothgelben Querstrichen.

*Belg. Gebandeerde Kornelstje. Gall. La Cornouille fasciée.*

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 28. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI, 21. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II, 42. t. 419. 420. f.*

α punctis adpersa incarnatis.

β mit fleischrothen Punkten gestreuet.

*Belg. Gestoppelte Kornelkirsje. Gall. La Cornouille ponctuée.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 28. f. C, D, E.*

*Mart. Konch. Kab. II, 42. t. 421. f.*

F. III. 3. *Voluta marginata.*

F. III. 3. Die eingesäumte Kornelkirsche.

Testa ovata, spira obsoleta, lateribus incrassato marginatis, columella quadriplicata. Die eysförmige Schale hat einen unvollkommenen Schnirkel, aufgeworfene eingesäumte Seiten, und vier Falten an der Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata, laevis; Spira turbinata, adnata labro incrassato; Latera cincta margine lato, tumido. Columella plicata, plicis cratlis obliquis quatuor. Apertura lanceolata, extremitatibus effusis. Color niueus.

Die Schale ist eiförmig, und glatt. Der Schnirkel zugespitzt, und mit der Vorderleiste verwachsen. Die Seiten sind mit einem breiten aufgeworfenen Rande eingefasst. Die Spindel hat vier dicke Quersalten. Die Mündung ist lanzettförmig, an beiden Enden ausgeschnitten. Die Farbe schneeweiß.

F. III. 4. Voluta Faba.

F. III. 4. Die Bohne.

Linn. S. N. Sp. 406.

Belg. Bonje. Angl. Black Speckled Silver Cowrykin. Petiv. Gall. Cocombre pointée.

Testa ovata, laevis, spirae mucronatae anfractibus plicatis, columella quadriplicata. Die Schale ist eiförmig, und glatt, ihr Schnirkel zugespitzt, und gesalten.

Color glaucus, punctis oblongis fuscis, per series longitudinales pictis. Die Farbe ist fahl, mit nach der Länge stehenden Reihen länglicher brauner Punkten bemalt.

Petiv. Gaz. t. 10. f. 5.

Gualt. Test. t. 28. f. Q.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 2.

Knor. Vergn. IV. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 432. 433. f.

F. III. 5. Voluta glabella.

F. III. 5. Die glatte Gurke.

Linn. S. N. Sp. 407.

Belg.



Belg. Pruim. Gall. La Prune.

Testa ouata laevi, mucronata, columella quatriplicata, labro incrassato, reflexo. Die eiförmige, glatte, spitzwiedrige Schale, hat an der Spindel vier Falten, und eine verdickte, übergeschlagene Schalenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 326.

Gualt. Test. t. 28. f. L.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 3.

Knor. Vergn. IV. 21. t. 3, 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 422. 423. f.

F. III. 6. Voluta mercatoria. F. III. 6. Das brütende Taubchen.

Linn. S. N. Sp. 409.

Belg. Broedende Duifje. Gall. Le Pigeon couvant.

Testa ouata, transuersim striata; columella retusa, labroque denticulatis. Die eiförmige Schale ist in die Quere gestreift, an der stumpfen Spindel, wie auch an der äußern Leiste gezähnt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 42.

Petiv. Gaz. t. 9. f. 4.

Gualt. Test. t. 43. f. f. L.

O

Adans.



*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 29.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. 5. f.*

— — — VI. 16. t. 6. 7. f. 18. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 452. — 458. f.*

F. III. 7. *Voluta rustica.* F. III. 7. Der Oliven-  
fern.

*Linn. S. N. Sp. 410.*

*Belg. Boetje.*

*Testa ovata, lacui, spira* Die eiförmige, glatte, spitz-  
*mucronata; columella, labro-* wirblice Schale ist an der  
*que denticulatis,* Spindel, und äußeren Resse  
gezähnt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 48, 49.*

*Petiv. Gaz. t. 30. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 43. f. E. G. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 18. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 469. f.*

F. III. 8. *Voluta pau-* F. III. 8. Das arme  
*percula.* Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 411.*

*Gall. La Mignature.*

*Testa*



Testa ouata oblonga, laeui,  
columella quatriplicata, la-  
bro obtuso.

Die euförmige längliche  
Schale, hat vier Falten an  
der Spindel, und eine stumpfe  
Schalenlefze.

Color fuscus, aut ferrugineus, fas-  
ciis longitudinalibus albidis.

Braun, oder eifenroftig, mit weiß-  
lichen nach der Länge laufenden  
Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 35.*

*Gualt. Test. t. 54. f. L.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1386. f.*

F. III. 9. Voluta men-  
dicaria.

F. III. 9. Das trauren-  
de Täubchen.

*Linn. S. N. Sp. 412.*

Testa ouata, transuersim  
tenuissime striata, spira coro-  
nata; columella complanata,  
labroque denticulatis.

Die euförmige, in die  
Quere fein gestreifte Schale,  
ist an dem Schnirkel mit Hör-  
nern, an der platt gedrückten  
Spindel, und der Schalenlefze  
mit Zähnchen besetzt

Atra, fasciis transuersis tribus  
albis.

Schwarz mit drey weißen Quer-  
bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 47.*



*Petiv. Gaz. t. 11. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 52. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 460. 461. f.*

F. III. 10. *Voluta cancellata.*

F. III. 10. Die nezförmige Faltenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 413.*

Testa ovata, striis elevatis transuersis, plicisque obliquis mit erhabenen Streifen, und reticulatim intertexta, columbischen Falten nezförmig übermella umbilicata, biplicata, zogen, und mit einer durchbohrenten, zweymal gefalteten, verdrehten Spindel versehen contorta.

*Gualt. Test. t. 48. f. B. C.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45. 46. 48.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 5. f. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. *Fusiformes, marginatae, effusae.*

F. IV. Spindelförmige, eingesäumte, mit ausgeschnittener Mündung.

F. IV. 1. *Voluta filosa.*

F. IV. 1. Die Schnurwalze.

Testa



Testa fusiformi tenuissime Die spindelförmige Schale  
reticulato striata, cingulis ele- ist mit sehr feinen Strichen netz-  
uatis transuersis columella förmig gezeichnet, mit erhabenen  
quatriplicata, labro crenato. Querschnüren umgürtet, an  
der Spindel mit vier Falten ver-  
sehen, an der Schalenleiste ge-  
kerbet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa fusiformis, striis minu- Die Schale ist spindelförmig,  
tissimis incis reticulata, cingulis mit sehr feinen Strichen besetzt,  
fili formibus eleuatis, remotis, ven- und schnurförmigen erhabenen,  
tris duodecim, anfractuum quatuor. Quergürteln umgeben, deren zwölf  
Columella umbilicata, replicata, den Leib, vier die Gewinde umge-  
plicis eleuatis obliquis quatuor. ben. An der genabelten, und über-  
Labrum acutum, sub cingulis sul- geschlagenen Spindel sind vier er-  
catum. Basis effusa, extrus marginata. Die äußere  
Color albus, cingulorum ru- habene schiefe Falten. Die äußere  
fus. Leiste ist scharfrandig, unter den  
Schnüren gesurchet. Der Grund  
ausgeschnitten und außen einge-  
säumt. Die Farbe weiß, mit roth-  
braunen Schnüren.

F. IV. 2. Voluta Sca-  
bricula.

F. IV. 2. Die rauhe  
Nadelwalze.

*Linn. S. N. Sp. 417.*

*Belg. Rauwe Pen - hoorn.*

Testa fusiformi, striis eleua- Die spindelförmige Scha-  
tis transuersis, longitudinali- le hat erhabene Querstreife, und  
bus incis, columella qua- nach der Länge laufende einge-  
triplicata, labro crenato. schnittene Striche, eine gekerbte  
Schalenleiste und vier Quers-  
falten.



*Gualt. Test. t. 53. f. D.*

*Knor. Vergn. III. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1389. f.*

F. IV. 3. *Voluta sanguifuga.*

F. IV. 3. Die Fahnennadel.

*Linn. S. N. Sp. 419.*

Testa fusiformi, longitudinaliter sulcata, striis incisim transversis, columella quadruplicata, labro laevi.

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach gefurcht, in die Quere mit eingeschnittenen Strichen besetzt, ihre Spindel vierfach gefalten, die Schalenleiste glatt.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 11. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 29. f. V.*

*Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 53. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 11. 12.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 5. f.*

*Knor. Vergn. IV. 11. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1367. f.*

F. IV. 4. *Voluta castra.*

F. IV. 4. Die braune Brandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 420.*



Testa fusiformi, laevi, spi- Die spindelförmige glatte  
 rac anfractibus longitudinali- Schale ist an den Wirbelge-  
 ter rugosis, columella quatri- winden mit länglichen Run-  
 plicata. zeln, an der Spindel mit vier  
 Falten versehen.

*Gualt. Test. t. 53. f. E.*

*Seb. Tbes. III. t. 49. f. 21, 22.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1369. f.*

F. IV. 5. Voluta Vul-  
 pecula.

F. IV. 5. Der Fuchs-  
 thurm.

*Linn. Syst. N. Sp. 423.*

*Belg. Toornje Rumph.*

Testa fusiformi longitudina- Die spindelförmige Schale  
 bus angulata, striis transuer- hat nach der Länge herablau-  
 sis incisis, columella quatri- fende Ecken und eingeschnitte-  
 plicata. ne Querstriche, mit einer vier-  
 fach gefalteten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 39.*

*Petiv. Gaz. t. 56. f. I.*

*Rumph. amb. t. 29. f. R.*

*Valent. Abb. 2. t. 10. f.*

*Gualt. Test. t. 54. f. B.*

*Knor. Vergn. V. 16. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1366. f.*



F. IV. 6. *Voluta plicaria*.

F. IV. 6. Die knotige Bandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

*Belg. Genobelde Band - Pen. Gall. Le Minaret. Dav.*

*Testa fusiformi, angulis antice subspinosis, columella quatriplicata, labro laevi.* Die spindelförmige Schale hat vorne zugespitzte Ecken, vier Falten an der Spindel, und eine glatte Schalenleiste.

*Bonon. Recr. el. 3. f. 64.*

*Gualt. Test. t. 54. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 23, 24.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 5, 6. f.*

—— ——— III. 27. t. 4. f.

*Mart. Kouch, Kab. IV. 148. t. 1362. 1363. f.*

F. IV. 7. *Voluta pertusa*.

F. IV. 7. Die durchgestochene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

*Belg. Monniks Kappe.*

*Testa fusiformi, striis punctatis transversim pertusa, columella quinquaplicata.* Die spindelförmige Schale hat aus durchgestochenen Punkten bestehende Streifen, und fünf Falten an der Spindel.

*List.*



*List. Hist. Conch.* l. 4. f. II. f. 65.

*Gualt. Test.* t. 54. f. H.

*Seb. Thes.* III. t. 50. f. 28. 47. 48.

*Knor. Vergn.* IV. 28. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab.* IV. 147. t. 1358. 1359. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. 8. *Voluta Mitra episcopalis.* F. IV. 8. Die Bischofs-  
mütze.

*Linn. S. N. Sp.* 425.

*Belg. Penne hoorn. Rumph. Angl. The Bishops - Miter Shell.*  
*Hill. Gall. La tiare episcopale. Argenv.*

Testa fusiformi, laevi, co- Die spindelförmige glatte  
lumella quatriplicata. Schale hat an der Spindel  
vier Falten.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 120.

*Rumph. amb.* t. 29. f. K.

*Petiv. amb.* t. 13. f. II.

*Gualt. Test.* t. 53. f. G.

*Argenv. Conch. Pl.* 9. f. G.

*Regenf. Samml.* I. 5. t. 33. f.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 7.

*Knor. Vergn.* I. 6. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab.* IV. 147. t. 1360. f.

F. IV. 9. *Voluta Mi- F. IV. 9. Die Pabst-  
tra papalis.* trone,

O 5

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 426.*

*Belg.* De Paus - Krone. *Rumph. Angl.* The papal - Crown. *Da Cost.* Gall. La tiare papale. *Dav.*

Testa fusiformi, anfractibus coronatis, labro denticulato, columella quatriplicata. Die spindelförmige Schale hat gekrönte Windungen, eine gezähnelte Schalenleiste, und vier Falten an der Spindel.

*Bonan, Recr. cl. 3. f. 119.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 66 - 68.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 53. f. 7. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 1. — 5, 37.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 1. f.*

*Knor. Verg. I. 6. t. 1. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1353. 1354. f.*

F. IV. 10. Voluta Musica.

F. IV. 10. Die Notenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 427.*

*Belg.* Musiek - hoorn. *Angl.* The Musik Shell. *Hill. Gall.* La Musique *Dav.*

Testa marginata, anfractibus obtuse spinosis, columella octoplicata. Die eingesäumte Schale ist auf den Gewinden mit stumpfen Stacheln, und an der Spindel mit acht Falten besetzt.

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 296. 297.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 28. f. Z.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 88.*

*Seb. Thes. III. t. 57. f. 7 — 19. 20.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. I. f.*

— — — III. 12. t. I. f.

*Murray. Fund. Test. t. I. f. 17.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 14. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 96, t. 926. 929. f.*

F. IV. 11. *Voluta Vespertilio.*

F. IV. 11. *Die Fledermaus.*

*Linn. S. N. Sp. 428.*

*Belg. De Vleermuis. Klein. Angl. Long Batt Music Stamper. Pet. Gall. Chauve Souris. Dav.*

Testa marginata, anfractibus acute spinosis, columella quatriplicata. Die eingesäumte Schale hat spizige Stacheln auf den Gewinden, und eine viermal gefaltene Spindel.

« spinis brevibus.

« mit kurzen Stacheln.

*List.*



*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 11. f. 16.  
*Rumph.* amb. t. 32. f. 7.  
*Petiv.* amb. t. 15. f. 12.  
*Valent. Abb.* I. t. 1. f. ; 7. t. 62. f.  
*Gualt. Test.* t. 29. f. F, G, H, V.  
*Seb. Thes.* III. t. 57. f. 4, 5.  
*Knor. Vergn.* II. 6. t. 4. f.  
*Mart. Konch. Kab.* III. 98. t. 938, 939. f.

♂ spinis acutis rectis.

♂ mit spizigen geraden Stacheln.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 11. f. 17.  
*Petiv. Gaz.* t. 70. f. 10.  
 — amb. t. 15. f. 8.  
*Gualt. Test.* t. 28. f. J. M.  
*Klein. Meth. Ostr.* t. 5. f. 89.  
*Seb. Thes.* III. t. 67. f. 1-5.  
*Knor. Vergn.* I. 22. t. 3. f.  
 — Delic. nat. I. t. B. VI. f. 5.  
*Mart. Konch. Kab.* III. 98. t. 937. f.

γ maxima, spinis acutis incurvis. γ sehr groß mit spizigen gekrümmten Stacheln.

*Mart. Konch. Kab.* III. 97. t. 934, 935. f.



F. IV. 12. *Voluta hebraea.*

F. IV. 12. Die wilde Musik.

*Linn. S. N. Sp. 429.*

*Belg. De wilde Musyk - hoorn. Engl. The oriental Music. Gall. L'hebraïque Dav.*

Testa ovata, anfractibus acutis spinosis, plicis quinque crassioribus, tribusque obsoletis.

Die eiförmige Schale hat an den Gewinden spizige Stacheln, und an der Spindel fünf starke, und fünf schwächere Falten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 293.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 32. f. L.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 28. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.*

*Seb. Tbes. III. t. 57. f. 1 - 3, 6.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 1, 2. f.*

—— ——— VI. 15. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 96. t. 924. 925. f.*

F. IV. 13. *Voluta Capitelum.*

F. IV. 13. Die Base.

*Belg. Witte Vaas, Engl. The white Music, Gall. L' Aigrette. Dav.*

Testa



Testa ovata, nodosa, rugosa, columella triplicata, basi umbilicata.

Die eiförmige, knotige, runzelichte Schale hat drei Falten an der Spindel, und am Grunde eine nabelförmige Vertiefung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 37. f. A.*

*Argenv. Conch Pl. 15. f. K.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 76.*

*Knor. Vergn. VI. 35. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 947. 948. f.*

F. IV. 14. *Voluta muricata.*

F. IV. 14. Die rothmündige Vase.

*Belg. Capitaale Schwitzersbroek.*

Testa plicata, spinisque muricata, columella quinque plicata, perforata.

Die gefaltene und stachelichte Schale hat fünf Falten an der durchbohrten Spindel.

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 949. 950. f.*

Testa ponderosa, transversim sulcata, sulcis acutis alternatim aequalibus. Spira conica, nodosa. Anfractus, ventrisque basis spinosa; spinis conicis, fornicatis, obtusis.

Die Schale ist schwer, in die Quere gefurcht, mit scharfen wechselweise ungleichen Furchen besetzt. Der Schnirkel kegelförmig und knotig. Die Gewinde, und der Aperi-



Apertura oblonga. Labrum exterius denticulatum, subtrus plicatum. Columella laevis, rugis transversis tribus majoribus, duabus alternis minoribus. Basis perforata; Color albus, aperturae roseus.

Grund des Leibes sind stachelicht: die Stachel kegelförmig, hohl und stumpf. Die Mündung länglich. Die Schalenleiste ist gezähnt, unten gefalten. Die Spindel glatt, mit fünf größeren, und zwei kleineren Falten. Der Grund ist durchbohret. Die Farbe weiß, die Mündung rosenroth.

F. IV. 15. *Voluta ceramica.*

F. IV. 15. Die gezakte Vase.

*Linn. S. N. Sp. 432.*

*Belg. Getakte Swizers-broeck. Rumph. Angl. Ceram Spec Shell. Petiv. Gall. Chauffe - Trape.*

Testa utrinque acuminata, spinis diuergentibus, columella quinque plicata.

Die an beiden Enden zugespizte Schale ist mit ausgebreiteten Stacheln besetzt, und an der Spindel mit fünf Falten versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 368.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 51.*

*Rumph. amb. t. 24. f. A. t. 49. f. L.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 55. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. E.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 2. f.*

—— VI. 35. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. III, 99. t. 943. . f.*

F. V;



F. IV. 16. *Voluta Py-*  
*rum.*

F. IV. 16. Die Birn-  
walze.

*Belg.* Witte offerhoorn. *Angl.* Gall. *La rave.* *Dav.*

*Testa* pyriformi, rostrata,  
*ponderosa*, *columella* tri-qua-  
*triplicata*.

Die birnförmige schwere  
Schale ist mit einem Schna-  
bel, und drey bis vier Falten  
an der Spindel besetzt.

$\alpha$  *major*, *alba*, *columella* tripli-  
*cata*.

$\alpha$  größer, weißer, mit dreyimal  
gefaltener Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 194.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 25.*

*Rumph. Amb. t. 36. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 46. f. C.*

*Knor. Vergn. VI. 39. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 95. t. 916. f.*

$\beta$  *minor*, *fuscopunctata*, *columella*  
*quatriplicata*.

$\beta$  kleiner, braunpunktiert, mit vier-  
mal gefaltener Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 26.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 49.*

*Knor. Vergn. VI. 22. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 95. t. 917. 918. f.*



F. V. Ventricosae.

F. V. Bäuchige.

F. V. I. Voluta aethiopica.

F. V. I. Die Mohren-  
frou.

Linn. S. N. Sp. 435.

Belg. Gekroonde Bak. Rumph. Angl. Ceram Coronnet. Petiv. Gall.  
Couronne d' Ethiopie. Dav.Testa ovata ventricosa, spi-  
ra coronata spinis fornicatis,  
apice papillari, columella  
quatriplicata.Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an dem Schirmkel  
mit hohlen Stacheln, und ei-  
ner warzenförmigen Spitze ver-  
sehen, mit vier Falten an der  
Spindel.

α spinis fornicatis erectis.

α mit hohlen aufgerichteten Stas-  
cheln.

Bonan. Recr. cl. 3. f. I.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 4.

Rumph. amb. t. 31. f. B.

Petiv. amb. t. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 29. f. H.

Seb. Thes. III. t. 64. f. 4.

Knor. Vergn. II. 4. t. I. f.

— Del. nat. I. t. B. 6. f. 2.

Mart. Konch. Kab. III. 73. t. 778. 779. f.

β spinis fornicatis decumbentibus. β mit darniederliegenden hohlen  
Stacheln.

Rumph. amb. t. 31. f. A.

Petiv. amb. t. 3. f. 13.

P

Gualt.



Gualt. Test. t. 29. f. 7.

Seb. Thes. III. t. 64. f. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 15. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 75. t. 785. f.

γ spinis obsoletis.

γ mit unvollkommenen Stacheln.

Knor. Vergn. V. 8. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 72. t. 772. 773. f.

F. V. 2. Voluta Cymbium.

F. V. 2. Die Gondel.

Linn. S. N. Sp. 436.

Belg. Jacobs-Kruck. Engl. Clouded Melon. Gall. Cuiller de Neptune. Dav.

Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute marginatis, apice papillari, columella quadriplicata.

Die bäuchige Schale hat rinnenartige scharfrandige Gerwinde mit einer warzenartigen Spitze, und vier Falten an der Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 6.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 11. f. 6.

Gualt. Test. t. 29. f. B.

Adans. Seneg. Pl. 3. f. 2.

Seb.



*Seb. Thes. III. t. 65. f. 5, 6; t. 66. f. 5.*

*Knor. Vergn. II. 30. t. 1. f.*

—— ——— *V. 28. t. 1. f.*

—— *Delic nat. I. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 70. t. 762. - 765. f.*

F. V. 3. Voluta Olla.

F. V. 3. Der Topf.

*Linn. S. N. Sp. 437.*

*Belg. Teepel bak. Valent. Angl. The Melon Tun. Da. Cost. Gall. Tasse de Neptune, Dav.*

Testa ovata ventricosa, spirae anfractibus canaliculato Die eysförmige löuchige  
conuexis, columella bi-tri- Schale hat gewölbte ausge-  
plicata, fehlte Windungen, und zwei  
bis drey Falten an der Spin-  
del.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 29. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 97.*

*Seb. Thes. III. t. 66. f. 18.*



*Knor. Vergn. V. 28. t. 7. f.*

— — — VI. 22. t. 2. f.

*Mart. Konch. Konch III. 71. t. 766. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 9.*

## G. Buccinum.

## G. Das Rindhorn.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 323.*

Testa spiralis; apertura effusa delinens in canalum retusum; labium explanatum.

Die schnirkelförmig gewundene Schale hat eine eingeschnittene Mündung, die in eine kurze Rinne ausläuft; und eine ausgebreitete Schalenleiste.

G. I. Ampullacea, inflata.

G. I. Flaschenartige, aufgeblasene.

G. I. 1. Buccinum Galea

G. I. 1. Das Schalenhorn.

*Linn. S. N. Sp. 439.*

*Belg. Geribde Belheorn. Gall. Tonne cannelée Dav.*

Testa subrotunda inflata, sulcis transversis, linea elevata interstinctis, labro edentulo.

Die rundliche aufgeblasene Schale ist mit Quersulcen besetzt, dazwischen mit einer erhabenen Linie umgürtet, und an der äußern Lippe ohne Zahn.

*Gi.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 183.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 42. f. A.A.*

*Ginan. adr. II. t. 12. f. 93.*

*Mart. Konch. Kab. III. 116. t. 1070. f.*

G. I. 2. Buccinum Per-  
dix.

*Linn. S. N. Sp. 440.*

*Belg. Patrys - hoorn. Angl. Indian Partridge Shell. Hill. Gall.  
Le Perdix. Argenv.*

Testa ouata inflata, trans- Die eysförmige aufgeblasene  
versum sulcata, albo maculata, Schale ist in die Quere gefur-  
labro edentulo. chet, mit weißlichen Flecken,  
und ungezählter äußerer Lippe.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 191.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 13.*

— amb. t. 4. f. 11.

*Rumph. amb. t. 27. f. C.*

*Gualt. Test. t. 51. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 5.*

*Seb. Tbes. III. t. 68. f. 12, 13, 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1078, 1079. f.*



G. I. 3. Buccinum Po-  
mum.

G. I. 3. Die dicklippige  
Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 441.*

*Belg.* Diklippige Olyhoorn. *Rumph. Angl.* Thik lip'd Partridge.  
*Petiv. Gall.* Perdrix a grosse-levre. *Dav.*

Testa ovata, inflata, trans-  
verse sulcata, apertura den-  
tata.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere ge-  
furchet, und an der Mündung  
ungezähnel.

Albo fulvoque maculata, fulcis  
concavis, spira brevis.

Weiß- und rothbraun gefleckt, mit  
hohlen Furchen, und kurzem Schnir-  
kel.

*Rumph. amb. t. 27. f. B.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 51. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 70. f. 2 — 4.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 370. 371. f.*

G. I. 4. Buccinum sul-  
cosum.

G. I. 4. Die gefurchte  
Sturmhaube.

Testa ovata, inflata, trans-  
versim sulcata, labio explana-  
to granuloso.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere gefur-  
chet, und an der ausgebreite-  
ten Spindellefze mit Körnern  
besetzt.

*Seb.*



*Seb. Thes. III. t. 68. f. 15. 17.*

*Ginon. adr. II. t. 5. f. 44.*

• *Mart. Konch. Kab. III. 118. t. 1081. f.*

Testa ovata inflata ponderosa, sulcis numerosis transuersim cincta. Anfractus contingui Spira acuminata, reticulatim striata. Labrum plicatum. Labium explanatum, punctis eleuatis scabrum. Basis definens in canalem recuruum, ascendentem. Color albidus, fasciis transuersis rufis.

Die Schale ist eiförmig, aufgeblasen, und der Quere nach mit vielen Furchen umgürtet. Die Gewinde berühren einander. Der zugespitzte Schnirkel ist nezförmig gestreift. Die Schalenlefze gefalten. Die Spindellefze ausgebreitet und mit erhabenen Körnern besetzt. Der Grund verliert sich in eine krumme aufgerichtete Röhre. Von weißer Farbe, mit rothbraunen Querbändern.

G. I. 5, Buccinum Dolum.

G. I. 5. Das Faß.

*Linn. S. N. Sp. 442.*

*Belg. Geplekte Belhoorn. Angl. Great spat rib'd Partridge. Pet. Gall. Tonne dentelée. Dav.*

Testa rotundata ventricosa, cingulis eleuatis, sulcisque remotis transuersis, rostro prominulo, labro dentato.

Die rundliche bäuchige Schale ist mit erhabenen Gürteln, und breiten Furchen der Quere nach umgeben, mit einem hervorragenden Schnabel, und gezähnter Lefze versehen.

Albida cingulis albo fuscoque articulatis.

Weiß, mit weiß und braun unterbrochenen Gürteln.



α *fulcis obtusis latis.*

α mit stumpfen breiten Furchen:

β *fulcis linea elevata interstinctis.* β mit Furchen, die mit einer erhabenen Linie unterbrochen sind.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 17, 25.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 19.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 11.*

— *amb. t. 12. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 27. f. A.*

*Gualt. Test. t. 39. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 9 t. 89. f. H, J, P.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1073. 1074. f.*

G. II. *Cassidea*, rostro recurvo.

G. II. Sturmhauben, mit umgebogenen Schnabel.

G. II. 1. *Buccinum echinophorum*.

G. II. 1. Die Knotenschelle.

*Linn. S. N. Sp. 443.*

*Belg.* Geknobbelte Belhoorn *Rumph. Angl.* Knot-listed Kasket.  
*Petiv. Gall.* Casque tuberculé.



Testa rotundata, cingulis Die ründliche Schale hat  
tuberculatis, rostro ascenden- knotige Gürteln, und einen  
te. aufgerichteten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 18. 19.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 27. n. 1.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 14.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. P.*

——— *Zoom. Pl. 3. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 18.*

*Ginan. adr. II. t. 5. f. 43.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 1. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 16. t. 1. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 407, 408. f.*

G. II. 2. *Buccinum cor-  
nutum.*

G. II. 2. Die gestrickte  
Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 445.*

*Belg. Gebreide Stormhoed. Rumph. Angl. Knot listed Kasker.  
Petiv. Gall. Casque tricoté. Dav.*

Testa turbinata reticulata, Die verkehrt kegelförmige  
tuberculis spinosis, apertura nebartig gestrickte Schale hat  
dentata, knotige Stachelgürteln, und  
eine gezähnte Mündung.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 155.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 73.*

*Petiv. Gaz. t. 151. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 23. f. A.*

*Gualt. Test. t. 40. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 7, 8, 17, 18.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 33. t. 348. 349. f.*

G. II. 3. Buccinum ru-  
fum.

G. II. 3. Die rothe  
Sturmhaube.

*Linn. S N. Sp. 446.*

*Belg. Roode Stormhoed. Rumph. Angl. Red Kasket - Shell. Pet. Gall, Le turban rouge. Argeny.*

Testa ovata striata, cingu-  
lis nodosis, striis geminis in-  
terstinctis; apertura dentata,  
cauda recurva.

Die eysförmige gestreifte  
Schale hat knotige Gürteln,  
und dazwischen gepaarte Strei-  
fen, mit gezähnter Mündung,  
und gekrümmten Schnabel.

*Rumph. amb. t. 23. f. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 40. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 3, 6.*

*Regenf.*



*Regenf. Samml. I. 12. t. 69. f.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 52. t. 341. f.*

G. II. 4. *Buccinum tuberosum.*

G. II. 4. Die Knotensturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 447.*

*Belg. Volvvasse turksche Papierkasket. Angl. The persian Whelk. Gall. Casque triangulaire. Dav.*

Testa ovata, albido fuscoque varia, cingulis tribus tuberculatis, rostro recurvo.

Die eysförmige, weiß- und braun gefleckte Schale hat drey knotige Reihen, und einen umgebogenen Schnabel.

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 51.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 11, 14.*

*Knor. Vergn. III. 10. t. 1, 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 359, f. 38. t. 381. 382f.*

G. II. 5. *Buccinum flammeum.*

G. II. 5. Das attalische Kleid.

*Linn. S. N. Sp. 448.*

*Belg.*



Belg. Geribb westindische Stormhoedje. Klein. Gall. Drap d'argent  
Ital. Drappo d'argento. Ron.

Testa ovata longitudinali- Die ensförmige nach der Län-  
ter plicata, cingulis aliquot ge gefaltene Schale hat einige  
tuberculatis, rostro incurva- Knotengürteln, und einen ge-  
to, krümmten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 161.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 72.

Rumph. amb. t. 23. n. 2.

Valent. Abb. t. 11. f. 99, 100.

Seb. Thes. III. t. 73. f. 19. 20.

Knor. Vergn. IV. 4. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 353, 354. f.

G. II. 6. Buccinum pul-  
lum.

G. II. 6. Die Papiere-  
haube.

Belg. Turks - Papier zonder Lippen. Angl. Feather - Stamper.  
Petiv. Gall. Casque plume. Dav.

Testa ovata oblonga, cin- Die ensförmige längliche  
gulis transversim striatis, 12- Schale hat gestreifte Quergür-  
bro edentulo, rostro recurvo, teln, die äußere Lesze ohne Zahn,  
mit einem gekrümmten Schnabel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 71.

Rumph. amb. t. 23. f. C.

Petiv.



*Petiv. amb. t. 10. f. 10.*

*Mart. Conch. Kab. II. 36. t. 373. 374. f.*

Testa ovata, laevis glabra, longitudinaliter striata. Cingula composita striis latis profundis parallelis quinatis. Spira planiucula, transverse striata, producta in mucronem centralem prominentem. Columella subtus umbilicata, & recurvata in rostrum ascendens. Labrum exterius nullum seu imperfectum. Color rufus, maculis dispersis albis.

Die Schale ist eysförmig, leicht und glatt, nach der Länge gestreift. Die Quergürteln bestehen aus fünf gleichweit laufenden vertieften Streifen. Der Schnirkel ist etwas flach, in die Quere gestreift, ihre Spitze raget in der Mitte hervor. Die Spindel hat eine nabelförmige Vertiefung, mit einem gekrümmten aufwärts gerichteten Rüssel. Die äußere Leiste manelt, oder ist unvollkommen. Die Farbe ist rothbraun mit zerstreuten weißen Flecken.

G. II. 7. Buccinum Testiculus.

G. II. 7. Die polnische Mütze.

*Linn. S. N. Sp. 449.*

*Belg. Poolische Muz, Gall. Bonnet de Pologne. Dav.*

Testa ovata, striis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, rostro recurvo.

Die eysförmige Schale ist der Länge nach mit erhabenen Streifen, an der Mündung mit Zähnen besetzt, und mit einem gekrümmten Schnabel versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 162.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 66.*

*Pe-*



*Petiv. Gaz. t. 152. f. 17.*

*Rumph. amb. t. 23. n. 3.*

*Valent. Abh. t. 7. . 59.*

① *Gualt. Test. t. 39. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 17-20.*

*Knor. Vergn. III. 8. n. 2. f.*

— — — IV. 6. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 37. t. 375, 376. f.*

G. II. 8. Buccinum decussatum.

G. II. 8. Der Schuppen-  
Bezoar.

*Linn. S. N. Sp. 450.*

*Belg. Geschubde Bezoar. Gall. Casque pavé. Dav.*

Testa ovata, decussatim striata, tessulis luteis maculata, apertura dentata, rostro recurvo,

Die eiförmige kreuzweisgestreifte Schale ist mit gelben Flecken bemalt, an der Mündung gezähnt, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Rear. cl. 3. f. 157.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 40. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 3, 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 360, 361. f.*

G. II.



G. II. 9. Buccinum  
Areola.

G. II. 9. Das Gartene  
beetchen.

*Linn. S. N. Sp. 451.*

*Belg. Gevlackte Bezoar. Rumph. Angl. Small Dice Kasket. Petiv. Gall. Casque truité. Argeny.*

Testa substriata, tessulis Die einigermaßen gestreifte,  
oblongis transuersim macula- und mit länglichen Würfel-  
ta, apertura dentata, rostro flecken bemalte Schale ist an  
recuruo. der Mündung gezähnet, mit  
einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 154.*

*Rumph. amb. t. 25. f. B.*

*Petiv. amb. t. 2. f. II.*

*Gualt. Test. t. 39. f. H.*

*Argeny. Conch. Pl. 15. f. J.*

*Seb. Thes. III. t. 70. f. 7-9.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 355 - 356. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 10.*

G. II. 10. Buccinum gra-  
nulaturn.

G. II. 10. Das geförne-  
te Beetchen.

*Belg. Gestreepde Beddetje. Angl. Gray Kasket. Petiv. Gall. Gros  
Casque cannelé.*

Testa



Testa ouata, transuersim obsolete sulcata, tessulis luteis seriatim maculata, labio granulato, cauda recurua.

Die eiförmige einigermaßen in die Quere gefurchte Schale hat einige Reihen gelber Würfelstecken, die Schalenleſze iſt gezähnt, die Spindel- leſze gekörnet, der Schnabel gekrümmt.

Rumph. amb. t. 25. f. C.

Petiv. amb. t. 9. f. 6.

Gualt. Test. t. 39. f. B. t. 40. f. E.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 344. 345. f.

Testa ouata, transuersim obsolete sulcata, longitudinaliter tenuiter striata. Spira conica, decussatim striata. Apertura longa, utrinque dentata. Labrum exterius marginatum, extrorsum reflexum, in- nus dentatum, interius transuerse plicatum, subtus expansum, punctisque eleuatis seu granis ad- spersum. Basis desinens in cana- lem rostratum recuruum. Sutura lateralis prope columellam nulla. Color albus, maculis quadratis lu- teis secundum series digestis,

Die Schale iſt eiförmig, der Länge nach mit matten Furchen, in die Quere mit zarten Streifen beſetzt; Der kegelförmige Schnir- kel iſt kreuzweiſe geſtreift. Die Mündung länglicht, beiderſeits ge- zähnt. Die Schalenleſze geſäumt, und auswärts überſchlagen, von innen gezähnt. Die Spindel- leſze in die Quere gefalten, unten ausge- breitet, und mit erhabenen Punk- ten, oder Körnern beſetzt. Der Grund endet ſich in eine ſchnabel- förmige, gekrümmte Rinne. An der Seite der inneren Leſze ſtehet der Länge nach keine Rath. Die Farbe iſt weiß mit gelben reiheweis ſe geſetzten Würfelſtecken.



G. III. Cassidea, labro muricato. G. III, Helmformige, mit gezackter Schalenlesze.

G. III, 1. Buccinum Eri-  
naceus.

G. III, 1. Das gefaltene  
Säumchen.

Linn. S. N. Sp. 452.

Belg. Gestreepte Zoomtje Rumph. Angl. Small curld Casket. Pat.

Testa ouata, longitudinaliter Die eysförmige längliche ei-  
subplicata, papillis coronata, nigermaffen gefaltene Schale  
labro politice muricato, ist mit Knoten gekrönet, und  
an der Schalenlesze gezackt.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 15. f. 73.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 152.

Rumph. amb. t. 25. f. D. 6, 7.

Petiv. amb. t. 9. f. 9.

Gualt. Test. t. 39. f. D, 7.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. G.

Seb. Thes. III. t. 53. f. II. 16.

Knor. Vergn. VI. 11. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 363. f.

G. III, 2. Buccinum  
glaucum.

G. III, 2. Der graue  
Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 453.

Belg. Grauwe Kasket. Rumph. Angl. Smooth gray Casket. Petiv.  
Gall. Casque Bezoard. Dav.



Testa ovata laevi, papillis  
coronata, labro pollice muri-  
cato.

Die eysförmige glatte Scha-  
le ist mit Knoten gekrönet, und  
hinten an der Schalenleiste ge-  
zackt.

*Rumph. amb. t. 25. f. A.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 4. t. 11. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 40. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 71. f. 11 - 16.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 342. 343. f.*

G. III. 3. Buccinum  
Vibex.

G. III. 3. Der glatte  
Bezvar.

*Linn. S. N. Sp. 454.*

*Be'g. Gladde Zoomtje. Rumph. Angl. Smooth - lip'd Casket. Pet.*

Testa ovata, laevissima, la-  
bro pollice muricato.

Die eysförmige ganz glatte  
Schale ist hinten an der Scha-  
lenleiste gezackt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 151.*

*Rumph. amb. t. 25. f. E.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 9.*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 39. f. F. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. 5-7, 10, 17.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 40. f.*

*Mart. Conch. Kab. II. 35. t. 364, 365. f.*

G. III. 4. *Buccinum pappilosum.*

G. III. 4. Das körnige Rindhorn.

*Linn. S. N. Sp. 455.*

*Belg. Ryftenbry Hoorentje.*

Testa ovata oblonga, undique tuberculata, labro portice muricato.

Die eiförmige längliche Schale ist allenthalben mit erhöhten Körnern, und hinten an der Schalenleiste mit Zacken besetzt.

*List. Hist. Conch. t. 4. f. 15. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 29. f. M.*

*Gualt. Test. t. 44. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 57, 58, 59.*

*Knor. Vergn. II. 27. t. 2. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. t. 1204, 1205. f.*



G. III. 5. Buccinum  
Glans.

G. III. 5. Das linirte  
Kinkhorn.

Linn. S. N. Sp. 456.

Belg. Modervlakje.

Testa ovata oblonga laevi,  
spirae apice longitudinaliter  
sulcata, labro pectice murica-  
to.

Die eysförmige längliche  
Schale ist glatt, an der Spitze,  
der Länge nach gesurhet, und  
hinten an der Schalenleiste mit  
Zacken besetzt.

Rumph. amb. t. 29. f. P.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 60.

Knor. Vergn. III. 5. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1196 - 1198. f.

G. IV. Callosa ad columellam re-  
flexam.

G. IV. Mit umgeschlagener schwie-  
liger Spindel.

G. IV. 1. Buccinum  
Arcularia.

G. IV. 1. Das weiße  
Kofferhörnchen.

Linn. S. N. Sp. 457.

Belg. Koffer Hoorntje. Gall. Arculaire blanc. Angl. Small koffer Shell.

Testa ovata, transversim  
striata, plicis longitudina-  
bus, papillisque coronata,  
labio explanato, calloso.

Die eysförmige, in die Que-  
re gestreifte Schale, ist der  
Länge nach mit Falten und Kno-  
ten besetzt, mit einer ausge-  
breiteten schwieligen Spindel.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. M.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 44. f. R. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Sch. Tbes. III. t. 53. f. 32. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 22. t. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. t. 1174. 1175. f.*

G. IV. 2. Buccinum  
murabile.

G. IV. 2. Die Afters-  
sturnhaube.

*Linn. S. N. Sp. 460.*

Testa ovata oblonga, spira  
acuminata, labio explanato.

Die eiförmige längliche  
Schale hat einen zugespitzten  
Schnüffel, und eine ausge-  
breitere Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 30.*

*Gualt. Test. t. 44. f. B.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. IV. 3. Buccinum  
neritoideum,

G. IV. 3. Die Dofen-  
schnecke.

Q 3

Testa



Testa orbiculata laevi, sub-  
tus planiuscula, labio expla-  
nato gibbo.

Die Schale ist scheibenrund  
und platt, unten einigermaßen  
flach, und an der Lippe aus-  
gebreitet, und erhaben.

*Gualt. Test. t. 65. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. V. Columella, quasi abrasa,  
plana.

G. V. Mit gleichsam abgeschabe-  
ner flacher Spindel.

G. V. I. Buccinum Har-  
pa.

G. V. I. Die Harpe.

*Linn. S. N. Sp. 462.*

*Belg. Davids Harp. Angl. The Harp Shell. Hill. Gall. La Harpe.  
Argenv.*

Testa costis longitudinalibus  
carinatis antice mucronatis, co-  
lumella plana laevi.

Die Schale ist nach der  
Länge mit scharfen, vorne spiz-  
igen Rippen besetzt, und an der  
Lippe flach.

α costis complanatis, laris.

α mit plattgedrückten breiten Ri-  
ben.

*Bonani. Recr. cl. 3. f. 185.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 55.*

*Rumph. amb. t. 32. f. K. L.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 2. t. 7. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 29. f. C, E, G.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.*

*Seb.*



Seb. Thes. III. t. 70. f. 10.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. 2. t. 14. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 14.

Knor. Vergn. I. 9. t. 3. f.

—— — II. 8. t. 2. f; 19. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. III. 119 t. 1090. 1091. 1092. f.

♂ costis carinatis angustioribus.

♂ mit scharfen schmälern Rippen.

Mus. Caes. Vindobon.

G. V. 2. Buccinum persicum.

G. V. 2. Die Rudolphsche Schnecke.

Linn. S. N. Sp. 464.

Belg. Wydmonder. Angl. The Persian-Shell. Hill. Gall. Conque perlique.

Testa ovata laevi, anfractibus tuberculatis, labro cre-

Die eysförmige glatte Schale ist an den Gewinden knotig, an der Pesse gekerbt, mit eines plattgedrückten Spindel.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 46. 47.

Rumph. amb. t. 27. f. E.

Q 4

Petiv.



*Gualt. Test. t. 51. f. H. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 12 — 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 69. t. 760. f.*

G. V. 3. Buccinum  
Haemastoma.

G. V. 3. Der Roth-  
mund.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa ovata nodosa, labro  
intus striato, fauce fulva.

Die eiförmige knotige Schale ist an der Schalenleiste inwendig gestreift, und im Schlunde rothgelb.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 48.*

*Gualt. Test. t. 51. f. A.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 965. f.*

G. V. 4. Buccinum La-  
pillus.

G. V. 4. Das Steins-  
gen.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp.* 467.

Testa ovata transuersim Die eysförmige Schale ist  
striata, spira tuberculata, co- der Quere nach gestreiset, an  
lumella plana. den Gewinden knotig, mit ei-  
ner flachen Spindel.

*Reaumur Mem. de Paris* 1711. Pl. 6. f. 45.

*List. angl. t.* 3. f. 5. 6.

*Adans. Seneg. Pl.* 7. f. 4.

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI.* 1. B. 16. t. 2. f.

*Mart. Conch. Kab. III.* 121. t. II11. II12. f.

G. V. 5. Buccinum Sma-  
ragdulus.

G. V. 5. Die Smaragd-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 468.

*Gall. l'Emeraude. Argenv.*

Testa ovata, glaberrima, Die eysförmige ganz glatte  
columella complanata, plica- Schale hat eine plattgedrückte  
ta. gefaltene Spindel.

Alba, lineis transuersis parallelis  
fuscis.

Weiß, mit gleichweitstehenden  
braunen Quersstreichen.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 15. f. 45.

*Argenv. Conch. Pl.* 6. f. P.



*Seb. Thes. III. t. 54. f. 14 — 16.*

*Knor. Vergn. III. 14. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 120. t. 1104. 1105. f.*

G. VI. G'abra.

G. VI. Glatte Sinkhörner.

G. VI. 1. Buccinum      G. VI. 1. Die Treppe.  
spiratum.

*Linn. S. N. Sp. 469.*

*Belg. Gevoord Bultje. Angl. Cloudy Dice - Shell. Pet. Gall. La tour de Coppenhague.*

Testa ovata oblonga laevi, Die eiförmige längliche glat-  
anfractibus canali plano distinc- te Schale hat flach ausgekehlt-  
tis, columella abrupta, per- te Röhre, und eine abgestuzte  
forata. durchbohrte Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 70. 370.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 41.*

*Rumph. amb. 49. f. C. D.*

*Petiv. amb. 1. 9. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 51. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 23 — 26.*

*Regenf. Samml. I. 10. 1. 41. f.*

*Knor.*



*Knor. Vergn. II. 6. t. 5. f.*

— — — *III. 3. t. 4. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 122. t. 1118 — 1121. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 6.*

G. VI. 2. *Buccinum glabratum.*

G. VI. 2. Der Kanarienvogel.

*Linn. S. N. Sp. 470.*

*Belg. Gladde Knipers - boor.*

Testa ovato oblonga glaberrima, futuris obsoletis, basi ventricosa transuersim sulcata.

Die eiförmige längliche ganz glatte Schale hat undeutliche Rätze, und einen bäuchigen nach der Quere gesuchten Boden.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 149.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 29.*

*Gualt. Test. t. 43. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. prior.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 47.*

*Knor. Vergn. II. 16. t. 4, 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 122. t. 1117. f.*

G. VI. 3. *Buccinum sulcatum.*

G. VI. 3. Das gesuchte Rinkhorn.

Testa



Testa ovata transversim sulcata, anfractibus contiguis, re gefurchte Schale, hat am labro crenulato, intus striato. einander verwachsene Gewinde, und eine gekerbte inwendig gestreifte Schalenleiste.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 31.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata. Anfractus sex, transversim sulcati, suturis contiguis. in die Quere gefurchte Windungen, deren Rätze an einander verwachsen sind. Die Mündung ist wie bei den Nebenarten. Die Schalenleiste fein gekerbt. Der Schlund gestreift. Die Spindelkeiste ist übergeschlagen, und ausgebreitet. Der Grund ausgeschnitten, und verkürzt. Von brauner Farbe, mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

G. VII. Angulata.

G. VII, Eßige Rinkhörner.

G. VII. I. Buccinum undosum.

C. VII. I. Das Eßhorn.

*Linn. S N. Sp. 472.*

*Belg. Boerenjonge. Angl. Small rough Whelke. Petiv.*

Testa ovato oblonga transversim sulcata, obtuse quinqueangulata, labro intus striato. Die eysförmige längliche, in die Quere gefurchte Schale hat fünf stumpfe Ecken, und eine inwendig gestreifte Schalenleiste.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 33. 36.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 0.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 61.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 26.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. 1126, 1127. f.*

G. VII. 2. Buccinum      G. VII. 2. Die Muska-  
Bezoar.                      tenmuß.

*Linn. S. N. Sp. 473.*

*Belg. Getackte Noote - Moskaat. Gall. Moskat.*

Testa ovata, decussatim ru-      Die ensförmige Schale ist  
gosa, spinis transversis con-      kreuzweise gerunzelt, mit hoch-  
cauis, anfractibus infimis la-      len Stacheln der Quere nach,  
mellatis, columella perforata.      und mit Blättern an den unter-  
sten Gewinden besetzt, sammt ei-  
ner durchbohrten Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. G.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 40. t. 398, 399. f.*

G. VII. 3. Buccinum      G. VII. 3. Das Wellen-  
undatum.                      horn.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 475.

Belg. Wulk. Angl. The Whelke.

Testa ovata, transuersim striata, anfractibus curuato multangulis. Die eiförmige in die Quere gestreifte Schale hat runzelichte vieleckige Gewinde.

α dextrorsa.

α rechtsgewunden.



Bonan. Recr. cl. 3. f. 189.

List. angl. t. 3. f. 2.

—— Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 14.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 78 — 80.

Knor. Vergn. IV. 19. t. 1. f.

Müll. Linn. N. S. VI. 1. B. 16. t. 3. 4. f.

β sinistrorsa.

β linksgewunden.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VII. 4. Buccinum reticulatum. G. VII. 4. Das Bitterhorn.

Linn. S. N. Sp. 476.

Angl. Small latticed Whelk. Pef.

Testa



Testa ovato oblonga, transversim striata, longitudinaliter rugosa, apertura dentata.

Die eiförmige längliche in die Quere gestreifte Schale ist der Länge nach mit Runzeln, und an der Mündung mit Zähnen versehen.

*Reaumur Mem. de Paris. 1711. Pl. 6. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 21.*

*Petiv. Gaz. t. 64. f. 8; t. 75. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. VII. 5. Buccinum clathratum.

G. VII. 5. Das Nezhorn.

Testa ovata, longitudinaliter plicata, striis elevatis transversis decussata; rostro recurvo.

Die eiförmige Schale ist mit nach der Länge laufenden Falten, und erhabenen Querstreifen durchkreuzet, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata ventricosa, reticulata rugis longitudinalibus strias elevatas transversas decussantibus. Puncta decussationum nodosa. Spira acuminata porrecta. Labrum creatum, intus sulcatum. Labium

Die Schale ist eiförmig bündig, und nehartig, mit nach der Länge laufenden Runzeln, welche durch erhabene Quersalten durchkreuzet werden. Die Durchkreuzungspunkte sind knotig. Der ausgezogene Schnabel

repli-



replicatum tenue. Basis desinens  
in canalem, breuem recurvum. Co-  
lor g'aucus.

sel raget hervor. Die Schalenlefze  
ist gefurct, und inwendig gefur-  
chet. Die innere Lefze ist überge-  
schlagen, und dünn. Der Grund  
endiget sich in einen kurzen ge-  
krümmten Schnabel. Von lichte  
grauer Farbe.

G. VIII. Turrita, laevis, subulata.

G. VIII. Gethürmte, glatte, abt-  
förmige Rinkhöner.

G. VIII. I. Buccinum  
maculatum.

G. VIII. I. Die Strif-  
nadel.

Belg. Malprieu. Angl. Tygers-tooth. Petiv. Gall. Le Cloud. Argenv.

Testa turrita subfusiformi,  
anfractibus laevis indivisis  
integerrimis.

Die gethürmte einigermassen  
spindelartige Schale hat glatte  
ungetheilte, und ganzrandige  
Gewinde.

Pallida, maculis laxis purpurascen-  
tibus.

Blas, mit breiten purpurrothen  
breiten Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 317.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 74.

Rumph. amb. t. 30. f. A. D.

Petiv. amb. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. f. 7.

Argenv. Conch. Pl. II. f. A.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 6.

Knor. Vergn. III. 23. t. 2. f.

— — VI. 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 153. t. 1440. f.

G. VIII.



G. VIII. 2. Buccinum  
subulatum.

G. VIII. 2. Die Tiger-  
nadel.

Linn. S. N. Sp. 480.

Belg. Dunne Tygerpen. Angl. Brown Tygers horn. Petiv. Gall. Vis-  
tigrée. Day.

Testa turrita subulata, an-  
fractibus laevibus, indivisis, se-  
rie duplici macularum ferru-  
ginearum pictis.

Die gethürmte spindelför-  
mige Schale hat glatte unge-  
theilte Gewinde, die mit einer  
dreyfachen Reihe rostfarbiger  
Flecken bemalt sind.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 118.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 70.

Rumph. amb. 30. t. B.

Petiv. amb. t. 4. f. 2.

Gualt. Test. t. 56. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. X.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 28.

G. VIII. 3. Buccinum  
candidum.

G. VIII. 3. Die weiße  
Nadel.

Testa turrita subulata laevi;  
anfractibus integerrimis, prope  
laturam incrassatis.

Die gethürmte ahlförmige  
glatte Schale hat ungetheilte  
ganzrandige Gewinde, die bei  
der Muth sich verdicken.

Mus. Caes. Vindobon.



Testa subulata laevis. Anfractus circiter viginti, indivisi, integerrimi, supra prope futuram incrassati; supremi linea transversa bifariam partiti, & juxta futuram crenulati. Apertura, & basis congenerum. Color niveus.

Die ablförmige Schale ist glatt. Die Gewinde, deren heiläufig zwanzig sind, nahe an der Nath. Die obersten sind durch eine neue Querlinie in zwey Theile getheilet, und an der Nath gekerbet. Die Mündung und der Grund sind wie an den Nebenarten beschaffen. Die Farbe schneeweiß.

G. VIII. 4. Buccinum ferrugineum.

G. VIII. 4. Die rostfarbige Nadel.

Testa turrita subulata ferruginea, anfractibus laevibus, bipartitis, integerrimis.

Die gehürnte ablförmige, rostfarbige Schale ist glatt, zweythellig und ganzrandig.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 71.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata, laevis. Anfractus circiter sexdecim integerrimi, linea exarata transversa bifariam divisi. Apertura & basis congenerum. Color ferrugineus, maculis obsoletis albis.

Die Schale ist ablförmig, und glatt. Die Gewinde häuchig, ganzrandig, und zweythellig; sechszehn an der Zahl. Die Mündung und der Grund nach Art der Unverswandten. Von eisenrothiger Farbe, mit matten weißen Flecken.

G. VIII. 5. Buccinum crenulatum.

G. VIII. 5. Die gekrümmte Nadel.

Linn S. N. Sp. 481.

Belg. Schartelle Pen. Rumph. Angl. Tooth'd Beddin. Pet.

Testa



Testa turrita, anfractibus bi- Die gethürmte Schale hat  
partitis, margine superiore zweitheilige am Oberrande ges-  
crenatis, kerbte Windungen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 75.

Rumph. amb. t. 30. f. E.

Petiv. amb. t. 8. f. 13.

Gualt. Test. t. 57. f. L.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. Y.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 9. 35.

Knor. Vergn. I. 8. t. 7. f.

Mart. Conch. Kab. IV. 153. . 1442. f.

G. VIII. 6. Buccinum G. VIII. 6. Die gekerbte  
vittatum. te Nadel.

Linn. S. N. Sp. 483.

Testa ventricoso turrita, Die häufig gethürmte Schale  
transuersum striata, sutura an- se ist in die Quere gestreift,  
fractuum duplicato crenulata, und an der Naht zweifach ge-  
kerbet.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 34.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 121.

Mart. Conch. Conch IV. 155. t. 1461. f.



G. VIII. 7. Buccinum  
frigilatum.

G. VIII. 7. Die gestrie-  
gelte Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 484.*

*Belg. Naalde = Pen. Gall. Le Foret. Dav.*

Testa subulata longitudi-  
naliter striata, anfractibus in-  
diuisis, singulo suturali niueo  
rufa maculato.

Die ahlförmige Schale hat  
ungeheilte nach der Länge ge-  
streifte Gewinde, die an der  
Nath mit einem schneeweißen  
rothbraun gefleckten Bande um-  
geben sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. H.*

*Gualt. Test. t. 57. f. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. R.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. VIII. 8. Buccinum du-  
plicatum.

G. VIII. 8. Die Nadel-  
nadel.

*Linn. S. N. Sp. 485.*

*Gall. La Vis de pressoir. Dav.*

Testa subulata anfractibus  
bipartitis, striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
zweitheilige, gestreifte Win-  
dungen.

*Bonân. Rect. cl. 3. f. 110.*

*Gualt. Test. t. 57. f. N.*

*Knor.*



*Knor. Vergn. VI. 18. t. 6. f. 24. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1455. f.*

G. VIII. 9. Buccinum lanceolatum, G. VIII. 9. Die Lanzennadel.

*Linn. S. N. Sp. 486.*

*Belg. Piekenier. Angl. Furrow - Pen. Pet. Gall. L'alène. Dav.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus integris, lineis lon- le hat ungetheilte Gewinde,  
gitudinalibus fulvis. die mit rothgelben Streifen  
nach der Länge herab bezeichnet  
sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 13. f. 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. Z.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1450. f.*

G. VIII. 10. Buccinum dimidiatum, G. VIII. 10. Die um-  
wundene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 487.*

*Belg. Omwonden Pen.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus bipartitis integerrimis. le hat zweytheilige ganzrandige  
Gewinde.



*α* macularum crocearum serie trans- *α* mit dreifacher Reihe safranfar-  
versa triplici picta. bigen Flecken in die Quere be-  
malet.

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 16, 23, 24, 27.*

*Knor. Verg. I. 23. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1443. f.*

*β* lutescens, maculis longitudina- *β* gelblich, mit länglichen schnee-  
li us niueis, anfractuum margi-  
ne superiore compresso attenua-  
te. weissen Flecken, und plattgedrück-  
tem verdünntem Oberlande an den  
Gewinden.

*Rumph. amb. t. 30. f. C.*

*Gualt. Test. t. 51. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 15, 19.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 5. f.*

*— — — VI. 18. t. 5. f.*

G. VIII. 11. Buccinum  
cinereum.

G. VIII. 11. Die aschen-  
graue Nadel.

Testa subulata; anfractibus  
indivisis; prope futuram longi-  
tudinaliter striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
ungetheilte, und an der Naht  
nach der Länge gestreifte Ge-  
winde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa subulata glabra. Anfractus quatuordecim indiuisi, integerrimi, margine superiore longitudinaliter striati. Columella complanata. Apertura, & basis congenerum. Color cinereus; fascia transuersa prope suturam nigricante obsoleta.

Die Schale ist ablsförmig und glatt. Die vierzehn Gewinde sind eingetheilt, ganz glatt, und nur an der Nath der Länge nach gestreift. Die Spindel flach gedrückt. Die Mündung und der Grund wie an den Nebenarten dieses Geschlechtes. Von aschengrauer Farbe, mit einer undeutlichen schwärzlichen Querbände unweit der Nath.

G. VIII. 12. Buccinum portusum.

G. VIII. 12. Die durchstochene Nadel.

Testa subulata; anfractibus bipartitis, striis longitudinalibus eleuatis, & transuersis excavato punctatis.

Die ablsförmige Schale hat zwenztheilige Gewinde, die nach der Länge herab erhabene Streifen, und in die Quere vertiefte Punkten haben.

Mart. Kouch. Kab. IV. 155. t. 1457. 1.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata. Anfractus circiter viginti striati, striis longitudinalibus eleuatis, punctisque ex auatis per seriem transuersam digestis. Apertura & basis congenerum. Color croceus aut albus, maculis dispersis fuluis.

Die Schale ist ablsförmig. Die Gewinde, deren ungefehr zwanzig sind, haben der Länge nach erhabene Streifen, und in die Quere eine dreyfache Reihe ausgehöhlter Punkten. Die Mündung, und der Grund ist wie an den andern Nadeln dieses Geschlechtes. Von safrangelber, oder weißer Farbe mit zerstreuten rothgelben Flecken.



G. VIII. 13. Buccinum  
sinuatum.

G. VIII. 13. Die Fal-  
tennadel.

Testa turrita anfractibus  
longitudinaliter plicatis, prope  
futuram attenuatis, labro po-  
stice sinuato.

Die gethürmte nach der Län-  
ge gefaltene Nadel hat an der  
Nath zusammengedrückte Ge-  
winde, und eine hinten aus-  
geschnittene Schalenleſze.

Mart. Konch. Kab. IV. 155 t. 1464. 1465. f.

Testa turrita. Anfractus circiter  
nonem, longitudinaliter plicati,  
prope futuram complana i Labrum  
replicatum, postice sinu breui exci-  
sum. Columella replicata. Aper-  
tura, & balis congenerum. Color  
lutescens, epidermide decidua ni-  
gra.

Die Schale ist gethürmt. Die  
Gewinde, deren ungefehr neun sind,  
der Länge nach gefalten, nächst der  
Nath platt gebrückt. Die Schal-  
enleſze ist erweitert, und hinten  
mit einem kurzen Einschnitte ver-  
sehen. Die Spindel ist übergeschla-  
gen. Die Mündung, und der  
Grund, wie an andern Spindeln  
dieses Geschlechtes. Von gelblicher  
Farbe mit schwarzer abfallender  
Oberhaut.

H. Strombus.

H. Die Flügelschnecke.

Testa spiralis; apertura  
dilatata, labro ampliato.

Die schnirkelförmige  
Schale hat eine erweiterte  
Mündung, und ausgebrei-  
tete Schalenleſze.

H. I.



H. I. Digitati, labro in lacinias  
tenues exeunte.

H. I. Gezackte, deren Schalen-  
lesze mit schmalen Zacken versehen  
sind.

H. I. I. Strombus Fusus.

H. I. I. Die Sterna-  
del.

Linn. S. N. Sp. 489.

Belg. Dikke Starre - Pen. Gall. Fuscau étoilé.

Testa turrita laeui, rostro  
subulato, labro dentato.

Die gehürnte glatte Scha-  
le hat einen ahlförmigen Schna-  
bel mit einer gezackten Schalen-  
lesze.

α testa crassa lutescens: apice longitu-  
dinaliter striato, labio incrassato.

α blässhaltig gelblich braun, an  
der Spitze nach der Länge ge-  
streift, mit verdickter Spindel-  
lesze.

Bonap. Recr. cl. 3. t. 121.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. II, 18.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. D.

Klein. Hist. Conch. t. 4. f. 37.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 1. 2.

Knor. Vergn. V. 6. t. 1. f. 7. t. 2. f.

Chemnitz Naturforscher IX. 6. t. 1, 2. f.

Nat. Conch. Kab. II. 158. t. 1495. 1496. f.

β attenuata alba, apice reticula-  
tim striato, rostro elongato.

β Schmal, weiß, an der Spitze  
gitterförmig gestreift, mit einem  
verlängerten Schnabel.

R 5

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 9.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 159. t. 1500. 1502. f.*

An prioris varietas pulla?

Etwan eine unvollkommene Ab-  
änderung der vorigen?

H. I. 2. Strombus Pes      H. I. 2. Der Vogelfuß.  
pelicani.

*Linn. S. N. Sp. 490.*

*Belg. Pelikaans - Poot. Angl. Blobber - lipt. Petiv. Gall. Patte  
d'oie. Dav. Ital. Turbine pendatilo. Gin.*

Testa labro tetradylo, Die Schale hat eine vier-  
spirarum marginibus nodosis; zackige Schalenleiste, mit kno-  
fauce laeni. tigen Rändern an den Gewin-  
den, und glattem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 85. 87.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 20.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 6; t. 127. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 53. f. A, B, C.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 2. f. 41. 42.*

*Ginan.*



*Ginan. adr. t. 7. f. 58. 60.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 17.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. III, 83. t. 248 - 250. f.*

H. I. 3. Strombus Chi- H. I. 3. Die Bootschacke.  
ragra.

*Linn. S. N. Sp. 491.*

*Belg. Wufje - Bootschaak. Angl. Female Devil's Claw. Petiv. Gall. Araignée femelle Dav.*

Testa labro hexadactylo, Die Schale hat an der Scha-  
digitis curvis, rostro recurva- lefze sechs krumme Zacken, einen  
to, labio striato. gekrümmten Rüssel, mit einer  
gestreiften Spindellefze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 314.*

*List. Hist. Conch, l. 4. f. 12. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 35. f. A, B.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 35. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 1, 6, 7, 9, 10.*

*Knor. Vergn. I. 27. t. 1. f.*

— Delic. nat, I. t. B. II. f. 1.

*Mart,*



Mart. Konch. Kab. III. 85. t. 851. 852. f.

— — — — — 87. t. 856. 857. f.

H. I. 4. Strombus Scorpio.

H. I. 4. Die Podagra-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 492.

Belg. Podagra knospe. Valent. Angl. Knob-Fingers. Petiv. Gali.  
Le Scorpion. Argenv.

Testa labro heptadactylo, Die Schale hat sieben kno-  
digitis nodosis, postico lon- tige Zacken, deren hinterster  
ziffimo. sehr lang ist.

Litt. Hist. Conch. I. 4. / 12 f. 22.

Rumph. amb. t. 36. f. K.

Valent. Abb. t. 3. f. 28.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. B.

Seb. Thes. III. t. 82. f. II. 15.

Knor. Vergn. II. t. 3. f. I.

Murray. Fund. Test. t. I. f. 29.

Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 860. f.



H. I. 5. Strombus  
Lambis.

H. I. 5. Die Krabbens-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 493.*

*Belg. Geele krabbe. Angl. The Spider Shell. Hill. Gall. Araignée  
male. Dav.*

Testa labro heptadactylo, Die Schale hat an der Scha-  
digitis rectifuculis, sauce laeui. lenletzte sieben einigermassen ge-  
rade Zacken, und einen glatten  
Schlund.

α digitis perfectis elongatis.

α mit vollkommenen verlängerten  
Zacken.

*Rumph amb. t. 35. f. F.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 35. f. C.*

*Argenv. Conch. t. 14. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 8.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. I. 28. t. 1. f.*

*Mart. Conch. Kab. III. 86. t. 855. f.*

β digitis imperfectis, haud productis. β mit unvollkommenen verkürzten  
Zacken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 36. f. G.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 14. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 16. 17.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 1. f.*

H. I. 6. Strombus Mil-  
lepeda.

H. I. 6. Die Zehnfuß-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 494.*

*Belg. Duizend - Been. Rumph. Angl. The twelve Fingers. Petiv. Gall. Milleped Dav.*

Testa labro decadactylo,  
digitis inflexis, dorso gibboso  
compresso.

Die Schale hat zehn um-  
gebogene Zacken, und einen  
höckerigen plattgedrückten Rüs-  
sen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 311.*

*Lift. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 36. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. B.*

*Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 861. 862. f.*

H. II. Labro lobato.

H. II. Mit lappenförmiger  
Schalenleiste.

H. II. 1.



H. II. 1. Strombus lentiginosus.

H. II. 1. Die Sommersprossen.

*Linn. S. N. Sp. 495.*

*Belg. Sproetje. Rumph. Angl. knobbed Broadlip. Petiv. Gall. Tete de serpent. Dav.*

Testa labro antice trilobo, Die Schalenlesze ist vorne dorso tuberculato coronato, drehlappig, der Rücken knottig, rostro obtuso, und gekrönt, der Schnabel stumpf.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 300.*

*Rumph. amb. t. 37. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 32. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 17, 18.; t. 62. f. 11.*

*Knor. Vergn. III. 13. t. 2. f.; 26. t. 2, 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t. 825. 826. f.*

H. II. 2. Strombus Galus.

H. II. 2. Der Kampfhabu.

*Linn. S. N. Sp. 496.*

*Belg. Komphuantje. Rumph. Angl. The Plough. Da Cost. Gall. Aile d'Ange. Dav.*

Testa labro mucronato Die Schalenlesze hat einen longissimo, dorso spinoso, rostro recto, sehr langen hervortretenden Ringer, der Rücken ist stachelig, der Schnabel gerad.

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 309. 310.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 29. 30.*

*Rumph. amb. t. 37. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 32. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. I. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 841, 842. f.*

—— ——— *85. t. 846. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 1.*

H. II. 3. Strombus Au-  
ris Dianae.

*Linn. S. N. Sp. 497.*

H. II. 3. Der Dianen-  
flügel.

*Belg. Wyzer. Rumph. Angl. Horned Broad - Lip. Petiv. Gall. Oreille  
& Anc. Argenv.*

Testa labro antice mucro-  
nato, dorso tuberculoso, ros-  
tro erecto.

Die Schalenleiste hat einen  
hervortretenden Finger, der  
Rücken ist knottig, der Schna-  
bel in die Höhe gebogen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 301. 302.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 26. 28.*

*Rumph. amb. t. 37. f. R.*

*Petiv. amb. t. 14. f. II.*

*Gualt. Test. t. 32. f. D, H.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. O.*

*Hlein.*



*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 106.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 1 — 6. t. 62. f. 13.*

*Knor. Vergn. II. 15. t. 1. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 838. 839. f.*

H. II. 4. Strombus Pu-  
gilis.

H. II. 4. Das Fleisch-  
horn.

*Linn. S. N. Sp. 498.*

*Belg. Vlees - Hoorn. Gall. Oreille de Cochon. Dav.*

Testa labro antice promi-  
nente rotundato, spira spino-  
sa, rostro trilobo, fauce ru-  
bra.

Die rundliche Schalenleiste  
ragt vorne hervor, der Schnir-  
kel ist stachlicht, der Rüssel  
dreylappig, mit einem roten  
Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 299.*

*Gualt. Test. t. 32. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. A.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 108.*

*Knor. Vergn. I. 9. t. 1. f.*

— — — III. 16. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 81. t. 830. 831. f.*



H. II. 5. Strombus Luvianus.

H. II. 5. Die Lühonerschncke.

Linn. S. N. Sp. 500.

Belg. Lohoenſche Hoorntje. Rumph. Angl. Lohoe Broad - Lip. Petiv. Gall. Gueule noire. Argenv.

Testa labro prominulo, anfractibus rotundatis aequalibus, fauce sanguinea, columella nigra.

Die Schalenleſze raget hervor, die Gewinde ſind rundlich, und gleich, der Schlund bluthroth, die Spindel ſchwarz.

Liſt. Hiſt. Conch. I. 4. f. 12. f. 6.

— — Gaz. t. 98. f. 10.

Petiv. amb. t. 14. f. 12.

Rumph. amb. t. 37. f. S.

Gualt. Teſt. t. 31. f. H, J.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. N.

Seb. Theſ. III. t. 61. f. 20, 21. t. 62. f. 31, 32.

Knor. Vergn. V. 16. t. 5. f.

Mart. Conch. Kab. III. 77. t. 789. 790. f.

H. II. 6. Strombus fasciatus.

H. II. 6. Die gebänderte Flügelſchncke.

Testa labro prominulo, anfractibus infimis obtuse spinosis, ventre fasciis fuscis.

Die Schalenleſze raget etwas hervor, die unterſten Gewinde ſind mit ſtumpfen Stacheln gekrönt, und der Leib mit braunen Bändern umgeben.

Mart.



*Mart. Konch. Kab. III. 78. t. 800 - 802. f.*

Testa laevis. Anfractus septem, infimi duo spinosi, spinis obtusis. Labrum rotundatum prominulum. Labium reflexum. Basis obtusa biloba. Color testae albus, ventris fasciis interruptis fuscis; faux rosea.

Die Schale ist glatt. Die Gewinde der Zahl nach sieben, davon die untersten mit stumpfen Knoten besetzt sind. Die Schalenleiste ist rundlich, raget etwas hervor. Die Spindelkeule übergeschlagen. Der Grund stumpf und zweiflappig. Die Schale ist weiß, mit braunen unterbrochenen Bändern bemalt; der Schlund rosenroth.

H. II. 7. Strombus gibberulus.

H. II. 7. Die höckerige Kanarienschncke.

*Linn. S. N. Sp. 501.*

*Belg.* Gebande Kanartje. *Angl.* Gall. Ailée bossue. *Angl.* Girdled Canarie. *Pet.*

Testa labro prominulo, dorso laevi, anfractibus gibbosis inaequalibus.

Die Schalenleiste raget hervor, der Rücken ist glatt, die Gewinde sind höckerig und ungleich.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 1.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 150.*

*Rumph. amb. t. 37. f. V.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 31. f. N.*

*Seb. Thes. III. 61. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 3. f.*

— — — III. 13. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 77. t. 792—796. f.*



H. II. 8. Strombus Oniscus.

Linn. S. N. Sp. 502.

Belg. Graeuwe Moerbey. Valent.

Testa ovata, cingulis nodosis, spirae apice mucronato, labro granulato, basi obtusa.

H. II. 8. Die Affel-schnecke.

Die eiförmige Schale hat knotige Gürteln, eine verdünnte Wirtelspitze, mit körniger Schalenleiste und stumpfen Grunde.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 10. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 16.

Gualt. Test. t. 22. f. 7.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 23.

Knor. Vergn. IV. 12. t. 4. f.

— — VI. 15. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 357. 358. f.

H. III. Strombi, ampliati.

H. III. Mit ausgebreiteten Flügeln.

H. III. 1. Strombus Lucifer.

Linn. S. N. Sp. 503.

Belg. Gemarmelde Kameelhoorn.

H. III. 1. Die Kameelschnecke.

Angl. Spiked Whelk. Gall. Chameau.

Testa transversim dupliciter striata, spira carinata, minute tuberculato.

Die in die Quere doppelt gestreifte Schale hat keilsförmige feinknottige Schnirkelgewinde.

Bonan.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 303.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 4—6.*

*Rumph. amb. t. 49. f. M.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 88.*

*Gualt. Test. t. 55. f. A. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 61. f. 8; t. 62. f. 38—40.*

*Knor. Vergn. II. 29. t. 1. f.*

— — — III. 5. t. 4. f; 16. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 90. t. 878, 886.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 2.*

H. III. 2. Strombus Gi- H. III. 2. Die gezakte  
gas. Schweizerhose.  
*Linn. S. N. Sp. 504.*

*Belg. Getakt Vleugel-Hoorn. Angl. The large Conch. Gall. La  
grande Ailée. Ital. Ogniella.*

Testa labro rotundato ma- Die rundliche Schalenleiste  
ximo, ventris spiraeque spi- ist sehr groß, der Leib und  
nis patentibus. Schnirkel mit ausgebreiteten  
kegelförmigen Stacheln besetzt.

Fauce rosea.

Mit rosenrothem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 307. 321.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 19.*



Gualt. Test. t. 33. f. A; t. 54. f. M.

Knor. Vergn. III. 17. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 80. t. 824. f.

H. III. 3. Strombus Epidromis.

H. III. 3. Das Besandsegel.

Linn. S. N. Sp. 506.

† Belg. Bezaantje Rumph. Angl. Great Canarie. Pet. Gall. La Tourterelle, Dav.

Testa labro rotundato, breui, ventre laevi, spira subnodosa.

Die rundliche Schalenleiste ist kurz, der Leib glatt, der Schnirkel etwas knorrig.

Bonan. Mus. Kirch. f. 146.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 10.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 11.

— amb. t. 14. f. 18.

Rumph. amb. t. 36. f. M.

Seb. Toes. III. t. 62. f. 21 — 23. 26.

Knor. Vergn. VI. 33. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 821. f.



H. III. 4. Strombus Ca-  
narium.

H. III. 4. Das Taub-  
chen.

*Linn. S. N. Sp. 507.*

*Belg. Bultje Rumph. Angl. Hunchbackt Canarie Pet. Gall. Pigeonne.*

Testa tumida, laevi; labro  
rotundato, breui, retuso.

Die bäuchige glatte Schale,  
hat eine rundliche, kurze, ein-  
gezogene Schalenleiste.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 146.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 13.*

— amb. t. 14. f. 17.

*Rumph. amb. t. 36. f. N.*

*Gualt. Test. t. 32. f. N. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 28, 29, 24, 25.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 73.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 817. 818. f.*

H. III. 5. Strombus vit-  
tatus.

H. III. 5. Das aufge-  
wickelte Besanssegel.

*Linn. S. N. Sp. 508.*

*Belg. Opgerolde Bezaantje. Rumph. Angl. Great net Whelk. Pet.  
Gall. Misaine roulée.*



Testa labro rotundato, ventre laeui, spirae elongatae anfractibus sutura distinctis.

Die Schalenlesze ist rundlich, der Leib glatt, die Gewinde des verlängerten Schnirkels haben eine Zwischennath.

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 12.*

— amb. t. 7. f. 9.

*Rumph. amb. t. 36. f. 0.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 18 — 20.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 822. f.*

H. III. 6. Strombus acinctus.

H. III. 6. Die breite Kanarienschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 509.*

*Belg. Geblomde Kanarie. Angl. Broad knobbed Canarie. Petiv.*

Testa labro rotundato, spirae anfractibus striatis, ventre laeui, cingulis quatuor albo maculatis.

Die Schalenlesze ist rundlich, die Gewinde gestreifet, der Leib glatt, mit vier weißen gefleckten Gürteln.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 37. f. X.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 19.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 10. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 15.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

H. III. 7. Strombus Ur-  
ceus,

*Linn. S. N. Sp. 312.*

H. III. 7. Die knottige  
Kanarienschnecke.

*Belg. Gebulde Kanary. Rumph. Angl. Long knobbed Canarie. Pet.*

Testa labro attenuato, stria-  
to, ventre spiraque plicato  
nodosis.

Die Schalenlefze ist veren-  
get und gestreift, der Leib  
und der Schnirkel mit Knotten  
und Falten besetzt.

$\alpha$  alba transuersim striata, (major.)

$\alpha$  weiß, der Quere nach gestreift,  
(größer.)

$\beta$  fusco maculata, aut reticulata,  
laevis (minor.)

$\beta$  glatt, mit braunen Flecken, oder  
Rezen (kleiner.)

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 13.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 14.*

— amb. t. 14. f. 21.

*Rumph. amb. t. 37. f. T.*

*Gualt. Test. t. 32. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 28. 29.*

*Knor. Vergn. III. 13. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. III. 78. t. 804 — 806. f.*



H. IV. Turriti.

H. IV. Gethürmte Flügelschnecken.

H. IV. 1. Strombus turberculatus.

H. IV. 1. Die knottige Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 415.*

Testa turrita, transuersum striata, nodis glabris cincta; labro incrassato.

Die gethürmte Schale ist in die Quere gestreift, mit glatten Knotten umgeben, an der Schalenleiste verdickt.

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1490. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

## I. Murex.

## I. Die Stachelschnecke.

Testa spiralis suturis longitudinalibus varicosis. Apertura desinens in canalibus rectum, aut subascendentem.

Die schnirkelförmig gewundene Schale ist der Länge nach mit wulstigen Röhren besetzt. Die Mündung endiget sich in eine gerade, oder etwas aufsteigende Rinne.

I. I. Spinosa, rostro elongato.

I. I. Dornige, mit verlängertem Rüssel.

I. I. 1. Murex Haustellum.

I. I. 1. Der Schnepfenschnabel.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 518.

Belg. Scheppertje. Rumph. Angl. The commonon Woodcock Shell.  
Gall. Tete de Becasse. Dav.

Testa subovata tuberculata, Die etwas eysförmige knoti-  
rostro elongato subulato, recto, ge Schale hat einen verlänger-  
inermi. ten ablsförmigen, geraden, un-  
bewaffneten Rüssel.

α incarnata, maculis nigris.

α fleischroth, mit schwarzen Flecken.

β niuea, maculis rufis.

β schneeweiß, mit braunrothen  
Flecken.

Bonan. Recr. el. 3. f. 268.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 23.

Rumph. amb. t. 26. f. F.

Petiv. amb. t. 4. f. 8.

Gualt. Test. t. 30. f. E.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. B.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 81.

Seb. Thes. III. t. 78. f. 5, 6.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. I. 12. t. 2, 3. f.

—— — III. 9. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. III, 115. t. 1066. f.

I. I. 2. Murex Tribulus.

I. I. 2. Die Spinne.

Linn. S. N. Sp. 519.

Belg.



Belg. Spinnekop. Rumph. Angl. Thorney Woodcock. Hill. Gall.  
La becasse epineuse. Dav.

Testa ovata, spinis setaceis  
trifariis, rostro elongato, subu-  
lato, spinoso.

Die eysförmige Schale ist  
mit einer dreysachen Reihe hor-  
stiger Stacheln besetzt, und mit  
einem verlängerten, abköm-  
migen, stachelichten Rüssel versehen.

α spinis simplicibus, alternis majori-  
bus.

α mit einfachen wechselweise größe-  
ren Stacheln.



Bonan. Recr. cl. 3. f. 269.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 22.

Petiv. Gaz. t. 101. f. 16.

— amb. t. 6. f. 8.

Rumph. amb. t. 26. f. G.

Gualt. Test. t. 31. f. A.

Seb. Thes. III. t. 78. f. 4.

Hill. Hist. of Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. I. 11. t. 3, 4. f.

— Delic. nat. t. B. V. f. 5.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 15.

Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1053. 1054. f.

Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 5.

β spinis subaequalibus duplicatis.

β mit beynahe gleichgroßen doppelse-  
ten Stacheln.

Rumph. amb. t. 26. f. 3.

Gualt. Test. t. 31. f. B.

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 16. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 78. I — 3. f.*

*Knor. Verg. V. 27. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1052. f.*

I. I. 3. *Murex cornu-*  
*tus.*

I. I. 3. Der gezackte  
Schneppsenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 520.*

*Belg. Gedoornde Snippekop. Angl. Thorney Snipe. Gall. La*  
*grande Massüe d'Hercule. Dav.*

Testa subrotunda, spinis  
subulatis obliquis, rostro elon-  
gato, spinis sparsis.

Die rundliche Schale hat  
ahlsförmige schiefstehende Stä-  
cheln und einen verlängerten  
mit zerstreuten Stacheln besetz-  
ten Rüssel.

*Bonan. Recr: cl. 3. f. 283.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 26. f. 5. °*

*Gualt. Test. t. 30. f. D.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 20.*

*Seb. Thes. III. t. 78. f. 7 — 9.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 114. t. 1057. f.*



I. I. 4. Murex Branda-  
ris.

I. I. 4. Der dornige  
Schneppsenkopf.

Linn. S. N. Sp. 521.

Belg. Getackte Snippekop Rumph. Angl. The common thorney  
Murex. Pet. Gall. Massüe d'Hercule. Dav.

Testa ouata, spinis rectis, Die euförmige Schale hat  
roistro mediocri subulato, rec- gerade Stacheln, einen mittelmäßig  
to, labio excauato. langen ablsförmigen geraden  
Rüssel mit einer ausgehöhlten  
Schalenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 281.

Petiv. Gaz. t. 68. f. 12.

Rumph amb. t. 26. f. 4.

Gualt. Test. t. 30. f. F.

Argenv. Zoom. Pl. 4. f. C.

Ginan. adr. II. t. 8. f. 61. 62.

Regenf. Samml. 6. t. 67. f.

Knoy. Vergn. II. 18. t. 1. 2. f.

—— ——— 22. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Konch III. 114. t. 1060. 1061. f.

—— ——— 115. t. 1062 - 1065. f.

I. I. 5. Murex Trun-  
culus.

I. I. 5. Das gehörnte  
Purpurhorn.

Linn. S. N. Sp. 522.

Belg.



Belg. Gebandeerde Purper - Hoorn. Gall. Pourpre a bandes.

Testa ovata nodosa, spinis Die eysförmige knotige Scha-  
anticis majoribus, rostro trun- le hat vorne größere Stacheln,  
cato breui, perforato. und einen stumpfen kurzen  
durchbohrten Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 271, 274, 277.

Gualt. Test. t. 31. f. C.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 104.

Seb. Thes. III. t. 52. f. 15. 16.

Knor. Vergn. III. 13. t. I. f.

—— — V. 13. t. 4. f.; 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. III. 109. t. 1019. 1020. f.

I. II. Suturis foliaceis: Purpuras.  
dictae.

I. II. Mit blätterigen Näthen: so-  
genannte Purpurschnecken.

I. II. 1. Murex tripte-  
rus.

I. II. 1. Die dreysflüg-  
lige Purpurschnecke.

Belg. Vleugel - hoornje. Gall. Pourpre triangulaire ailée. Dav.

Testa elongata triangulari, Die länglichte, dreyeckige  
angulis alato membranaceis. Schale hat flügel förmig aus-  
gebreitete Ecken.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1033. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa elongato triangularis, transuersim rugosa; rugae inaequales acutae, striis eleuatis longitudinalibus subtilissimis; decussatae. Spira constans anfractibus septem, tuberculis solitariis inter suturas oblita. Suturae longitudinales tres obsoletae, totidem constituentes angulos expansos in membranas plicatas aliformes. Apertura tuberculata ovato oblonga, desinens in canalem rectum spira breuiorem. Color nitens niueus.

Die länglichte dreneckige Schale ist in die Quere gerunzelt; Die Runzeln sind ungleich, und scharf, und mit erhabenen feinen Streifen der Länge nach durchkreuzet. Der Schnirkel bestehet aus sieben Gewinden, die zwischen den Nätzen mit einzelnen Adrern besetzt sind. Nach der Länge laufen drey undeutliche Nätze, welche eben so viele Ecken bilden, die sich in häutige gefaltene Flügeln ausbreiten. Die länglichte ensförmige Mündung ist mit Körnchen besetzt, und endiget sich in eine gerade Rinne, die kürzer als der Schnirkel ist. Die Farbe ist glänzend schneeweiß.

### I. II. 2. Murex triquet- ter.

### I. II. 2. Die dreyseiti- ge Purpurschnecke.

Belg. Geplekte Vleugel - Hoorentje. Gall. Pourpre triangulaire tachetée.

Testa elongata triquetra subalata, reticulatim costata, rostro recto clauso.

Die länglichte dreyseitige eini-  
germaßen geflügelte Schale ist  
mit netzförmigen Ribben besetzt,  
und mit einem geraden geschlos-  
senen Rüssel versehen.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1038. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa elongata, costis transuersis, & longitudinalibus reticulatim decussata. Spira pyramidata composita ex anfractibus senis. Suturae longitudinales tres, eleuatae; angulos totidem constituentes, in membranas plicatas obsoletas excrescentes; quarum illa nonnisi labri exteri, manifesta est. Apertura ellip-

Die Schale ist länglicht, mit  
nach der Länge, und in die Quere  
laufenden Ribben durchkreuzet. Der  
pyramidenförmige Schnirkel bestee-  
het aus sechs Gewinden. Die drey  
nach der Länge stehenden erhabenen  
Nätze bilden eben so viele Ecken,  
welche sich in gefaltene, unvoll-  
kommene Flügeln verbreiten, davon  
rica,



tica, desinens in canalem elongatum rectum clausum. Labrum crenulatum. Color albus maculis dispersis rubris.

nur iener an der Schalenleſze deutlich ist. Die Mündung ist elliptisch, und verlängert sich in eine gerade geschlossene Rinne. Die Schalenleſze ist gekerbt. Von weißer Farbe mit rothen Flecken.

I. II. 3. Murex ramosus.

I. II. 3. Die Kraußschnecke.

Linn. S. N. Sp. 523.

Belg. Ocean-Hoorn. Rumph. Angl. The Caltrup Shell. Hill. Gall. Chauffe Trape. Argenv.

Testa oblonga, triangula, trifariam frondosa, anfractus contiguos, rostro truncato.

Die längliche, dreyeckige Schale hat drey Reihen kraußser Blätter, aneinander gewachsene Windungen, und einen abgestumpften Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 275. 276.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 41.

Rumph. amb. t. 26. f. A. I.

Petiv. amb. t. 12. f. 2.

Gualt. Test. t. 37. f. G. D. L.; t. 38. f. A.

Valent. Abb. t. 4. f. 38; 5. t. 42. f.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. C. E. H.

— Zoom. Pl. 4. f. D.

Seb. Thes. III. t. 77. f. 1. 2. 7.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 8.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.



*Regenf. Samml.* I. 6. t. 6. f.

*Knor. Vergn.* I. 26. t. 1. 2. f.

— — — *III.* 9. t. 3. f.

— — — *V.* 11. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab.* III. 102. t. 980. f.

— — — 103. t. 981 — 983. f.

— — — 104. t. 984 — 986. f.

— — — 105. t. 987 — 989. f.

I. II. 4. *Murex Scorpio.* I. II. 4. Die Skorpion-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 524.

*Belg.* Scorpioentje *Rumph.* *Angl.* Least ragged Whelk. *Petiv. Gall.*  
*Patte de Crapaud.* *Dav.*

*Testa quadrifariam frondo-* Die Schale hat drey Rei-  
*sa, spira capitata, rostro trun-* hen krauser Blätter, einen kols-  
*cato.* higen Schnirkel, und abge-  
stumpften Rüssel.

*Rumph. amb.* t. 26. f. D.

*Petiv. amb.* t. 9. f. 14.

*Valent. Abb.* t. 4. f. 36. 37.

*Gualt. Test.* t. 37. f. M.

*Argenv. Conch. Pl.* 16. f. D.

*Seb.*



Seb. Thes. III. t. 77. f. 13 — 16.

Knor. Vergn. II. II. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040 — 1041. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 6.

I. II. 5. Murex saxati-

s.

I. II. 5. Das Brand-

horn.

Linn. S. N. Sp. 525.

Belg. Dubbelde Brana - Hoorn. Angl. The Endive - Shell. Hill. Gall.  
a Chicorée. Argenv.

Testa sexariam frondosa,  
fractibus contiguis, rostro  
bbreuiato.

Die sechsfach krausblätteri-  
ge Schale, hat aneinander ge-  
wachsene Windungen, und ei-  
nen verkürzten Rüssel.

brunna,

α braun.

nivea, frondibus nigris.

β schneeweiß, mit schwarzen Kraus-  
blättern

Rumph. amb. t. 26. f. C. 2.

Petiv. amb. t. 12. f. 1.

Argenv. Conch. Pl. 15. f. K.

Seb. Thes. III. t. 77. f. 5, 6.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. I. t. 2. f.



*Knor. Vergn. II. 7. t. 4. 5. f.*

—— ——— III. 9. t. 2. f.

—— ——— VI. 19. t. 1. 4. f.

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 26.*

*Mart. Kouch. Kab. III. 107. t. 1004 - 1010. f.*

—— ——— 108. t. 1011 - 1014. f.

I. II. 6., *Murex Erina-*  
*ceus.*

I. II. 6. Die vieleckige  
Purpurschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 526.*

Testa multifariam subtrun-  
dosa, spirae anfractibus mult-  
angulis, rostro brevisculo,

Die Schale hat viele un-  
vollkommene Krausblätter, viel-  
eckige Wirbelgewinde, und ei-  
nen etwas verkürzten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 49. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. Varicosi, suturis rotundis,  
torosis.

I. III. Warzige, mit runden Knot-  
tigen Rätchen.

I. III. 1. *Murex Rana,*

I. III. 1. Die Kröten-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 527.*

*Belg. Padde-Hoorn. Rumph.*  
*Gall. Raerocheuse, Day.*

*Angl. Wide cadoe Whelk. Petiv.*

Testa



Testa futuris oppositis, compressis, cingulis mucatis, apertura ovata.

Die Schale hat entgegengesetzte Zusammengedrückte Ränder, dornige Gürteln, und eine eifrunde Oefnung.

Testa rotundata, spinis dorsii, & futurarum brevibus.

mit runder Schale, deren Rücken und Ränder mit kurzen Dörnern besetzt sind.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 182.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 59.*

*Petiv. Gaz. t. 100. f. 12.*

— amb. t. 11. f. 15.

*Rumph. amb. t. 24. f. G.*

*Gualt. Test. t. 49. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 15 — 18.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 64. f.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 6. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1271. f.*

Testa compressa, spinis futurarum elongatis.

mit platgedrückter Schale, und verlängerten Stacheln auf den Rändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 19.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1275. 1276. f.*



I. III. 2. *Murex Gyris*  
nus.

I. III. 2. Die Frosch  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 528.

*Belg.* Vorscheen = Poppe, *Gall.* Grenouillete.

Testa futuris oppositis, con-  
tinnatis, cingulis tuberculosis  
fasciata; apertura rotunda.

Die Schale hat entgegen-  
gesetzte ununterbrochene Rätze  
und ist mit knottigen Gürteln  
und einer rundlichen Mündung  
versehen.

*Seb. Thes.* III, t. 60. f. 25 — 27.

*Knor. Vergn.* VI. 25. t. 5. 6. f.

*Mart. Konch. Kab.* IV, 128. t. 1233. 1234. f.

I. III. 3. *Murex Lam-*  
pas.

I. III. 3. Der knottige  
Delfuchen.

*Linn. S. N. Sp.* 529.

*Belg.* Gebulde Olykoek, *Rumph.* Angl. Knopped Trumpet. *Petiv.*  
*Gall.* Culotte de Suisse *Dav.*

Testa granulosa, futuris op-  
positis, cingulis tuberculatis,  
labro dentato, labio striato.

Die körnige Schale hat ent-  
gegengesetzte Rätze, knottig  
Querbänder, eine gezähnt  
Schalenleiste, und gestreift  
Spindellippe.

*Bonanz. Recr.* ol. 3. f. 103.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 15. f. 88.

*Rumph.* amb. t. 28. f. C.

*Petiv.* amb. t. 12. f. 16. 17.

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 50. f. D.*

*Argenv. Conch. t. 9. f. D.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 106. t. 998 — 123. f.*

I. III. 4. *Murex Olearium.*

I. III. 4. Der geribbte  
Delfuchen.

*Linn. S. N. Sp. 530.*

*Belg. Gebande Argus Oogen. Rumph. Angl. Girdled Argus Shell.*  
*Petiv. Gall. Argus a boutons-*

Testa futuris alternis, cin-  
gulis nodosis, dorso pollice  
transuersim striato.

Die Schale hat wechselwei-  
se stehende Rätze, knottige  
Gürteln, und einen hinten mit  
Querstreifen besetzten Rücken.

*Bonan. Recr. cl. 3. t. 289.*

*Rumph. amb. t. 49. f. E.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 50. f. A.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1223. f.*

I. III. 5. *Murex costatus.*

I. III. 6. Der eckige  
Delfuchen.

T 4

Testa



Testa subfusiformi; costis Die einigermaßen spindelför-  
transuersis angulatis, futura mige Schale, hat eckige Quer-  
solitaria, rostro elongato. ribben, eine einzelne Nath,  
mit einem verlängerten Rüssel.

Seb. Thes. III. 1. 57. f. 31.

Mart. Konch. Kab. IV. 131. t. 1253. f.

Testa subfusiformis. Anfractus  
circiter octo, cincti costis crassis,  
conuexis, angulatis. Sulci inter-  
medii striati, striis eleuatis, dupli-  
catis. Sutura varicosa, solitaria,  
labro subopposita. Apertura plica-  
ra, ouato oblonga, declinens in ro-  
strum umbilicatum, canaliculatum  
recuruum. Color pallide luteus.

Die Schale ist einigermaßen spin-  
delförmig. Die Gewinde, deren  
beiläufig acht sind, haben dicke er-  
habene eckige Ribben. Die Zwi-  
schenfurchen sind gestreift, die  
Streifen erhaben und doppelt. Die  
Nath ist knottig und einzeln, der  
Schalenleiste gegenüberstehend. Die  
gefaltene länglich eiförmige Mün-  
dung endiget sich in einen nabel-  
förmig eingedrückten, rinnenarti-  
gen gekrümmten Rüssel. Die Far-  
be ist bläulich.

I. III. 6. Murex Femo-  
rale.

I. III. 6. Das Fußhorn.

Linn. S. N. Sp. 531.

Belg. Voet - Hoorn. Rumph. Angl. Stooone Whelk. Gall. Rhino-  
ceros. Dav.

Testa rugosa, trigona; spi-  
rae apice tuberculato, aper-  
tura edentula, antice trans-  
uersim expansa.

Die runzelichte dreieckige  
Schale hat eine knotige Wir-  
belspitze, mit einer ungezäh-  
nten vorne in die Quere erwei-  
terten Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 290.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 37.

Rumph. amb. t. 26. f. B.

Petiv.



*Petiv. amb. t. 12. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 50. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 63. f. 7 — 10.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. I. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1039. f.*

I. III. 7. *Murex cuta-*  
*ccus.*

I. III. 7. Die Haut-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 532.*

*Belg Vell - Hoorn. Gall. Degrés bordés.*

Testa futura solitaria, no-  
disque transuersim decussatis,  
apertura dentata, columella  
perforata.

Die Schale hat eine einzels  
ne Nath, in die Quere durch-  
kreuzte Knotten, eine gezähne  
te Mündung, und durchbohrte  
Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 38.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 10. 11.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 118. t. 1085. 1086. f.*

I. III. 8. *Murex Pyrum.*

I. III. 8. Die getrock-  
nete Birne.

*Linn. S. N. Sp. 535.*

*Belg. Gedrooyede Peer. Rumph. Angl. Hairy Whelk. Petiv. Gall.*  
*Poire ferhe.*

Testa ouata, nodosa, trans-  
uersim sulcata, rostro elonga-  
to flexuoso.

Die eysförmige knottige Scha-  
le ist in die Quere gefurchet,  
und mit einen langen geboge-  
nen Rüssel versehen.

*List.*



*Rumph. amb. t. 26. f. E.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 37. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 60. f.*

*Knor. Vergn. II. 7. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040. 1041. f.*

I. III. 9. *Murex Rubecula.*

I. III. 9. Die Libree-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 536.*

*Belg. Livreyhoorn. Gall.*

Testa futuris oppositis, cin-  
gulis nodulosis, apertura den-  
tata.

Die Schale hat entgegen-  
gesetzte Näthe, knottige Gür-  
teln, und eine gezähnte Mün-  
dung.

*Gualt. Test. t. 49. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. I.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. I — 5.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 3. 4. f.*

— — — III. 5. t. 2. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. IV. 132. t. 1259 — 1266. f.*

I. III. 10.



I. III. 10. *Murex reticularis*.

*Linn. S. N. Sp. 538.*

I. III. 10. Die Netzschnecke.

Testa futuris suboppositis, Die knottige Schale hat einigermassen entgegengesetzte Nätzel, netzförmig durchkreuzte erhabene Streifen, und einen verkürzten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 193.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 30.*

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 49. f. M.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. 11. *Murex Anus*.

*Linn. S. N. Sp. 539.*

I. III. 11. Das frumme Maul.

*Belg. Oorhorn. Valent. Angl. Hairy - Ear. Petiv. Gall. La Grimace.*

Testa gibbosa reticulatim Die höckerige, netzförmige, tuberculata, futuris, & labiis knottige Schale, hat ausgedilatato membranaceis, rostro breitete häutige Nätze und Lippen, mit einem aufgerichteten credo. Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 279. 280.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 57.*

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 74. f. 9.; t. 99. f. 10.*

— *amb. t. 6. f. 4.*

*Rumph. umb. t. 24. f. F.*

*Gualt. Test. t. 37. f. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 6. 7.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 3. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. II. 41. t. 403. 404. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 2.*

I. IV Echinati, sine rostro.

I. IV. Dornige, ohne Rüssel.

I. IV. I. Murex Ricinus.

I. IV. I. Die gezackte  
Maulbeere.

*Linn. S. N. Sp. 540.*

*Belg. Gedakte Moerbey. Rumph. Angl. Small Spur Shell. Pet. Gall:  
L' Herisson. Dav.*

Testa ovata, spinis subula-  
tis, apertura dentata.

Die eiförmige Schale ist  
mit ahlförmigen Dornern beset-  
zet, und an der Mündung ge-  
zähnt.

α ore luteo, spinis longioribus  
(minor).

α mit gelber Mündung. und längeren  
Dornern (kleiner).

β ore amethystino, spinis breuiori-  
bus (major).

β mit amethystfarbener Mündung,  
und kürzeren Dornern (größer).

*Rumph.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 24. f. E.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 28. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 37. 3942.*

*Knor. Vergn. I. 25. t. 5. 6. f.*

—— — VI. 24. t. 7. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 972. 973 f;*

—— — 102. t. 976. 977. f.

I. IV. 2. Murex Nodus. I. IV. 2. Die große Kastanie.

*Linn. S. N. Sp. 541.*

*Belg. De bandeerde Castanje. Angl. The great Chesnut. Gall. La Chataigne a bandes.*

Testa utrinque attenuata, spinis conicis, labro tuberculato, columella laevi. Die beiderseits zugespitzte Schale ist mit kegelförmigen Stacheln besetzt, an der Schalenleiste knottig, an der Spindel glatt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 12.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 957. 958. f.*

I. IV. 3.



I. IV. 3. *Murex neritoides*.

*Linn. S. N. Sp. 542.*

I. IV. 3. Das Schmutzpflästerchen.

*Belg. Roots - Hoorn met Moesjesjes. Angl. The Coequet. Gall. La Coquette.*

Testa obtuse nodosa, labro angulato, columella complanata, bimaculata.

Die Schale ist mit stumpfen Knotten besetzt, an der Schalenleiste eckig, mit zween Flecken an der flachgedrückten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 50.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 173. 174.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 66. f. B. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 1. f. 30.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 959. 960. f.*

I. IV. 4. *Murex Mancinella*.

I. IV. 4. Die lange Maulbeere.

*Linn. S. N. Sp. 544.*

*Belg. Langverpige Maerberzie. Angl. The Mulberry Shell, Hill Gall. La Mure allongée.*

Testa ovata oblonga, tuberculis acutis muricata, ore dentato amethystino.

Die eiförmige längliche Schale ist mit spizigen Dornen bewafnet, mit einer amethystfarbenen gezähnten Mundung.

*List.*



- List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 5.*  
*Petiv. Gaz. t. 48. f. 14.*  
*Argenv. Conch. Pl. 17. f. H.*  
*Hill. Hist. of Anim. Pl. 8.*  
*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 970. f.*

I. IV. 5. *Murex Hippocastanum.*

I. IV. 5. Das Pimpelchen.

*Linn. S. N. Sp. 545.*

*Belg. Pimpeltje.*

Testa ovata striata, quadrifariam spinosa, columella umbilicata.

Die eysförmige gestreifte Schale ist mit vier Reihen Stacheln umgeben, und an der Spindel genabelt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 15.*

*Rumph. amb. t. 24. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 31. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 80 — 82.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 3. f.*

—— — V. 4. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. t. 40. f. 398.*

I. IV. 6. *Murex rugosus.*

I. IV. 6. Die runzellichte Knotenschnecke.

Testa



*Testa ovata, longitudinaliter rugosa, striis, carinisque nodosis transuersis, rostro umbilicato brevi.* Die eiförmige, der Länge nach runzelichte Schale ist in die Quere gestreift, und knotig gefielel, mit einem genabelten kurzen Rüssel.

*Mart. Konch. Kab. IV. 124. t. 1155. 1156. f. Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa ovata. Anfractus quinque connati, longitudinaliter rugosi, transuersim striati, & carinati, carinis angulatis. Apertura ovalis columella umbilicata. Rostrium breue, effusum.* Die Schale ist eiförmig. Die fünf Gewinde sind zusammengewachsen, nach der Länge gerunzelt, in die Quere gestreift, mit eckigen Riesen. Die Mündung eiförmig. Die Spindel genabelt. Der Rüssel kurz und ausgeschlitten.

I. IV. 7. *Murex sen-  
ticofus.*

I. IV. 7. Die Distel-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 546.*

*Belg. Distel - Hoorntje. Angl. Small prickly Whelk. Petiv.*

*Testa subturrita, longitudinaliter costato muricata, transuersim cancellata, ore striato.* Die einigermaßen gerümpelte Schale ist der Länge nach stachelicht geribbt, in die Quere gegittert, an der Mündung gestreift.

*Bonap. Recr. pl. 3. f. 35.*

*Rumph. amb. 1. 29. f. N.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 51. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. 0.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45 — 47.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. 4. 5. f.*

I. IV. 8. Murex Melon-  
gena.

I. IV. 8. Das Bettzeug.

*Linn. S. N. Sp. 547.*

*Belg. Gedoorende Schildpadstaert. Rumph. Angl. The blue & white  
Murex. Hill. Gall. le Lard. Dava*

Testa pyriformi, spira Die birnförmige Schale hat  
subspinosa prominente, aper- einen hervorstechenden einiger-  
tura laevi. maßen dornigen Schnitzel,  
und eine glatte Mündung.

« ventre transverse spinoso.

« der Leib der Quere nach mit  
Stacheln besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 186. 295.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 24.*

*Rumph amb. t. 24. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 21. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. H.*



*Seb. Thes. III. t. 72. f. 1 — 9.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 391 — 893. f.*

— — — — — 40. t. 394. f.

β ventre sine spinis.

β der Leib ohne Stacheln.

*Rumph. amb. t. 24. f. 3.*

*Petiv. amb. t. 21. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 393. f. 40. t. 395-397f.*

I. IV. 9. *Murex raphi-*  
*formis.*

I. IV. 9. Die dicke  
Rübe.

*Belg. Geknobbelde Knoll. Gall. Gros - Radix.*

<p><i>Testa</i> pyriformi , spinis fornicatis obtusis , anfractibus carinatis , rostro breui, in- curuo , umbilicato.</p>	<p>Die birnförmige Schale ist mit hohlen stumpfen Stacheln besetzt, mit keilsförmig erhaben- en Gewinden, und einem kurzen krummen genabelten Rüssel.</p>
---	---

<p><i>Testa</i> pyriformis , ponderosa. An- fractus sex , transuersim striati, ca- rinati , carina spinis ; fornicatis ob-</p>	<p>Die Schale ist birnförmig, und schwer. Die sechs Gewinde sind gestreift, und keilsförmig, am Niele tusis</p>
--	---



us coronata. Sutura canaliculata. Spira pyramidata. Labrum intransversum striatum. Columella umbilicata; umbilicus latus, profundus, lamellosus, incurvatus. Rostrum breue inflexum.

mit hohlen stumpfen Stacheln gekrönt; Die Muth rinnenartig ausgehöhlet; Der Schnirkel pyramidenförmig; Die Schalenleuze inwendig in die Quere gestreift. Die Spindel genabelt; der breite, tiefe, und blätterichte Nabel ist in einen kurzen krummen Rüssel gebogen.

subspinosa albida.

„weiß, mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 21. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 750. f.*

foliaceo spinosa, fusca.

ß braun, mit Blättern und Stacheln besetzt.

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 754. 755. f.*

I. IV. 10. Murex laceus.

I. IV. 10. Der ausgeschnittene Morgenstern.

Testa ovata, oblonga, striata; in fractibus carinatis, spinosis; abro antice soluta; columella perforata.

Die eiförmige länglichte gestreifte Schale hat kielförmige flachlichte Gewinde, eine vorne ausgeschnittene Schalenleuze, mit einer durchbohrten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. II.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 56 — 58.*



*Seb. Thes. III. t. 60. f. 30 — 32.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 95 I. f.*

Testa orata, utrinque attenuata. Anfractus quinque, transuersim carinati; carina ipinis obtusis muricata. Ventris cingula spinosa b n. Apertura ouato oblonga. Labium antice sinu a columella solutum. Columella umbilicata. Color ex pallido roseus.

Die eysförmige Schale ist beiderseits zugespitzt. Die fünf Gewinde sind in die Quere gestreift, und keilsförmig, an dem Riele mit stumpfen Stacheln besetzt. Um den Leib sind zweien stachelichte Bänder. Die Mündung ist länglicht eysförmig. Die Schalenleste vorne durch einen Ausschnitt von der Spindel getrennet. Die Farbe ist blaß rosenroth.

I. V. Rostro recto elongato.

I. V. Mit einem geraden verlängerten Rüssel.

I. V. I. Murex babylonius.

I. V. I. Der Babelsthurm.

*Linn. S. N. Sp. 549.*

*Belg. Babilonse Tooren. Rumph. The Babel Shell. Pet. Gall. L. Tour de Babel. Dav.*

Testa turrita, cingulis acutis maculatis, labro fissio, rostro elongato recto.

Die gethürmte Schale ist mit scharfen gefleckten Gürteln umgeben, an der Schalenleste gespalten, mit einem verlängerten geraden Rüssel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 29. f. L.*

*Gualt. Test. t. 52. f. N N.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 79. f.*

*Hill. Hist. of Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 9. f.*

*Knor. Vergn. IV. 13. t. 2. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1331. 1332. f.*

I. V. 2. *Murex javanus.* I. V. 2. Die javanische  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 550.*

Testa turrita, transuersum Die gethürmte in die Dues  
striata, asfractibus carinato re gestreifte Schale hat tiels  
tuberculatis, labro antice so- förmige knottige Gewinde, und  
luto. eine vorne getrennte Spindel-  
leſze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 79.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 42.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1334. 1335. f.*

I. V. 3. *Murex Colus.* I. V. 3. Die franzöſi-  
sche Spindel.



Linn. S. N. Sp. 551.

Belg. Tabaks-Pip. Rumph. Angl. Spindle-Shell. Pet. Gall. Le Fufeau.

Testa turrita, transuersim Die gethürmte in die Que-  
striata, carinato nodosa, labro re gestreifte Schale hat knottig-  
crenulato, rostro recto elon- ge Kiele, eine geferbte Spin-  
gato. dellefze, und einen geraden ver-  
längerten Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 360.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 11.

Rumph. amb. t. 29. f. F.

Petiv. amb. t. 6. f. 5.

Gualt. Test. t. 52. f. L.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. B.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 78.

Seb. Thes. III. t. 79. 4. 5.

Regenf. Samml. I. t. 12. f. 6.

Knor. Vergn. III. 5. t. 1. f. 14. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 144. t. 1339—1341. f.

—— ——— 145. t. 1343—1344. f.

Miüll. Linn. Naturf. IV. 1. B. 17. t. 3. f.

Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 4.

I. V. 4. Murex Mo-  
rio.

I. V. 4. Der handirte  
Mohr.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 552.*

Testa ventricosa nigra, fasciis transuersa alba, spiraele habet unum transversum band, anfractibus nodosis, columella und knorrige Schnirkelgewinde mit einer runzelichten Spindel.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 357.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 31.*

*Seb. Tbes. III. t. 80. f. plurimae.*

*Regenf. Samml. I. II. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 1. f.*

—— ——— II. 6. t. 2. f.

—— *Del. nat. I. t. B. V. f. 4.*

*Mart. Koncb. Kab. IV. 139. t. 1300. f.*

I. V. 5. *Murex Cochlidium.*

I. V. 5. Die indische Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 553.*

*Belg. Indian. Gall. L'Indien.*

Testa ventricosa, transuersim sulcata, anfractibus spinis coronatis, rostro elongato recto. Die bäuchige Schale ist der Quere nach gefurchet, an den Gewinden mit Stacheln gekrönt, mit einem verlängerten geraden Rüssel.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. o. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 57. f. 27. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 15. t. 4. f. ; 26. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 143. t. 1333. f.*

I. V. 6. *Murex Spirillus.*

I. V. 6. Die langschne-  
belige Rube.

*Linn. S. N. Sp. 554.*

*Belg. Langgestarte glatte Knoll. Gall. Maisüe lifse.*

*Testa ventricosa, spira acuminata, anfractibus acute marginatis, columellae labio expanso.*

Die bäuchige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, scharfrandige Gewinde mit einer ausgebreiteten Schalenleiste.

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 115. t. 1069. f.*

I. V. 7. *Murex canaliculatus.*

I. V. 7. Die gezackte  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 555.*

*Belg. Raap. Gall. Navet a longue queue.*

**Testa**



Testa ventricosa, spirae an-  
fractibus canaliculo diuine-  
tis.

Die Gewinde der bäuchigen  
Schale sind mit einer Rinne  
von einander abgesondert.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 2.*

*Valent. Abb. II. t. 92. f.*

*Gualt. Test. t. 47. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 22.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. VI. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. III. 67. t. 742. 743. f.*

I. V. 8. Murex per-  
versus.

I. V. 8. Die linksge-  
wundene Feige.

*Linn. S. N. Sp. 557.*

*Angl. The pointed Murex. Hill. Gall. Buccin unique. Argenv.*

Testa ventricosa, anfracti-  
bus sinistrorsis, spinoso coro-  
natis, rostro elongato recto.

Die bäuchige Schale hat  
links gewundene mit Stacheln  
gekrönte Windungen, und einen  
geraden verlängerten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 30. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



I. V. 9. Murex pugilinus.

I. V. 9. Das unächte Fleischhorn.

Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute coronatis, rostro recto, extus transuersim sulcato.

Die bäuchige Schale hat rinnenartig ausgefehlte, und spizig gekrönte Windungen, mit einem geraden auswändig in die Quere gefurchten Rüssel.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 13. f. infra 6.

Gualt. Test. t. 47. f. B.

Knor. Vergn. I. 30. t. 1. f.

Mart. Conch. Kab. IV. 152. t. 1323. 1324. f.

Testa ventricosa, crassa. Anfractus septem, infra futuram canaliculati, in medio carinati; carina spini acuti breuibus coronata. Venter laevis, spira, & rostrum rectum, transuersim undulato striata. Columella subumbilicata. Color fulvus, aut pallide luteus.

Die Schale ist bäuchich, und dick. Die sieben Gewinde sind unter der Naht rinnenartig ausgefehlet, in der Mitte kielformig erhaben, und allda mit kurzen spizigen Stacheln gekrönt. Der Leib ist glatt, der Schnirkel, und der gerade Rüssel in die Quere wellenförmig gestreift. Die Spindel einigermassen genabelt. Von gelbrother, oder blaßgelber Farbe.

I. V. 10. Murex aruanus.

I. V. 10. Die zwenkellige Spindel.

Linn. S. N. Sp. 556.

Testa



Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
 anfractibus bicarinatis, rostro le hat zwey erhabene rielsförmige  
 elongato, Gürteln, und einen verlängerten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 101.*

*Rumph. amb. t. 28. f. A.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 138. t. 1295. 1296. f.*

I. V. II. Murex despectus.

I. V. II. Die nordische Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 559.*

*Belg. Noordsche Wulk. Angl. The common english Whelk. Da Cost.*

Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
 anfractibus teretibus, rostro le hat runde Gewinde, und einen  
 recto, geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 190.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 4; f. 15. f. 15.*

*Linn. It. westg. t. 5. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 83. f. 3 — 6.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3 — 5.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1292. 1294. f.*

I. V. 12.



I. V. 12. Murex Tritonis.

I. V. 12. Die Tritons-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 560.

Belg. Kink-Hoorn, Rumph. Angl. Tritons-trumpet. Pet. Gall.  
Trompe marine Dav.

Testa oblonga, anfractibus teretibus, prope suturam crenulatis, varicibus longitudinalibus, apertura denticulata. Die längliche Schale hat runde an der Naht gekerbte Windungen, mit nach der Länge laufenden Näthen, und einer gezähnelten Mündung.

Sulci transversi, striati. Apex roseus. Nach der Quere laufen gestreifte Furchen. Die Spitze ist rosenroth.

α attenuata rosea, & lutescens α schmal, von rosenrother, oder immaculata. gelblicher Farbe ohne Flecken.

Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1278. 1279.f.

β ventricosa, albo fuscoque variegata. β bäuchig, weiß und braun gefleckt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 188.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 12. 13.

Rumph. amb. t. 28. f. B.

Petiv. Gaz. t. 12. f. 15.

Gualt. Test. t. 48. f. A.

Seb.



*Seb. Tbes. III. t. 81. f. omnes.*

*Knor. Vergn. II. 16. t. 2. 3. f.*

—— ——— *V. 5. t. 1. f.*

—— ——— *Del. nat. I. t. B. VI. f. 1.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1277. f.*

—— ——— *136. 1282. 1283. f.*

I. V. 13. Murex Pufio.

I. V. 13. Die gefleckte Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 561.*

*Belg. Gnemoe - Hoorn,*

Testa oblonga, ventricosa, Die längliche bäuchige glatte  
laeui, anfractibus rotundatis, te Schale, hat runde Gewin-  
apertura laeui, rostro breui. de, eine glatte Mündung, samt  
einem kurzen Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 40.?*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 14. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 52. f. 7.*

*Knor. Vergn. IV. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 97. t. 1357. f.*

I. V. 14. Murex accinus.

I. V. 14. Die Gürtel-  
spindel.

Testa



Testa fusiformi, laevi, fusca, anfractibus conuexis, fascia articulata alba, rostro recto breui.

Die spindelförmige glatte Schale hat an den bäuchigen Gewinden einen gegliederten weißen Gürtel, mit einem kurzen geraden Rüssel.

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1281. 1219. f.*

Testa fusiformis, laevis. Anfractus octo conuexi, attenuati, connati. Apertura ouato oblonga. Labrum intus striatum. Columella laevis, supra plica una transuersa. Basis extus transuersim striata, constituens rostrum abbreviatum, rectum. Color atro fuscus, cingulo angusto anfractuum albo, lineis angulatis rufis articulado.

Die Schale ist spindelförmig und glatt. Die acht bäuchigen zusammengewachsenen Gewinde verbinden sich. Die Schalenleiste ist innwändig gestreift. Die Spindel glatt, und oben mit einer Quersalte versehen. Der Grund ist von außen in die Quere gestreift, und bildet einen geraden verkürzten Rüssel. Von schwarzbrauner Farbe mit einer weißen schmalen Quersbinde, die durch rothbraune Bindelzüge unterbrochen wird.

I. V. 15. Murex vulpinus.

I. V. 15. Die rothbraune Spindel.

Testa oblonga, ventricosa, glabra, basi, anfractuumque marginibus striatis, rostro breui, torto.

Die längliche bäuchige glatte Spindel ist an dem Rande der Windungen gestreift, und mit einem kurzen gedrehten Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa oblonga. Anfractus octo  
laeues, teretiusculi, prope futuram  
transuersim striati. Venter conue-  
xus subtus transuersim striatus,  
definens in rostrum breue extus in-  
tortum. Apertura laevis. Color ex  
fusco ruber.

Die Schale ist länglich. Die  
acht Gewinde glatt, rund, an der  
Nath in die Quere gestreift. Der  
erhabene Leib ist unten der Quere  
nach gestreift, und endiget sich in  
einen kurzen, auswändig gedrehten  
Rüssel. Die Mündung ist glatt.  
Von braunrother Farbe.

I. V. 16. Murex Tuli-  
pa.

I. V. 16. Die Achat-  
birne.

Linn. S. N. Sp. 562.

Belg. Agaate - Peer. Rumph. Gall. L'Agathine. Dav.

Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige glatte  
laeui, anfractibus rotundatis, Schale hat runde mit einer  
futura geminata, columella uni- zweyfachen Nath versehene Ge-  
plicata, rostro patulo striato. winde, mit einer Falte an der  
Spindel, samt einem erweiter-  
ten gestreiften Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 187.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. I. 2.

Rumph. amb. t. 49. f. H.

Gualt. Test. t. 46. f. A.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 23 — 31.

Regenf. Samml. I. 9. t. 35. f.



*Knor. Vergn. V. 18. t. 5. f.*

— — — *VI. 29. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1286. f.*

— — — — — *137. t. 1288. 1289. f.*

I. V. 17. *Murex Dolarium.*

I. V. 17. Die Vortreppe.

*Linn. S. N. Sp. 564.*

*Belg. Bostappen.*

Testa ventricosa, costis obtusis angulatis, labro plicato, columella umbilicata.

Die bäuchige Schale hat stumpfe, eckige Rippen, eine gefaltene Spindel, samt einer genabelten Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 347.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. II.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 5. f.*

I. V. 18. *Murex lignarius.*

I. V. 18. Die Splzspindel.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa



Testa oblonga, anfractibus Die längliche Schale hat longitudinaliter plicatis, ob- stumpfknottige nach der Länge ruse nodosis, rostro abbrevia- gefaltene Windungen mit einem to. verkürzten Schnabel.

Fulva, fascia ventris niuea.

Rotthgelb, mit einer weißen Quer-  
binde um den Leib.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 32.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 7. f.*

I. V. 19. Murex Tra-  
pezium.

I. V. 19. Die Band-  
spindel.

*Linn. S. N. Sp. 567.*

*Belg. Gebaande Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le Tapis. Dar.*

Testa oblonga, anfractibus Die längliche Schale hat carinato angulatis, apertura keilsförmige eckige Windungen, dentata, rostro recto. eine gezähnte Mündung, mit einem geraden Schnabel.

Lineis transuersis, geminatis fus- Mit gepaarten braunen Quere-  
cis. streifen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 287.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 26.*

*Rumph. amb. t. 49. f. K.*



Gualt. Test. t. 46. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. H.

Seb. Thes. III. t. 79. f. 1.

Knor. Verg. IV. 20. t. 1. f.

—— — V. 10. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV, 139. t. 1298. 1299. f.

I. V. 20. Murex craticulatus.

I. V. 20. Die Wellenspindel.

Linn. Sp. N. Sp. 569.

Testa fusiformi longitudinaliter rugosa, cingulis elevatis acutis, labro dentato, rostro recto.

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach gerunzelt, und in die Quere mit erhabenen scharfen Ringen umgürtet, an der Schalenleiste gezähnt, mit einem geraden Küssel.

Nivea, maculis longitudinalibus croceis.

Schneeweiß, mit nach der Länge laufenden safranrothen Flecken.

Liss. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 22.

Knor. Vergn. II. 3. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV, 149. t. 1382. 1383. f.



I. VI. Turriti, rostro brevi.

I. VI. Gethürmte, mit kurzem  
Rüssel.

I. VI. 1. Murex Verta-  
gus.

I. VI. 1. Die Schnau-  
zennadel.

Linn. S. N. Sp. 571.

Belg. Witte Tuitje. Rumph. Angl. White Inouted Peg. Petiv. Gall.  
Chenille blanche. Dav.

Testa turrita, anfractibus su- Die gethürmte Schale hat  
perne plicatis, rostro ascen- oben gefaltene Bindungen, ei-  
dente, columella biplicata. nen aufgerichteten Rüssel, und  
zwei Falten an der Spindel.

Bonap. Recr. cl. 3. f. 84.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 15. f. 83.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 4.

— amb. t. 13. f. 14.

Rumph. amb. t. 30. f. K.

Gualt. Test. t. 57. f. D.

Agenv. Conch. Pl. 11. f. P.

Adans. Seneg. Pl. 10. f. 2.

Knor. Vergn. III. 20. t. 3. f.

— — V. 15. t. 6. f.

— — VI. 40. t. 4. 5. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 28.

Müll. Linn. Naturfyst. VI. B. 17 t. 4 f.



*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1479. f.*

— — — — — 157. t. 1480. 2488. f.

**I. VI. 2. Murex sulcatus.**

**I. VI. 2. Die Mangos-  
nadel.**

*Belg. Mauger - Naalde. Rumph. Angl. Mango's Peg. Pet.*

Testa turrita, longitudinaliter rugosa, transuersim sulcata, labro ampliato, rostro breuissimo recto.

Die gethürmte Schale ist in die Länge gerunzelt, der Quere nach gefurchet, an der Schalenlefze ausgebreitet, mit einem sehr kurzen geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 30. f. T.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1484 - 1485. f.*

Testa turrita. Anfractus undeni, decliues, plani, longitudinaliter rugosi, transuersim sulcati. Labrum ampliatum, acute marginatum, antice solutum. Columella vix labiata. Angulo labro opposito. Rostrium breuissimum, rectum. Color fuscus.

Die Schale ist gethürmet. Die fünf Gewinde sind abhängig flach, nach der Länge mit Runzeln, in die breite mit Furchen besetzt. Die Schalenlefze ist ausgebreitet, scharf-randig und vorne abgesondert. An der Spindel ist kaum eine Lefze. Der Schalenlefze gegen über steht eine hervorragende Ecke. Der Rüssel ist sehr kurz und gerad. Die Farbe braun.



I. VI. 3. Murex gibbo-  
fus.

I. VI. 3. Die höckerige  
Stachelnadel.

Testa turrita anfracti-  
bus marginatis, ventre gibbo;  
labro fillo, denticulato, ro-  
stro breui.

Die gethürmte Schale ist an  
den Windungen eingesäumet,  
auf dem Rücken höckerig, an  
der gespaltenen Schalenleiste ge-  
zähnel, und mit einem kurzen  
Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter  
nouem transuersim striati, plicis  
longitudinalibus decussati, supra  
prope futuram compresso margina-  
ti. Venter tubere dorsali gibbus.  
Apertura oblonga Labrum supra  
sinu transuerso lato fissum, mar-  
gine denticulatum Columella re-  
plicata, laeuis. Rostrum rectum,  
breue. Color albus, maculis pal-  
lide rubris.

Die Schale ist gethürmet. Die  
Gewinde, deren beiläufig neun sind,  
gestreift, mit nach der Länge  
laufenden Falten durchkreuzet, und  
oben an der Naht mit einem ein-  
gedrückten Rande versehen. Der  
Leib hat auf dem Rücken einen Hö-  
cker. Die Mündung ist länglich.  
Die Schalenleiste durch einen breit-  
Querausschnitt gespalten, am Ran-  
de gezähnel. Die Spindel ist über-  
geschlagen, und glatt. Der Rüssel  
gerad, und kurz. Von weißer Far-  
be mit blaßrothen Flecken.

I. VI. 4. Murex Aluco.

I. VI. 4. Die gefürchte  
Doruspindel.

*Linn. S. N. Sp. 572.*

*Belg.* West Indische Pause - Kroon. *Rumph.* *Angl.* Knopped Popes  
Crown. *Petiv.*



Testa turrita, anfractibus Die gethürmte Schale hat  
transuersim sulcatis in medio nach der Quere gefurchte, in  
tuberculatis, columella uni- der Mitte mit Knoten besetzte  
plicata, rostro ascendente. Gewinde, zwei Falten an der  
Spindel, und einen aufgerich-  
ten Rüssel.

α albidā.

α weißlich.

β alba, maculis lineisque fuscis.

β weiß, mit braunen Flecken und  
Strichen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 67.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 87.*

*Rumph. amb. t. 30. f. 0.*

*Petiv amb. t. 7. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 57. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 25. t. 50. f. 15. 16.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1473. 1474. f.*

I. VI. 5. Murex corona-  
tus.

I. VI. 5. Die gedornete  
Schneppennadel.

*Belg. Gedoornde Snuite Fen. Rumph. Angl. The rougheren Shell.*  
*Hill.*



Testa turrita, substriata, anfractibus coronatis, columella uniplicata, rostro ascendente.

Die gethürmte Schale ist einigermaßen gestreift, an den Gewinden gekrönet, mit einer Falte an der Spindel, und einen aufgerichteten Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 69. -

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 79.

Rumph. amb. t. 30. f. N.

Petiv. amb. t. 13. f. 23.

Gualt. Test. t. 57. f. A.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Knor. Vergn. III. 16. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1478. f.

Testa turrita substriata. Anfractus undeni, subtrus laeues, in medio spinis procumbentibus coronati, prope futuram attenuati. Apertura, & rostrum praecedentis. Color albidus, maculis latis, fuscis,

Die Schale ist gethürmet, und einigermaßen gestreift. Die elf Gewinde sind unten glatt, in der Mitte mit darnieberliegenden Schneckern gekrönet, nächst der Mündung verengert. Die Mündung und der Rüssel ist wie bei der vorhergehenden Art. Weißlich mit braunen Flecken.

I. VI. 6. Murex litteratus.

I. VI. 6. Die Buchstabenmadel.

Testa ventricosa turrita, nigro maculata, columella uniplicata, rostro breui.

Die bäuchig gethürmte schwarzgeleckte Schale hat an der Spindel eine Falte, und einen kurzen Rüssel.



List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 89.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ventricosa, turrata. Anfractus circiter octo coaliti, supra prope futuram spinis erectis brevibus muricati. Apertura ampliata. Columella uniplicata, Rostrum breve, rectum. Color niueus, maculis punctatis, characteres nonnquam aemulantibus, nigris.

Die Schale ist bäuchig und gethürmet. Die acht Gewinde sind zusammengewachsen, und oben mit kurzen aufgerichteten Dornen besetzt. Die Mündung ist erweitert. Die Spindel hat eine Querfalte. Der Rüssel ist kurz, und gerad. Die Farbe schneeweiß, mit schwarzen punktirten Flecken, die hirsweilen buchstabenähnliche Zeichnungen bilden.

I. VI. 7. Murex fuscaeus.

Linn. S. N. Sp. 573.

I. VI. 7. Die gezackte Besansspindel.

Belg. Getaakte Bezaanknop. Gall. Obelisce chinois. Dav.

Testa turrata, anfractibus spinolis, prope futuram crenulatis, basi planiuscula.

Die gethürmte Schale hat stachelichte, an der Muth gekerbte Windungen, und einen etwas flachen Boden.

α alba.

α weiß.

β ex fusco luteo.

β braungelb.

γ atro fusca.

γ schwarzbraun.

Gualt. Test. t. 56. f. E. H.

Argenv. Conch. Pl. II, f. L.

Knor.



*Knor. Vergn. III. 26. t. 4. 5. f.*

I. VI. 8. *Murex Radula.* I. VI. 8. Die Nadel-  
feile.

*Linn. S. N. Sp. 575.*

*Testa turrita, anfractibus serie triplici punctatis, basi planiuscula sulcata.* Die gethürmte Schale hat auf den Gewinden eine dreysache Reihe hervorstehender Punkte, mit einem etwas flachen gefurchten Boden.

*a alba.*

*a weiß.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 3. f.*

*β cingulis albis, rufis, fuscisque.* *β mit weißem, rothbraunen und dunkelbraunen Gürteln bemalt.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 327.*

*Gualt. Test. t. 58. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. VI. 9. *Murex atratus.* I. VI. 9. Die schwarze  
Stachelnadel.

*Testa turrita, atra, anfractibus transversim striatis, tuberculatis, columella uniplicata, rostro recto.* Die gethürmte schwarze Schale hat knottige, in die Quere gestreifte Windungen, eine Falte an der Spindel, mit einem geraden Rüssel.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus decem, coaliti, transversum striati, duplici tuberculorum acutorum, & brevium serie cincti. Apertura oblonga. Labrum dilatatum, crenulatum. Columella uniplicata. Angulus labri margini oppositus. Rostrum rectum, breue. Color, ater, nitens.

Die Schale ist gethürmet. Die zehn Gewinde sind zusammenge wachsen, und mit einer doppelten Reihe kurzer spiziger Hörnchen umgeben. Die Mündung ist länglich. Die Schalenleiste erweitert, und fein gekerbet. Die Spindel hat eine Quersalte. Der Spindelkehl gegenüber steht eine hervorragende Ende. Der Rüssel ist gerade und kurz. Die Farbe ist glänzend schwarz.

**K. Trochus.**

**K. Die Kräuselschnecke.**

Testa spiralis. Apertura angulata, coarctata. Columella obliquata.

Die Schale ist schnirrförmig gewunden. Die Mündung eckig, und eingefaßt. Die Spindel steht etwas schief.

K. I. Columella perforata.

K. I. Mit durchbohrter Spindel.

K. I. I. Trochus niloticus.

K. I. I. Die glatte Pyramide.

*Linn. S. N. Sp. 579.*

*Belg.*



Belg. Gevlakte Tol. Rumph. Angl. The great waved Top. Pet.  
all. Le Sabot marbré. Argenv.

Testa conica, anfractibus Die kegelförmige Schale hat  
onvexiusculis laevibus, co- einigermaßen erhabene glatte  
imella perforata. Gewinde, und einen durchbohr-  
ten Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 102.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 3.

Rumph. amb. t. 21. f. A.

Gualt. Test. t. 59. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. C.

Gev. Belust. 5. t. 33 — 35.

Regenf. Samml. I. 4. t. 42. f.

Knor. Vergn. I. 12. t. 1. f.

—— — II. 5. t. 1. f. ; 6. t. 1. f.

K. I. 2. Trochus macu-  
latus.

Linn. S. N. Sp. 580.

K. I. 2. Die knottige  
Pyramide.

Belg. Bagyne - Drolle. Rumph.

Testa conica, tuberculata, Die kegelförmige Kleinknote  
umbilico obliquo, labio bi- tige Schale hat einen schiefen  
lobo. Nabel, und einen zweyfachen  
Lappen an der Schalenlippe.



α conica, anfractibus transuersim  
striatis; albida, rubro maculata.

α kegelförmig, mit in die Quere gestreiften Windungen; weiß mit rothen Flecken.

*Gualt. Test. t. 61. f. E.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 4. 5. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 18. t. 1. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 20.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 13.*

β conica, anfractibus oblique rugosis, prope futuram compressis; alba, viridisque, rubro maculata.

β kegelförmig, mit schiefrunzlichten, an der Naht zusammengedrückten Windungen; weiß, und grün, mit rothen Flecken.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 8. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 21. f. 3.*

*Gev. Belust. 7. t. 52 f.*

γ conica attenuata, anfractibus transuersim striatis, prope futuram compressis; viridis fusco maculata.

γ spitzkegelförmig, mit in die Quere gestreiften, an der Naht zusammengedrückten Windungen; grün mit braunen Flecken.

*Gualt. Test. t. 61. f. D. D.*

*Gev. Belust. 7. t. 48. f.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 13. f.*



K. I. 3. Trochus per-  
spectivus.

K. I. 3. Die Perspektiv-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 581.*

*Belg. Perspectiv - Hoorn. Rumph. Angl. Spinner - Shell. Petiv. Gall.  
Cadran. Dav.*

Testa conuexo conica, an-  
tibus decussatim striatis,  
umbilico lato crenato.

Die gewölbt kegelförmige  
Schale hat kreuzweise gestreif-  
te Windungen, und einen wei-  
ten gekerbten Nabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 27. 28.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. L.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 65. f. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.*

*Gev. Belust. 25 t. 266 — 272 f.*

*Seb. Thes. t. 40. f. 1, 2, 13, 14, 28, 41, 42.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 1. 2. f.*

K. I. 4. Trochus pharao-  
ius.

K. I. 4. Die Pharao-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 584.*

*Belg.*



Belg. Plins Roberts Knop, Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testo subouata, striata, Die fast eiförmige gestreifte  
punctis concatenatis globosis, Schale ist mit kettenförmig an-  
columella labioque dentato, einanderstehenden runden Kör-  
umbilico crenato. nern umgeben, an der Spin-  
del und Schalenfuge gezähnt,  
am Nabel gekerbt.

Bonan. Recr. pl. 3. f. 222.?

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 25.

Petiv. Gaz. t. 14. f. 10.

Gualt. Test. t. 63. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. L. Q.

Adans. Seneg. Pl. 12. f. 2.

Gev. Belust. 13. t. 101 — 107. f.

Knor. Vergn. I. 30. t. 6. f.

— — — IV. 26. t. 3. 4. f.

K. I. 5. Trochus Magus. K. I. 5. Der Herenz-  
meister.

Linn. S. N. Sp. 585.

Belg. Tovenaar. Gall. Le Sorciere. Dav.

Testa umbilicata striata: Die genabelte und gestreifte  
anfractibus supra plicatis. Schale hat an dem Oberrande  
gefaltene Windungen.

Gualt.



Gualt. Test. t. 64. f. C.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.

Gev. Belust. 13. t 127. f.

Knor. Vergn. VI. 27. t. 4. f.

K. I. 6. Trochus cinereus.

Linn. S. N. Sp. 590.

Testa umbilicata, conica, anfractibus prope futuram calliculatis.

Alba, fasciis oblique fuscis.

K. I. 6. Der schiefstrahlige Kräusel.

Die genabelte kegelförmige Schale ist an der Naht ausgekehlet.

Weiß, mit schiefen braunen Querbindern.

Mus. Caes. Vindobon.

K. I. 7. Trochus umbilicatus.

Linn. S. N. Sp. 592.

Testa conuexa, conica, anfractibus substriatis, umbilico cylindraceo.

K. I. 7. Die Wirtelschnecke.

Die gewölbte kegelförmige Schale hat gestreifte Gewinde und einen walzenförmig ausgehöhlten Nabel.

Mus. Caes. Vindobon.

K. I. 8.



K I. 8. *Trochus fascia-*  
tus.

K. I. 8. Die gebänderte  
Kräuselschnecke.

Testa conica, laevi, an-  
fractibus rotundatis supra com-  
pressis, umbilico profundo, la-  
bro crenulato.

Die kegelförmige glatte  
Schale hat rundliche oben ein-  
gedrückte Gewinde, einen tie-  
fen Nabel, mit einer gekerb-  
ten Spindellese.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica. Anfractus quin-  
que rotundati, supra prope futuram  
complanati. Umbilicus verticalis  
profundus. Labium crenulatum.  
Color albidus, fusco maculatus, fas-  
cia transversa rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Ihre  
fünf rundliche Gewinde sind oben  
an der Naht etwas flach gedrückt.  
Der Nabel ist tief und senkrecht.  
Die Schalenleiste fein gekerbt. Die  
Farbe weiß mit braunen Flecken,  
und einem rosenrothen Querbande,

K. I. 9. *Trochus tessu-*  
latus.

K. I. 9. Der Würfel-  
kräusel.

Testa conica, anfractibus  
rotundatis transversim striatis,  
columella obsolete perforata.

Die kegelförmige Schale  
hat rundliche, in die Quere  
gestreifte Bindungen, und eine  
durchbohrte Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa conuexo conica. Anfractus quinque transuersim striati, conuexiusculi, decliues. Columella uniloba, replicata, obtegens foramen obliquum, tenue. Color albidus, luteo maculatus, tessulis oblongis purpureis seriatim digestis, infra hunc corticem margaritaceus.

Die Schale ist gewölbt kegelförmig. Die fünf Gewinde sind in die Quere gestreift, etwas bäuchig, und abhängig. Die Spindel hat eine lappenförmige Ecke, und bedeckt durch ihren Uberschlag das schiefe dünne Nabelloch. Die Farbe ist weiß, mit gelben Flecken, und länglichen purpurrothen reiheweise stehenden Flecken; unter dieser Rinde perlenmutterartig.

K. I. 10. Trochus solaris.

Linn. S. N. Sp. 593.

Belg. Zonne - Hoorn.

K. I. 10. Das Sonnenhorn.

Testa umbilicata complanato conica, anfractibus spinoso radiatis, apertura semicordata,

Die genabelte flachgedrückte kegelförmige Schale hat um die Gewinde stachelichte Strahlen, und eine halb herzförmige Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 366. 367.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 9.

Rumph. amb. t. 20. f. K.

Gualt. Test. t. 65. f. N. P.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. H.

Gev. Belust. 20. t. 192 f.

Knor. Vergn. VI. 26. t. 4. f.



K. II. Imperforati.

K. II. Ohne Nabelloch.

K. II. 1. Trochus Pyramis.

K. II. 1. Die Spizsäule.

Testa conica acuminata; anfractibus imbricatis, seriatim granulosis; columella contorta imperforata.

Die kegelförmige zugespitzte Schale hat ziegelförmig aufeinander liegende, reiheweise mit Körnern besetzte Gewinde, mit einer Krümmungsdrehen um durchbohrten Spindel.

Gev. Belust. 9 t. 68 f.

Knör. Vergn. I. 12. t. 4. f.

Testa conica. acuminata. Anfractus duodecim plani declives, serie transversa triplici granulorum cincti; margine inferiore imbricato, prominente, crenato, acuto. Basis plana, transversim striata. Color pallide virescens, fusco luteo maculatus; infra corticem argenteus.

Die Schale ist kegelförmig und zugespitzt. Die zwölf Gewinde sind abhängig, flach, mit einer dreysachen Reihe Körnchen besetzt, am ziegelförmiggestellten scharfen hervorstehenden Unterrande gekerbt. Der Grund ist flach, und der Quere nach gestreift. Flagggrün mit brannen, oder gelben Flecken; unter der Rinde mit einem silberartigen Glanz.

K. II. 2. Trochus vestiarius.

K. II. 2. Das Wulstknöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 594.

Belg. Bultslakja. Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testa



Testa conico orbiculata laevi,  
columellae basi callosa.

Die plattkegelförmige schalenrunde Schale hat am Boden der Spindel einen erhabenen Wulst.

$\alpha$  rubella, cingulo albo.

$\alpha$  rötlich, mit einem weißen Gürtel.

$\beta$  cinerea, cingulo albo fuscoque.

$\beta$  aschengrau, mit einem weiß und braun gefleckten Gürtel.

$\gamma$  alba, radiis obliquis griseis.

$\gamma$  weiß, mit schiefen hellgrauen Strahlen.

$\delta$  plumbea, cingulo albo reticulato.

$\delta$  bleifarbig, mit einem weiß gefleckten Gürtel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.

Petiv. Gaz. t. II. f. 6.

Gualt. Test. t. 65. f. E. F. G.

Gev. Belust. 19. t. 189. f.

Knor. Vergn. VI. 22. t. 7. f.

K. II. 3. Trochus Labio.

K. II. 3. Die Dicklippe.

Linn. S. N. Sp. 595.

Belg. Dicklip. Angl. Thick-lip Top. Petiv.



Testa imperforata, ouata, striato tuberculata, apertura dentata, incrassata; columella unidentata.

Die undurchbohrte eiförmige mit Streifen und Knotten besetzte Schale hat eine gezähnte dicke Lippe, und an der Spindel einen Zahn.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 8. f. 25. 26.

*Rumph. amb. t.* 21. f. E.

*Petiv. amb. t.* 12. f. 1.

*Gev. Belust.* 18. r. 165. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 4. *Trochus turbinatus*.

K. II. 4. Der türkische Bund.

*Belg.* Tulbande.

Testa ouata, laevis, anfractibus convexis, columella unidentata, imperforata.

Die eiförmige Schale hat erhabene Gewinde, mit einem Zahne an der undurchbohrten Spindel.

α alba, maculis oblongis nigris.

α weiß, mit länglichen schwarzen Flecken.

β alba, venulis cingulisque articulatis nigris.

β weiß, mit schwarzen Adern, und gegliederten Gürteln.

γ alba, venulis, cingulisque articulatis purpureis.

γ weiß, mit purpurrothen Adern, und gegliederten Gürteln.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 33. 34. 35.*

*Gualt. Test. t. 63. f. D. E. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. N.*

*Gev. Belust. 20. t. 197. 198. 200. 201. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 6. 7. f.*

Testa ovata, Anfractus sex, con-  
uexi, laeues contigui. Apertura  
lunata, laevis. Columellae labium  
unidentatum.

Die Schale ist eiförmig. Die  
sechs Gewinde sind erhaben, glatt,  
und aneinander verwachsen. Die  
Mündung mondförmig, und glatt.  
Die Spindelstelle mit einem Zahne  
versehen.

K. II. 5. Trochus Tu-  
ber.

K. II. 5. Der Knottenz-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 596.*

Testa imperforata conica,  
anfractibus subcarinatis utro-  
que margine nodosis.

Die Gewinde der undurch-  
bohrten kegelförmigen Schale  
sind einigermaßen kiel förmig,  
und an jedem Rande knottig.

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. R. ?*

*Gev. Belust. 19 t. 179 f.*

*Regenf. Samml. 3. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 2. f.*



K. II. 6. Trochus Co-  
nulus.

K. II. 6. Der Schnur-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 598.*

Testa imperforata conica  
striata; anfractibus linea ele-  
vata interstinclis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige gestreifte Schale hat  
die Gewinde durch eine erha-  
bene Querlinie abgesondert.

*List. angl. t. 3. f. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 91. 99.*

*Gualt. Test. t. 61. f. M.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 36.*

*Gev. Belust. 9. t. 69, 70. f.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 5. f.*

K. II. 7. Trochus Zy-  
ziphinus.

K. II. 7. Der Zuzubenz-  
kräusel.

*Linn. S. N. Sp. 599.*

Testa imperforata, conica,  
laevi, anfractibus marginatis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige glatte Schale hat ein-  
gesäumte Windungen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 93.*

*Rumph. amb. t. 21. f. I.*



Gualt. Test. t. 91. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.

Knor. Vergn. III. 14. t. 2. 3. f.

K. II. 8. Trochus grā-  
nulus.

K. II. 8. Der gekörnte  
Kräusel.

Testa imperforata, conica,  
striis transversis tenuissimis, &  
granulatis, alternatim majo-  
ribus; suturis emarginatis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige Schale ist der Quere nach  
mit dünnen, und fein gekörn-  
ten Streifen von abwechseln-  
der Größe umgürtet, und an  
den Näthen eingesäumt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, ventricosa. An-  
fractus circiter decem, transversim  
striati; striis alternatim majoribus,  
& granulis moniliformi serie cin-  
ctis, supra prope suturam linea ele-  
vata marginatis. Basis convexius-  
cula, striis majoribus rufo articu-  
latis. Color griseus, faux marga-  
ritacea.

Die Schale ist kegelförmig häu-  
sig. Die Gewinde, deren unge-  
fähr zehn, sind in die Quere ge-  
streift; die Streifen wechselweise  
größer, mit Perlenketten umge-  
ben, oben an den Näthen mit et-  
ner erhabenen Linie eingesäumt.  
Der Boden ist etwas häuchig, an  
welchem die größten Streifen roth-  
braun gegliedert sind. Von hell-  
grauer Farbe, mit einem perlen-  
mutterartigen Schlunde.

K. II. 9. Turbo croca-  
tus.

K. II. 9. Der Safran-  
Kräusel.

= Trochus see last page errata



Testa imperforata conica, Die undurchbohrte Kegelför-  
laevi, futura sulcata, anfrac- mige Schale hat eine gefurch-  
tibus conuexis, spira crocea. te Nath, gewölbte Windun-  
gen, mit einem safranrothen  
Schnirkel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, laevis. Anfractus  
circiter quinque conuexi, sulco su-  
turali interstincti. Basis conuexa.  
Columella angulata, replicata, te-  
gens foramen obsoletum. Color  
basis, & epidermidis nitens albus,  
spirae sub epidermide croceus.

Die Schale ist Kegelförmig, und  
glatt. Ungefähr fünf erhabene  
Gewinde, die an der Nath mit ei-  
ner Furche von einander abgezo-  
gen sind. Der Grund ist bäuchig.  
Die eckige, übergeschlagene Spin-  
del deckt ein undeutliches Nabel-  
loch. Der ganze Grund und die  
Oberhaut ist glänzend weiß, der  
Schnirkel unter der Oberhaut sa-  
franroth.

K. III. Turriti, columella exserta,

K. III. Gethürmte, mit hervor-  
ragender Spindellese.

K. III. I. Trochus Te-  
lescopicum.

K. III. I. Die See-  
tonne.

*Linn. S. N. Sp. 600.*

*Belg. Zeeton. Rumph. Angl. Indian Whirligig. Petiv. Gall. Le Te-  
lescope. Dav.*

Testa imperforata turrita, Die undurchbohrte gethürm-  
striata, columella exserta spi- te und gestreifte Schale hat ei-  
rali. ne hervorragende gewundene  
Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 92.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 10.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 21 f. 12.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 50. f. 1 — 12.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 2. 3. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 9.*

K. III. 2. Trochus do-  
labratus.

K. III. 2. Die Schiffs-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 601.*

*Belg. Vlaggetje.*

Testa umbilicata turrata,  
glabra; columella exserta, re-  
curvata, triplicata.

Die genabelte gethürmte glat-  
te Schale hat eine hervorras-  
gende gedrehte, mit drey Fal-  
ten versehene Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 29. t. 2. f.*

L. Turbo.

L. Die Mondschnecke.

Testa spiralis, apertu-  
ra coarctata, rotunda, in-  
tegra.

Die schnirkelförmig ge-  
mundene Schale hat eine  
eingefasste, runde, ganz-  
randige Mündung.



L. I. Imperforati, columella plana.

L. I. Undurchbohrte mit einer flachen Spindel.

L. I. 1. Turbo litoraeus.

L. I. 1. Die Strandschnecke.

Linn. S. N. Sp. 607.

Belg. Aliëkruiken. Angl. Couvin. Gall. Bigourneau.

Testa subovata transuersim fasciata, columella plana.

Die etwas eiförmige Schale ist der Quere nach mit Bändern umgeben, und mit einer flachen Spindel versehen.

List. angl. t. 3. f. 9.

— Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 43.

Gualt. Test. t. 45. f. G.

Mus. Caes. Vindobon.

L. I. 2. Turbo muricatus.

L. I. 2. Die Keißbrenschnecke.

Linn. S. N. Sp. 608.

Testa umbilicata, subovata, cincta punctis eminentibus transuersim digestis, columella obtusa.

Die genabelte, etwas eiförmige Schale ist in die Quere mit erhabenen reihenweisen Körnern besetzt, und mit einer stumpfen Spindel versehen.

Gualt.



Gualt. Test. 1. 45. f. F.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. Imperforati, solidi.

L. II. Undurchbohrte dickschalige.

L. II. 1. Turbo Pullus.

L. II. 1. Die Vock-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 610.

Belg. Bokje.

Testa imperforata ovata, lae-  
vi; apertura antice angulata.

Die undurchbohrte, eiför-  
mige glatte Schale hat eine  
vorne eckige Mündung.

Picta maculis, fasciisque purpu-  
reis & albidis.

Mit weißlichen, und purpurro-  
then Flecken, und Bändern bema-  
let.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 2. Turbo Petho-  
atus.

L. II. 2. Der Nassauer.

Linn. S. N. Sp. 612.

Belg. Petool-Horn. Angl. Nassaw-Shell. Petiv. Gall. La Nassavienne.  
Argenv.

Testa imperforata ovata, lae-  
vi, anfractibus versus futuram  
obtusè carinatis.

Die undurchbohrte eiförmi-  
ge glatte Schale ist auf den  
Gewinden gegen die Naht mit  
einer stumpfen Querkiele um-  
geben.

List.



*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 5. f. 39.

*Rumph. amb. t.* 19. f. D. 5. 6. 7.

*Petiv. amb. t.* 7. f. 15.

*Argenv. Conch. Pl.* 6. f. K.

*Seb. Thes.* III. t. 74. f. 23 — 29.

*Klein. Meth. Ostr.* t. 2. f. 51.

*Gev. Belust.* 21. t. 205 — 208 f.

*Regenf. Samml.* I. 8. t. 18. f. 9. t. 27 f.

*Knor. Vergn.* I. 3. t. 3. f.

—— — II. 22. t. 1. 2. f.

—— — III. 3. t. 3. f.; 23 t. 4. f. 28 t. 2. 51

—— *Del. nat.* I. t. B. III. f. 7.

L. II. 3. Turbo Coch- L. II. 3. Der grün  
lus. Silbermund.

*Linn. S. N. Sp.* 613.

*Belg.* Zilvermond. *Angl.* Silver - Mouth Shell. *Gall.* Bouche d'Argent. *Argenv.*

*Testa* imperforata, ouata, Die undurchbohrte eiförmig-  
transuersim obsolete sulcata, ge Schale ist mit manen Quer-  
cingulo unico dorsali crassiore. furchen umgeben, deren eine  
auf den Rücken dicker als die  
andern ist.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 5 f. 29.

*Rumph. amb. t.* 19. f. 4.

*Petiv. amb. t.* 9. f. 14.

*Argenv.*



- Argenv. Conch. Pl. 6. f. 7.*  
*Seb. Thes. III. t. 74. f. 20, 21.*  
*Gev. Belust. 20 t. 9. f.*  
*Regenf. Samml. I. 1. t. 12. f.*  
*Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.*  
 ——— *Del. nat. I. t. B. III. f. 6.*

L. II. 4. Turbo Chry- L. II. 4. Der Gold-  
ostomus. mund.

*Linn. S. N. Sp. 614.*

*Belg. Goud - Mond. Rumph. Angl. The golden mout'd Snail. Hill*  
*all. Bouche d'or. Dav.*

Testa imperforata subouata Die undurchbohrte etwas en-  
 ugosa, anfractibus spinarum förmige runzelichte Schale hat  
 ornicatarum serie duplici cin- auf den Gewinden mit einer  
 ais. doppelten Reihe hohler Sta-  
 cheln besetzt.

*Rumph. amb. t. 19. f. E.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 62 f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. D.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 126.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 9 — 11.*

*Hill.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Gev. Belust. 18. t. 171. f.

Knor. Vergn. II. 14. t. 2. f.

— — V. 13. t. 3. f.

L. II. 5. Turbo Testum persicum.

L. II. 5. Das chinesische Dach.

Linn. S. N. Sp. 615.

Angl. The prickly Trochus Hill. Gall. Le toit chinois.

Testa imperforata, ovata spinis obtusis depressis, subtus papillosa.

Die undurchbohrte eiförmige Schale ist unten mit Wärtchen, oben mit stumpfen nidergedruckten Dörnern besetzt

Argens. Conch. Pl. 8. f. P.

Hill. Hist. of Anim. Pl. 7.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 6. Turbo Pagodus.

L. II. 6. Die Pagodenschnecke.

Linn. S. N. Sp. 616.

Belg.



Belg. Langleevende Tol. Rumph. Angl. Great Nestors Top. Petiv. Gall. La Pagode. Dav.

Testa imperforata, conica, Die undurchbohrte Kegelför-  
 minis obtulis concatenatis, sub- mige untenher warzige und ge-  
 ns papillosa, striata. streifte Schale ist mit auf den  
 Gewinden mit aneinander schlies-  
 sende stumpfen Dörnern be-  
 setzt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 36.

Rumph. amb. t. 21. f. D.

Petiv. amb. t. 10. f. 8.

Gualt. Test. t. 22. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. A.

Gev. Belust. 8. t. 62. f.

Knor. Vergn. I. 25. t. 3. 4. f.

L. II. 7. Turbo Calcar. L. II. 7. Der Sporn.

Linn. S. N. Sp. 617.

Belg. De Spoor. Rumph. Angl. Spur - Shell Pet. Gall. L' Eperon.  
 Dav.

Testa subimperforata de- Die eigermassen undurchbohr-  
 pressa, anfractibus scabris su- te niedergedrückte Schale ist  
 pra spinis fornicato compressis. auf den Gewinden rau, und  
 oben mit blattgedrückten hohlen  
 Dörnern umgeben.

List.



List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 46.

Rumph amb. t. 20. f. 7.

Petiv. amb. t. 9. f. 13.

Argenv. Conch. Pl. 6. f. R.

Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 128.

Gev. Belust. 8. t. 60. f.

Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.

L. II. 8. Turbo rugo-  
sus.

L. II. 8. Der Runzel-  
bund.

Linn. S. N. Sp. 618.

Belg. Gerimpelde Tulband.

Testa imperforata subovata, Die undurchbohrte einiger  
striata, anfractibus superne maßen ensförmige gestreifte Scha-  
rugosis. le hat am obern Umfange der  
Gewinde mit Knotten besetzt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 12.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 41.

Gualt. Test. t. 63. f. C. F. H.

Seb. Thes. III. t. 74. f. 13. 14.

Gev. Belust. 15. t. 136. f.

Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.



L. II. 9. Turbo mar-  
noratus.

L. II. 9. Die Schlan-  
genhaut.

*Linn.* S. N. Sp. 619.

*Belg.* Slangen - Velle - Hoorn. *Angl.* The green Giants Ear. *Gall.* L'oreille de geant.

Testa imperforata subovata Die undurchbohrte etwas  
aeui, anfractibus trifariam eyförmige glatte Schale ist am  
marginato nodosis, columella Rande der Gewinde mit einer  
ubrostrata explanata. dreyfachen Reihe Knotten um-  
geben, und an der Spindel  
einigermassen in einen Rüssel  
verlängert, und flachgedrückt.

*List.* Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 46.

*Rumph.* amb. t. 19. f. A. B.

*Gualt.* Test. t. 64. f. A.

*Seb.* Thes. III. t. 74. f. I. 2.

*Klein.* Meth. Ostr. t. 7. f. 124.

*Gev.* Belust. 13. t. 128 — 131 f.

*Regenf.* Samml. I. 5. t. 52. f.

*Knor.* Vergn. III. 26. t. I f.; 27. t. II. f.

L. II. 10. Turbo sar-  
maticus,

L. II. 10. Der Del-  
frug.



Linn. S. N. Sp. 620.

Belg. Bont Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le burgau. Dav.

Testa imperforata, conuexo Die undurchbohrte erhabene  
nodosa obtula, anfractibus su- runde stumpfe Schale hat  
pra nodolis, canali interitinctis. oben knottige Gewinde, die  
durch eine Rinne von einander  
abgesondert stehen.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. B.

Gev. Belust. 7. t. 52 f.

Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.

L. II. 11. Turbo galea-  
tus.

L. II. 11. Die Sturm-  
haubenartige Muschelschnecke.

Testa turbinata transuersim Die birnförmige Schale ist  
sulcata, anfractibus oblique in die Quere gefurchet, aus  
angulatis, labio unidentato. den Gewinden mit schiefer  
Ecken, und an der Spindel-  
leste mit einem Zähnchen be-  
setzet.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 51.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa turbinata solida. Anfra- Die Schale ist dicht und birn-  
ctus quatuor, transuersim fulcati, förmig. Die vier Gewinde sind der  
prope marginem externum angulis Quere nach gefurchet, am äußern  
obliquis, obtusis. Apertura luna- Rande mit schiefen, stumpfen Ecken  
ta. Labrum integrum acutum. versehen. Die Mündung mond-  
Columella subumbilicaria. Labium förmig. Die Schalenleste ganzran-  
reflexum plica, seu denticulo acu- dig, und scharf. Die Spindel et-  
to notatum. Color albus, punctis nigermaßen durchbohret. Die Spin-  
dispersis rufis. delleste übergeschlagen, und mit et-  
ner spitzigen zahnförmigen Kante  
besetzt. Von weißer Farbe mit  
zerstreuten rothbraunen Punkten.

L. II. 12.



L. II. 12. Turbo tro-  
chiformis.

L. II. 12. Die Träus-  
selartige Mondschnecke.

Gall. La fripiere. Dav.

Testa imperforata conuexo  
conica, anfractibus plicato-  
rugosis, basi plano concaua,  
apertura falcata.

Die undurchbohrte, runder-  
habene kegelförmige Schale ist  
auf den Windungen mit Run-  
zeln und Falten besetzt, am  
Grunde flach und hohl, mit ei-  
ner sichelförmigen Mündung.

Knor. Vergn. III. 29. t. 1. 2. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conuexo conica, tenera,  
subpellucida. Anfractus decliues  
imbricati, plicato rugosi. Basis  
plano concaua. Labrum integerrimum,  
falcatum. Columnella sub-  
horizontalis, reflexa, imperforata.  
Color albus, radiis obliquis curua-  
tis luteis.

Die Schale ist runderhaben ke-  
gelförmig, dünn, und halb durch-  
sichtig. Die kegelförmig abhängi-  
gen Gewinde sind mit Runzeln und  
Falten besetzt. Der Grund ist flach  
und hohl. Die Schalenleiste ganz  
randig und sichelförmig. Die Spin-  
del beinahe wagrecht, ohne Nabel.  
Von weißer Farbe, mit krummen  
gelben Querspäßen.

Vestigiata, testis alienis infidenti-  
bus.

Sie hat Eindrücke von fremden auf-  
stehenden Schalen.

L. II. 13. Turbo heli-  
cinus.

L. II. 13. Die Schnit-  
felmondschnecke.



Testa rotundata glabra, anfractibus conuexis, columella incrassata, subimperfiorata.

Die rundliche glatte Schale hat gewölbte Windungen, eine verdickte Spindel, mit einem unvollkommenen Nabel.

*Knor. Vergn. V. 3. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, solida. Anfractus sex conuexi, laeues, contigui. Apertura ouata. Columella incrassata, replicata; Umbilicus obsoletus, tectus. Color epidermidis ex purpureo viridescens, faucis argenteo margaritaceus.

Die Schale ist rundlich und dicht. Die sechs Gewinde sind erhaben, glatt, und berühren einander. Die Spindel ist verdickt, übergeschlagen, mit einem gedeckten unvollkommenen Nabelloche. Die Oberhaut ist purpurfarbig und grünlich, der Schlund mit einem silbernen Perlenmutterglanz.

L. III. Solidi, perforati.

L. III. Dichte, durchbohrte.

L. III. I. Turbo cinereus.

L. III. I. Die aschengraue Mondschnecke.

Testa rotundata, laeui, anfractibus conuexis, columellae basi elongata, fauce sulcata, umbilico lato.

Die rundliche glatte Schale hat erhabene Gewinde, einen gefurchten Schlund mit einem breiten Nabelloche.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa rotundata, laevis. Anfractus sex convexi, prope suturam complanati, & obsolete transuersim striati. Apertura semicircularis. Columellae basis elongata, diducta. Umbilicus profundus. Color cinereus, maculis & lineis albis nigrisque,

Die Schale ist rundlich und glatt. Die sechs Gewinde sind bühig, nächst der Nath plattgedrückt, mit unvollkommenen Querstreifen. Die Mündung ist halbrund. Der Grund der Spindel ist verlängert, und ausgebreitet. Der Nabel tief. Von aschengrauer Farbe mit weissen und schwarzen Flecken und Strichen.

L. III. 2. Turbo nodulosus.

L. III. 3. Die knottige Mondschnecke.

Testa conico rotundata, anfractibus noduloso striatis, denticulo umbilicali.

Die runderhabene kegelförmige Schale ist an den Gewinden mit Knotten und Streifen besetzt, und an dem Nabelloche mit einem Zähnchen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima sequenti, sed transuersim striata, nodisque obliquis obsita. Color niger, maculis dispersis niueis.

Die Schale ist der folgenden am ähnlichsten, nur ist sie mit schiefen Knotten und Streifen besetzt. Von schwarzer Farbe mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

L. III. 3. Turbo Pica.

L. III. 3. Die Elster.



*Linn. S. N. Sp. 622.*

*Belg. Soldat. Angl. Magpye Top - Shell. Pet. Gall. La Pic. Dav.*

Testa umbilicata, conico ro- Die genabelte runderhabene  
tundata, lacui, denticulo um- kegelförmige glatte Schale ist  
bilicali. am Nabelloche mit einem Zäh-  
nen versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 29. 30.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 70. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 21. f. A.*

*Gualt. Test. t. 68. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 8. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 12. f. 7.*

*Gev. Belust. t. 10 f. 74 — 77.*

—— — II. t. 78 — 80. f.

*Regenf. Samml. I. 6. t. 66. f.; II t. 57 f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. I. f.*

—— — II. 21. t. 3. f.

L. III. 4. Turbo Argy-  
rostomus.

L. III. 4. Der geribbte  
Silbermund.

*Linn. S. N. Sp. 624.*

*Belg. Geplekte Zilver - Mond. Angl. The spotted Silvermouth. Gall*  
*La bouche d'argent bariolée, Argenv.*

Testa



Testa umbilicata, subouata, transuersim cingulata, longitudinaliter striata.

Die genabelte erdfraße Schale ist in die Quere gegürtet, und der Länge nach gestreift.

Alba, fasciis longitudinalibus fuscis.

Weiß, mit nach der Länge herablaufenden Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 19. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 64. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 74. 4. 6.*

*Gev. Belust. 16. t. 153. 154. f.*

*Régenf. Samml. I. 10. t. 43. f.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 5. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 12.*

L. III. 5. Turbo margaritaceus.

L. III. 5. Der bunte Silbermund.

*Linn. S. N. Sp. 625.*

*Belg. Bonte Zilver - Mond.*



Testa umbilicata subouata Die genabelte, einigermaßen  
cingulis eleuatis, intercostali- en förmige Schale hat erhabene  
bus laeuibus. zwischen den Furchen liegende  
Bürteln.

Alba maculis viridescentibus fus- Weiß, mit grünlichen und braun-  
cisque. nen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 11.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 3.*

*Gev. Belust. 17. t. 155 — 158. f.*

L. III. 6. Turbo Del-  
phinus.

L. III. 6. Der gezackte  
Dolphin.

*Linn. S. N. Sp. 626.*

*Belg. Getackte Dolphyn. Angl. The echinated Snail, Petiv. Gall.  
le Dauphin. Dav.*

Testa umbilicato hispida, Die Schale hat einen gez-  
anfractuum spinis ramosis. ackten Nabel, und mit ästis-  
gen Stacheln besetzte Gewinde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 31.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 45.*

*Rumph. amb. t. 20. f. H.*



*Petiv. amb. t. 3. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 68. f. C.*

*Gev. Belust. 4. t. 26 — 28. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 15 — 27.*

*Knor. Vergn. I. 22. t. 4. 5. f.*

L. III. 7. Turbo distortus.

L. III. 7. Der geribbte Delfphin.

*Linn. S. N. Sp. 627.*

Testa umbilicata, submucronata, spinis indivisis.

Die genabelte und gezackte Schale ist an den Gewinden mit ungetheilten Stacheln besetzt.

*Gualt. Test. t. 68. f. D.*

*Gev. Belust. 4 t. 24 f.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1 — 6.*

*Knor. Vergn. IV. 7. t. 2. 3. f. ; 8. t. 1. f.*

L. III. 8. Turbo carinatus.

L. III. 8. Die gekielte Mondschnecke.



Testa rotundata, anfractibus carinatis, umbilico spirali profundo.

Die rundliche Schale ist an den Gewinden mit Kielen umgeben, und mit einem tiefen schnirkelförmigen Nabel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, pyramidata, tenera, subpellucida. Anfractus quinque teretes, cincti carinis lamellois tribus sex, supremis tenuioribus. Apertura orbicularis. Umbilicus verticalis, spiralis, latus. Color albus.

Die Schale ist rund, pyramidenförmig, dünn und halbdurchsichtig. Die fünf Gewinde sind erhaben rund, mit drey bis sechs blätterichten Kielen, davon die obersten dünner sind, umgeben. Die Mündung ist rund. Der breite schnirkelförmige Nabel steht senkrecht. Von weißer Farbe.

L. IV. Cancellati.

L. IV. Segitterte.

L. IV. 1. Turbo scalaris.

L. IV. 1. Die achte Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 630.*

*Belg. Wenteltrap. Angl. Royal Stair - Case. Pet. Gall. La vraie Scallata. Dav.*

Testa umbilicata, ventricoso conica, anfractibus distantibus, fasciis longitudinalibus membranaceis intertextis.

Die genabelte bäuchige kegelförmige Schale hat entfernte Gewinde, die mit nach der Länge herablaufenden häutigen Klammern verwachsen sind.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 49. f. A.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 10. f. ZZ.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. V.*

*Knor. Vergn. IV. 20. t. 2. 3. f.*

—— ——— *V. 23. t. 1. f.; 24. t. 6. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1428. 1431. f.*

—— ——— ——— *153. t. 1432. 1433. f.*

L. IV. 2. Turbo Cla-  
thrus.

L. IV. 2. Die gemei-  
ne Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 631.*

*Belg. Wentel-Trapje. Angl. Smaal Stair-Case. Petiv. Gall. La fausse escalata. Dav.*

Testa exumbilicata turrita, Die thurmformige Schale  
anfractibus contiguis, fasciis hat von einander entfernte Ge-  
longitudinalibus membrana- winde, und häutige nach der  
ccis. Länge laufende Klammern,  
ohne Nabelloch.

α niuea, unicolor.

α schneeweiß, einfarbig.

β niuea, maculis dispersis pur-  
pureis.

β schneeweiß, mit zerstreuten  
purpurrothen Flecken.

γ grisea, clathris niueis.

γ lichtgrau, mit schneeweißen  
Klammern.

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. III.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 51.*

*Gualt. Test. t. 58. f. H.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 66.*

*Ginan. adr. II. t. 6. f. 54.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 5. f.*

—— ——— IV. 20. t. 4 — 6. f.

*Mart. Kouch. Kab. IV. 157. t. 1484 f.*

L. IV. 3. Turbo Uua. L. IV. 3. Das Bienenkörbchen.

*Linn. S. N. Sp. 636.*

*Belg. Gebakerde Kindje. Gall. Enfant au maillot. Dav.*

Testa umbilicata, ouata, anfractibus contiguis, plicis longitudinalibus, columella uniplicata.

Die genabelte eysförmige Schale hat aneinander genäher- te Windungen, mit nach der Länge laufenden Falten, und einer Falte an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 140.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5 f. 47.*



*Petiv. Gaz. t. 27. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 58. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 153. t. 1439. f.*

L. IV. 4. Turbo Lin-  
cina.

L. IV. 4. Der Breit-  
rand.

*Linn. S. N. Sp. 639.*

Testa umbilicata oblonga,  
anfractibus decussatim striatis,  
aperturae limbo dilatato.

Die genabelte längliche  
Schale hat gleichbreite kreuz-  
weise gestreifte Windungen,  
mit einem erweiterten Mün-  
dungsrande.

*Petiv. Gaz. t. 118. f. 11.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 71.*

*Berlin. Mag. IV. 3. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. Turriti.

L. V. Gethürmte.

L. V. 1. Turbo imbri-  
catus.

L. V. 1. Die bunte  
Schraube.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 640.*

Testa turrita, anfractibus  
deorsum imbricatis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale sind niederwärts  
ziegelförmig gefalten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 61.*

*Gualt. Test. t. 58. f. E.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 34.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1422. f.*

L. V. 2. Turbo acut-  
angulus.

*Linn. S. N. Sp. 642.*

L. V. 2. Die Scharf-  
ribbe.

Testa turrita, anfractuum ca-  
rina unica majore, acuta.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben einen grö-  
ßeren und scharfschneidiger  
Querkiel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 117.*

*Gualt. Test. t. 58. f. B.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 67. t. 742. 743. f.*

L. V. 3. Turbo dupli-  
catus,

L. V. 3. Die Doppel-  
ribbe.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 643.*

Testa turrita , anfractuuum  
carinis duabus acutis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben zween scharfe  
Querfiele.

*List. angl. t. 3. f. 7.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 114.*

*Gualt. Test. t. 58. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 7. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 4. Turbo exole-  
tus.

L. V. 4. Die alte  
Schraube.

*Linn. S. N. Sp. 644.*

Testa turrita , anfractibus  
longitudinaliter rugosis, cari-  
nis duabus obtusis margina-  
libus.

Die Gewinde der gethürm-  
ten nach der Länge gerunzelten  
Schale haben zween stumpfe  
am Rande stehende Querfiele.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 53.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 113.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 5.



L. V. 5. Turbo torcularis.

L. V. 5. Die gestreifte Trommelschraube.

Testa turrita, anfractibus transuersim striatis, carinis duabus obtusis submarginalibus.

Die Gewinde der gethürmten Schale sind in die Quere gestreift, und mit zween stumpfen vom Rande etwas entfernten Querkieleu umgeben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter duodeni transuersim striati, carinis cincti duabus distantibus, obtusis, margini cuius propinguis. Apertura allinium. Color albus, maculis longitudinalibus undulatis fuscis.

Die Schale ist gethürmt. Die Gewinde deren ungefähr zwölf, sind der Quere nach gestreift, und mit zween stumpfen Querkieleu umgeben, die nicht weit von jedem Rande entfernt stehen. Die Mündung ist wie an den anverwandten Arten. Die Farbe weiß mit wellenförmigen nach der Länge laufenden Flecken.

L. V. 6. Turbo Terebra.

L. V. 6. Die Trommelschraube.

*Linn. S. N. Sp. 645.*

*Belg. Trommel-Schroef.*

Testa turrita, anfractuum carinis sex, acutis.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben sechs scharfe Querkiele.

*Bo.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 115.*

*Rumph. amb. t. 30. f. M.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 58. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 40.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1425. f.*

L. V. 7. Turbo bidens. L. V. 7. Die gefleckte  
Zahnschraube.

*Linn. S. N. Sp. 649.*

Testa turrita, pellucida, Die gethürmte durchsichtige  
anfractibus contrariis, prope Schale hat linksgewundene  
futuram maculatis, apertura an der Muth gefleckte Windun-  
postice bidentata. gen, und hinten an der Mü-  
dung zween Zähnen.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 39.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 41.*

*Gualt. Test. t. 4. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 20.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 2.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 4. f.*



L. V. 8. Turbo quin-  
quedentatus.

L. V. 8. Die fünfzäh-  
nige Schraube.

Testa turrita subpellucida,  
labio tridentato, labro bipli-  
cato.

Die gethürmte halbdurchsich-  
tige Schale hat an der Spin-  
dellefze drey, an der Schalen-  
lefze zwei Falten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Simillima praecedenti. Testa cy-  
lindraceo turrita. Anfractus duo-  
decim. Columella subumbilicata.  
Labium plicis membranaceis tri-  
bus; labrum binis. Color albidus.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten, von gethürmter walzenförmiger Gestalt. Der Gewinde sind zwölf an der Zahl. Die Spindel ist einigermaßen genabelt. Die Spindellefze ist mit drey, die Schalenlefze mit zwei dünnen Falten besetzt. Von weißlicher Farbe.

L. V. 9. Turbo detri-  
tus.

L. V. 9. Die euförmige Schraube.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 300.*

Testa ovata, laevis, colu-  
mella subimperfectorata, aper-  
tura ovata.

Die Schale ist euförmig, und glatt; die Spindel einigermaßen durchbohret, die Mündung euförmig.



*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 2.*

*Gualt. Test. 1. 5 f. N.*

*Berlin. Magaz. III. 5. t. 53. f.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. I. f.*

## M. Cornu.

## M. Die Hornschnecke.

Testa elongato conica Die verlängerte kegelförmige gedrehte Schale  
volutata. Anfractus cylindrici distantes. Aper- hat walzenförmige frey-  
tura elabiata, imperfora- hende Gewinde, und eine  
ta. Mündung ohne Feszen und  
Nabelloch.

### M. 1. Cornu Copiae.

### M. 1. Das Füllhorn.

Testa conico turrita, anfra- Die kegelförmig gethürmte  
tibus duobus, apertura or- Schale hat zwey Gewinde,  
biculata. und eine ganz runde Mündung.

*Index Mus. Caes. Vindobon. I.*

*Mus. Caes. Vindobon,*



Testa unico turrata dextrorsum volutata. Anfractus duo continuati, teretes, distantes, infimo remotissimo. Apex obtusus. Apertura orbicularis latere interno patumper revoluta, sine columella, labio, & umbilico. Color lutescens, fasciis tribus longitudinalibus dorsa, fuscis. Hinc ab affine specie *Sebae* (\*) *Argenville* (\*\*) & vix non *Othon. Mülleri* (\*\*\*) distincta.

Die Schale ist kegelförmig und gehöhlet, nach der Rechten gedreht. Die zwei Gewinde sind unterbrochen, walzenförmig, und stehen von einander frey entsetzt, davon das letzte am weitesten absteht. Die Spitze ist stumpf. Die Mündung scheibenrund, an der inneren Seite etwas wenig auswärts übergeschlagen, ohne Spindel, Lefze, und Nabelloch. Von gelblicher Farbe, mit drey nach der Länge des Rückens laufenden schwarzbraunen Bändern. Dadurch unterscheidet sie sich als eine besondere Art von jener, welcher *Seba* (\*) und *Argenville* (\*\*) und vielleicht auch von der, welcher *Otho Müller* (\*\*\*) gedenket.

## N. Helix.

Testa spiralis, anfractibus contiguis, columella elabiata, apertura contractata.

## N. Die Schnirkelschnecke.

Die schnirkelförmige Schale hat verwachsene Gewinde, an der Spindel keine Lefze, und an der Mündung keinen Einschnitt.

(\*) *Thes. III. t. 40 f. 27.*

(\*\*) *Conch. II. Pl. 9. f. 2.*

(\*\*\*) *Hist. Verm. II. Sp. 313.*



N. I. Testa ancipiti,

N. I. Mit zweyschneidiger Schale.

N. I. 1. *Helix Scarabaeus*.

N. I. 1. Die Käferschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 655.**Belg. Toover Slak. Angl. River ragged Mouth. Pet. Gall. Gucule de Loup. Dav.*

Testa ouata, ancipiti; apertura dentata.

Die eysförmige zweyschneidige Schale hat eine gezähnte Mündung.

*Liszt. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 31. 32.**Bonan. Recr. cl. 3. f. 44. 385.**Petiv. Gaz. t. 4. f. 10.*

— amb. t. 12. f. 3.

*Rumph amb. t. 27. f. 7.**Gualt. Test. t. 4. f. 8.**Argenv. Conch. Pl. 9. f. T.**Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 23.**Berlin. Mag. III. 6. t. 67. f.**Knor. Vergn. VI. 19. t. 2. 3. f.*

N. II. Anfractibus carinatis.

N. II. Mit kleeformigen Gewinden.

N. II. 1. *Helix Lapicida*.

N. II. 1. Der Steinspücker.



*Linn. S. N. Sp. 656.*

*Belg. Steenbikker. Angl. Land Cheese Shell. Pet. Gall. Le Planorbe terrestre. Geof.*

Testa carinata, orbiculari, umbilicata, utrinque conuexa, apertura marginata, transuersali, ouata. Die gefielte Scheibenrunde genabelte Schale ist beiderseits runderhaben, mit einer eingesäumten, querliegenden, eysförmigen Mündung.

*List. angl. t. 2 f. 14.*

—— — *Hist. Conch. l. 1. f. 8. f. 68.*

*Petiv. Gaz. t. 92. f. 11.*

*Berlin. Magaz. II. 3. v. 15. f.*

*Slotterb. Act. belv. V. 3. t. 36 f.*

*Schroet. Erdk. 2. t. 23 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 2. *Helix algira.*

N. II. 2. Der Wachs-  
schirfel.

*Linn. S. N. Sp. 660.*

Testa subcarinata, complanata, anfractibus teretibus, supra reticulatim striatis, umbilico peruito. Die einigermaßen gefielte flache Schale hat runde Gewinde, die oben kreuzförmig gestreift sind, mit einem tiefen Nabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 3.



N. II. 3. *Helix Plano-*  
bis.

N. II. 3. Die Schel-  
lenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 662.*

Testa carinata, umbilicata,  
plana, supra concaua apertu-  
ra utrinque acuta.

Die gefielte, genabelte flas-  
che Schale, ist eben ausge-  
höhlet, und mit einer beider-  
seits scharfen Mündung verse-  
hen.

*List. angl. t. 2 f. 27.*

— *Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 24.*

*Petiv. Gaz. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 4. f. EE.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 8.*

*Gev. Belust. 4. t. 21. 23. f.*

*Berlin. Magaz. IV. 8. t. 18. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 4. *Helix margi-*  
nata.

N. II. 4. Der einge-  
säumte Kegelschnecken.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 241.*

Testa umbilicata, carinata,  
depresso conica, oblique stria-  
ta, apertura transuersa, tri-  
angulari.

Die genabelte und gefielte,  
flachkegelförmige Schale ist  
schief gestreift, und mit einer  
querliegenden dreyeckigen Mün-  
dung versehen.

A a 4

Al-



Alba, fasciis transuersis rufis.

Weiß, mit rothbraunen Quer-  
bändern,

*Mus, Caes. Vindobon,*

N. II. 5. *Helix plica-*  
*ta.*

N. II. 5. Der Falten-  
mund.

Testa umbilicata, carinata,  
depressoconica, subtus con-  
uexa gibba, apertura qua-  
drangulari, fauce plicata.

Die genabelte, gekielte, flach-  
kegelförmige Schale ist unten  
erhaben rund, und höckerig,  
und inner der viereckigen Mün-  
dung mit Falten besetzt.

*Knor. Vergn. VI. 26. t. 5. f.*

Testa depressio conica. Anfractus  
supra sex, subtus vnicus, gibbus,  
margine acute carinato. Umbili-  
cus centralis, spiralis, peruius.  
Apertura quadrangularis, margine  
reflexo. Faux prope columellam  
plicata transuersa solitaria elonga-  
ta, prope labrum plicis duabus  
marginalibus acutis. Color rufus.

Die Schale ist flachkegelförmig  
Oben stehen sechs Gewinde, unter  
ein höckeriges, welches mit einer  
scharfen Kiele umgeben ist. Die  
schneckenförmige, tiefe Nabel durch-  
dringt die Mitte. Die Mündung  
viereckig, und eingesäumt. Inner-  
derselben steht an der Spindel ein  
einzelne verlängerte Querspalte, an  
Rande der Schalenfalten aber zwei  
Von brauner Farbe.

N. II. 6. *Helix obuer-*  
*sa.*

N. II. 6. Der Flach-  
wirbel.

Testa



Testa imperforata turbinata,  
anfractibus supra planis, mar-  
ginato carinatis, columella  
imperforata.

Die Gewinde der zusammen-  
gedrückten birnförmigen Scha-  
le, sind oben flach, und an  
der Kiele gerändert, die Spin-  
del undurchbohret.

*Gualt. Test. t. 68. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turbinata subtus convexa,  
supra plana, plicis transversis, &  
obliquis undique decussata. An-  
fractus quinque, supra plani, lim-  
bo carina marginata cincti. Aper-  
tura transversa, subtus arcuata Co-  
lumbellae labrum tenuissimum, re-  
plicatum, imperforatum. Color  
albus.

Die Schale ist einigermaßen birn-  
förmig, unten erhabenrund, oben  
flach, mit schief und querlaufen-  
den Rungeln besetzt. Die fünf Ge-  
winde sind oben flach, mit einer  
eingesäumten Kiele umgeben. Die  
Mündung steht in die Quere, und  
ist unten gekrümmt. Die Spin-  
delleiste ist übergeschlagen, sehr dünn  
und undurchbohret. Von weißer  
Farbe.

N. II. 7. *Helix torna-*  
*ta.*

N. II. 7. Der gedrehte  
Regel.

Testa subimperforata, tro-  
chiformi, anfractibus imbri-  
catis, apertura triangulari.

Die kaum durchbohrte fräu-  
selförmige Schale hat ziegelför-  
mig übereinander liegende Ge-  
winde, und eine dreyeckige  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 61.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa trochiformis. Anfractus sex imbricatum declives, oblique substriati, infimo margine acuto transuerſim carinato, ſubtus conuexo. Apertura transuerſa, triangularis Labrum extroſum marginatum. Columella reflexa, obtegens foramen obſoletum, tenue. Color extus fuſcus, faucis niueus.

Die Schale iſt trichterförmig. 2 ſechs ziegelſörmig übereinanderſtehende Gewinde ſind ſchief geſtrichet, das untere iſt der Quere nach ſcharf gekielt, unten bündig erhaben. Die dreieckige Mündung ſteht in die Quere. Die Schalenſchnecke iſt auswärts gekümmert. Die übergeſchlagene Spindelſchnecke bedeckt ein unvollkommenes dünnes Nabelſchnecken. Die Farbe iſt außen braun, d. Schlund ſchneeweiß.

N. II. 8. Helix ringens.

N. II. 8. Das verkehrte Mundſtück.

Linn. Sp. N. Sp. 664.

Testa subcarinata, imperforata, apertura reſupinata, utrinque dentata.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat ein aufwärts gekehrte beiderſeitig gezähnte Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 330. 331.

Liſt. Hiſt. Conch. l. I. f. 11. f. 100.

Argenv. Conch. Pl. 28. f. 13. 14.

Berlin. Mag. II. 4. t. 42. f.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 9. Helix ſinuata.

N. II. 9. Die ausgeſchnittene Schnirkelſchnecke.

Müll.



Müll. Hist. Verm. Sp. 217.

Testa subcarinata, imperforata, apertura transuersa, labro extus triplicato, intus quadridentato.	Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat eine querliegende Mündung, die an der Schalenleiste mit drey, an der Spindelleiste mit vier Zähnen besetzt ist.
---	--

List. Hist. Conch. l. I. f. 99.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 10. Helix Ca-  
ocolla.

N. II. 10. Die Bastard-  
lampe.

Linn. S. N. Sp. 665.

Gall, La Lampe antique. Argenv.

Testa carinata, imperforata, utrinque conuexa.	Die gekielte undurchbohrte Schale ist beiderseits erhaben, rund.
--	--

List. Hist. Conch. l. I. f. 10. f. 87.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 11.



N. II. 11. *Helix Cornu militare.*

N. II. 11. Der Kalkfalschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 666.*

Belg. Karkal.

Testa subcarinata, imperforata, conuexa, apertura patula, emarginata.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte runderhabene Schale hat eine erweiterte eingesäumte Mündung.

*Succa, suturis emarginatis,*

Schneeweiß, mit geränderten Gewinden.

*Gualt. Test. t. 3. f. 7.*

*Knor. Vergn. VI. 32. t. 2. f.*

N. II. 12. *Helix maculata.*

N. II. 12. Der gefleckte Schnirkel.

*- maculosa  
recessata und rose*

Testa perforata, subcarinata, depressa, oblique striata, subtus conuexa.

Die etwas gekielte und flache Schale ist schief gestreift, und unten runderhaben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa rotundata depressa, subtus inuexa. Anfractus sex, teretes, oblique striati, extus obsolete canati. Apertura lunata. Labrum arginatum. Columella perforata. Color albidus, maculis latis difforibus fulvis.

Die ründliche etwas flache Schale ist unten erhabenrund. Die sechs runde schief gestreifte Gewinde sind einigermassen gekielet. Die Mündung mondförmig. Die Schalenleſze gesäumt. Die Spindel durchbohret. Von weißer Farbe mit breiten unſörmigen rothgelben Flecken.

N. II. 13. *Helix punctata*.

N. II. 13. Der punktirte Zahnwirbel.

Testa subcarinata, rotundata, subperforata, labio incrassato sinuato, labro tridentato.

Die stumpffielige, ründliche, fast undurchbohrte Schale hat eine verdickte ausgeschnittene Spindelleſze, wie drey Zähnen an der Schalenleſze.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, subcompressa. Anfractus quinque conuexi, infimus carina obsoleta cinctus. Apertura transuersa, oblonga. Labri margo incrassatus, antice sinuatus. Labrum marginatum denticulis obtusis, marginalibus, tribus. Columella foramine tenui subobtectio. Color fuscus, cingulo dorsali tenui, punctisque circa futuram radiantibus luteis. Apertura rubescens.

Die ründliche, etwas zusammen gedrückte Schale hat fünf rund erhabene Gewinde, deren äußeres mit einem unvollkommenen Kiele umgeben ist. Die längliche Mündung steht in die Quere. Die Spindelleſze hat einen verdickten, vorne ausgeschnittenen Rand. Die Schalenleſze ist gesäumt und am Rande mit drey stumpfen Zähnen besetzt. Die Spindel hat ein dünnes beynahe gedecktes Nabelloch. Die Farbe braun, mit einer schmalen Querbände um den Rücken, und nach der Naht strahlförmig stehenden Punkten von hellgelber Farbe. Die Mündung ist röthlich.

N. III.



N. III. Umbilicatae, anfractibus  
rotundis.

N. III. Genabelle, mit rund  
Gewinden.

N. III. 1. Helix cor-  
nea.

N. III. 1. Das Wall-  
horn.

Linn. S. N. Sp. 671.

Belg. Europäische Post-hoorn. Angl. Great River Cheese - Shell  
Petiv. Gall. Le grande Planorbe. Geof.

Testa umbilicata plana, an-  
fractibus quatuor teretibus.

Die genabelte flache Sch-  
le hat vier runde Gewinde.

List. angl. t. 2. f. 26.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 40.

Petiv. Gaz. t. 92. f. 5.

Gualt. Test. t. 4. f. DD.

Geu. Belust. 3. t. 18. 19. f.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 17.

Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 8.

Ginan. adr. II. t. 2. f. 12.

Berlin. Mag. IV. 8. t. 17. f.

Knor. Vergn. V. 22. t. 6. f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 10.

N. III. 2. Helix poly-  
gyrata.

N. III. 2. Die Schnir-  
felscheibe.

Testa



Testa orbiculata, supra plana, Die schelbenförmige und  
 n, subtus concava, anfracti- unten hohle Schale bestehet  
 bs teretibus decem, aus zehn runden Gewinden,

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata. Supra plana, Die Schale ist schelbenförmig,  
 stus concava. Anfractus decem oben flach, unten hohl. Die zehn  
 tes. tenuissime oblique striati. runden Gewinde sind sehr fein  
 Aertura rotundaro oblonga. La- schief gestreift. Die Mündung ist  
 bim emarginatum. Color lutesc- länglicht rund. Die Schalenfuge  
 es, fascia transversa fulva. gesäumt. Von gelblicher Schale,  
 mit einer rothgelben Querbinde.

N. III. 3. *Helix Cornu* N. III. 3. Das Widder-  
 aetis. horn.

*Linn. S. N. Sp. 674.*

Belg. Rams-Hoorn. Angl. Great girdled Braile cheese Shell. Petiv.

Testa umbilicata, planius- Die genabelte, etwas flache  
 ulo, anfractibus teretibus Schale hat sechs runde Ge-  
 nis, apertura ovali. winde, und eine eyförmige  
 Mündung.

Nivea, fasciis transversis rufis.

Schneeweiß, mit braunrothen  
 Querbinden.

*List.*



*Petiv. Gaz. t. 92. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 14 — 15.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 7.*

*Gev. Belust. 3 t. 12. 13. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 4. 5. f.*

N. III. 4. *Helix ampul-  
lacea.*

*Linn. S. N. Sp. 676.*

N. III. 4. Die Schlammschnecke.

*Belg. Slyk-Slek. Angl. Smooth girdled Snail - Shell. Petiv.*

*Testa perforata, subglobosa, anfractibus teretibus, prope suturam complanatis; apertura oblonga.*

Die durchbohrte kugelförmige Schale hat runde an der Muth plattgedrückte Windungen, mit einer länglichten Mündung.

*Rumph. amb. t. 27. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 1. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 1 — 7. 53. 59.*

*Gev. Belust. 27. t. 289. 291. f.*

*Berlin. Mag. III. 6. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. V. 5. t. 2. f.*



N. III. 5. *Helix Poma-*  
a.

N. III. 5. Die gemeine  
Weinbergsschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 677.*

*Belg. Wyngards - Slak. Angl. Wine - Gard Snail. Gall. Le Vigne-*  
*on. Geof.*

Testa perforata subglobosa, Die durchbohrte einiger-  
asciis transuersis obsoletis, maßen kugelförmige Schael  
apertura rotundato lunata, hat undeutliche Querverbinden,  
mit einer rundlichen mondfor-  
migen Mündung.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.*

*List. angl. t. 2. f. 1.*

— *Hist. Conch. l. 1. f. 46.*

*Gualt. Test.-t. 1. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 1.*

— *Zoom. Pl. 9. f. 4.*

*Gev. Belust. 29. r. 330 — 342. f.*

*Berlin. Mag. II. 1. t. 1. f.*

*Schroet. Erdk. I. t. 10. f.*

N. III. 6. *Helix Po-*  
maria.

N. III. 6. Die linksge-  
wundene Weinbergsschnecke.



Müll. Hist. Verm. Sp. 244.

Testa perforata, subglobosa, sinistrosa, rufescente, fasciis transuersis obsoletis.

Die durchbohrte, einigermaßen kugelförmige, links gewundene Schale ist von braunlichter Farbe, mit matten Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 7. Helix cretaea.

N. III. 7. Die Kreidenschnecke.

Müll. Hist. Verm. (nemoralis) Sp. 157.

Testa perforata subglobosa, laeui, albida, fasciis transuersis fuscis.

Die durchbohrte einigermaßen kugelförmige glatte Schale ist von weißlicher Farbe mit braunen Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 8. Helix glauca.

N. III. 8. Das Ruhauge.

Linn. S. N. Sp. 678.

Testa umbilicata, subrotunda, acuminata; labro marginato, apertura ouali.

Die genabelte, rundlichte spizwirlige Schale hat an der eiförmigen Mündung eine gezäumte Schalenleiste.

Seb.



*Seb. Thes. III. t. 38. f. 8.*

*Gev. Belust. 3. t. 20. f.*

*Knor. Vergn. V. 5. t. 5. f.*

N. III. 9. *Helix citri-*

N. III. 9. Die Nabel-

schnecke.

*Linn. S. N. St. 679.*

*Belg. Navel - Slak.*

Testa perforata rotundata,  
ompressa, laeui, fascia transuer-  
diuerficolor.

Die durchbohrte rundlichte  
flachgedrückte glatte Schale ist  
mit einem gefärbten Bande um-  
geben.

subpellucida, pallide sulphurea,  
fasciis duabus opacis niueis, su-  
prema tenuiore.

\* halbdurchsichtig, blaßschwefelgelb  
mit zwey schneeweißen Bändern,  
davon das obere schmale riß.

*Gev. Belust. . 26. t 285. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

lactea, fascia dorsali rufa, niueae  
opacae superne contigua.

β schneeweiß mit einem rothbrau-  
nen Querbande, unter welchem  
nabe eine schneeweiße undurchsich-  
tige Binde lieget.

*Mus. Caes. Vindobon.*



♀ butyracea, spira apice & fascia γ butterfarbig, mit einer rothfarblen  
dorsali ferrugineis. Schnirkelspitze, und Querbande  
um den Rücken.

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 1 — 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♂ ferruginea, fascia dorsali alba. ♂ rothfarbig, mit einer weißer  
Querbinde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 57.*

*Gualt. Test. t. 3. f. E.*

*Gev. Belust. 26 t. 277 f.*

*Knor. Vergn. V. 22. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 10. Helix zona- N. III. 10. Die Gürtel-  
ria, schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 681.*

*Belg. Gebandeerde Post-hoorn. Gall. Corner de Possilon bandé.*



Testa-umbilicata, depressa, Die genabelte flache Schale  
 apertura transuersa, labro hat an der querliegenden Mün-  
 candido reflexo. dung eine weiße übergeschlagene  
 Schalenleiste.

α alba, undis niueis, fasciis trans- α weiß, mit schneeweißen Wellen,  
 uernis tribus rufis, infima latio- und drei rothbraunen Querbän-  
 re, den; davon die untere schmäler ist.

β alba, fasciis octo inaequalibus ru- β weiß, mit acht ungleich breiten  
 fis. rothbraunen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 72.*

*Gualt. Test. t. 3. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 52. 53. 55.*

*Knor. Verg. V. 21. t. 3. 4. f.*

N. III. 11. Helix Vol-  
 uulus.

N. III. 11. Das Wir-  
 belhorn.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 280.*

Testa trochiformi, umbilica- Die kräuselartige genabelte  
 ta, mucronata; apertura ro- spitzwirblige Schale hat an der  
 tunda, labro reflexo. runden Mündung eine überge-  
 schlagene Schalenleiste.

*Petiv. Gaz. t. 77. f. 6.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 18. 19.*



N. III. 12. *Helix ungulina.*

N. III. 12. Das Schlangenhorn.

*Linn. S. N. Sp. 682.*

*Belg. Slangetje. Rumph. Angl. Thick - lip Cake - Shell. Pet. Gall. Cornet de Chasseur. Dav.*

*Testa utrinque umbilicata, subglobosa, apertura lunata, labro reflexo albo.*

Die beiderseits genabelte, eiförmige Schale hat an der mondformigen Mündung eine übergeschlagene weiße Schalenleiste.

*Basis obtuse carinata.*

Der Grund hat eine stumpfe Querkiele.

*Rumph. amb. t. 27 f. R.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 13.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 11.*

*Gev. Belust. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13. *Helix Pileus.*

N. III. 13. Der Huthschirke.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 277.*

*Testa perforata, conica, alba, fasciis transversis rufis, apertura transversa, labro reflexo.*

Die durchbohrte kegelförmige weiße Schale ist mit rothbraunen Querbändern umgeben, und an der querliegenden Mündung mit einer übergeschlagenen Schalenleiste versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13.



N. III. 14. *Helix mam-*  
*millaris.*

N. III. 14. Der War-  
zenschnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 685.*

Testa umbilicata, ouata;  
apertura oblonga, apici ad-  
nata.

Die genabelte eysförmige  
Schale hat eine länglichte mit  
der Schnirkelspitze verwachsene  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 36.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 15. *Helix per-*  
*uerfa.*

N. III. 15. Der verkehr-  
te Schnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 688.*

*Belg. Top-Slak. Gall. L' Unique.*

Testa subperforata, ouato  
oblonga, sinistrorsa, labro  
reflexo albo.

Die einigermaßen durchbohrte,  
länglicht eyrunde links-  
gewundene Schale, hat eine  
übergeschlagene weiße Schalen-  
leiste.

« aurantia, linea longitudinali una  
alteraue purpurea.

« orangengelb, mit einer, oder  
mehrern nach der Länge herablau-  
fenden purpurrothen Linien.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 116.*

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. interior.*

*Seb. Tbes. III. t. 40. f. 37.*

*Berlin. Mag. III. 28. t. 4. 5. f.*

♂ viridis, fasciis citrinis.

♂ grün, mit zitronengelben Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 4. f.*

γ alba, maculis longitudinalibus rufis. γ weiß, mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.*

*Petr. Gaz. t. 76. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 5. f. O.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 5. f.*

N. III. 16. *Helix janthina.*

N. III. 16. Die blaue Schnirkelschnecke.

Linn.



Linn. S. N. Sp. 689.

Belg. Kwalle - Bootje.

Testa subimperfata sub- Die einigermaßen genabelte  
otunda, obtusa, fragili, apertu- fast runde, stumpfwirblige, dün-  
a dilatata, labro marginato. ne Schale hat eine erweiterte  
Mündung, mit einer überge-  
schlagenen Schalenleiste.

Rumph. amb. t. 20. f. 2.

Gualt. Test. t. 64. f. 0.

Berlin. Magaz. II. 2. t. 2. f.

Knor. Vergn. II. 30. t. 2. 3. f.

N. III. 17. Helix viui-  
para.

N. III. 17. Die leben-  
dig gebährende Schnirkel-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 690.

Testa subimperfata, ouato Die einigermaßen durchbohr-  
oblonga, ventricosa, fasciis te länglichte ensförmige bäuchi-  
transuersis fuscis; apertura ge Schale hat braune Quer-  
rotunda. bänder, und eine runde Mün-  
dung.

List. angl. t. 2. f. 18.

— Hist. Conch. l. 2. f. 26.



*Petiv. Gaz. t. 99. f. 16.*

*Gualt. Test. t. 5. f. A.*

*Argenv. Zoom. Pl. 8. f. 2.*

*Seb. Thes. III. t. 93. f. 34.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 8.*

*Berlin. Mag. IV. 7. t. 4—9. f.*

*Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 18. t. 4. f.*

N. III. 18. *Helix vi-*  
*trea.*

N. III. 18. Der Glas-  
schirkel.

Testa subimperforata ovata,  
subpellucida, ventricosa, spi-  
rae anfractibus carinatis.

Die einigermaßen durchbohr-  
te eysförmige, halbdurchsichti-  
ge Schale hat kiel förmig erha-  
bene Schnirkelgewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata, fragilissima, sub-  
pellucida, laevis. Anfractus quin-  
que, infimus ventricosus, conue-  
xus; superiores spirales carinati.  
Apertura ovato oblonga. Columel-  
la perforata, foramine tenui subob-  
tecto. Color luteo fuscus; fasciis  
longitudinalibus undulatis sulphu-  
reis.

Die Schale ist eysförmig und sehr  
gebrechlich, halbdurchsichtig und  
glatt. Sie bestehet aus fünf Ge-  
winden, davon das unterste bäu-  
chig, und runderhaben, die oberen  
aber, welche den Schnirkel bilden,  
kiel förmig erhaben sind. Die Mün-  
dung ist länglicht eysförmig; Die  
Spindel durchbohret, mit einem  
dünnen halbgedeckten Nabelloch. Von  
gelblich brauner Farbe mit nach  
der Länge herablaufenden wellen-  
förmigen schwefelgelben Bändern.

N. IV.



N. IV. Redundatae, imperforatae.

N. IV. Rundlichte, undurchbohrte.

N. IV. I. *Helix nemoralis*.

N. IV. I. Die Waldschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 691.*

Testa imperforata, rotundata, labro fusco.

Die undurchbohrte rundlichte Schale hat eine braune Mündung.

$\alpha$  lutea unicolor.

$\alpha$  gelb, einfärbig.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 54.*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 9.*

*Gev. Belust. 32. t. 398. f.*

$\beta$  lutea, fascia transuersa fusca.

$\beta$  gelb mit einer rothbraunen Quersbinde.

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 18.*

*Gev. Belust. 32. t. 403. f.*

*Schroet. Erdk. 2. t. 38. f.*

$\gamma$  lutea, fasciis tribus fuscis, infima & media latissima.

$\gamma$  gelb, mit drey braunen Quersbinden, davon die unterste und mittlere die breitesten sind.

*Gev.*



*Gev. Belust. 32. t. 407. f.*

- ♂ lutea, fasciis quatuor fuscis. ♂ gelb, mit vier braunen Querbändern.

*Gev. Belust. 32. t. 408 f.*

*Berlin Magaz. II. 3. t. 30. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 9. f.*

- ♀ lutea, fasciis quatuor fuscis, inerioribus subaequalibus, suprema angustiore. ♀ gelb, mit vier braunen Querbändern, davon die oberste schmaler, die unteren gleichbreit sind

*Berlin. Mag. II. 3. t. 27. 28. 29. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 2. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

- ♂ lutea, fasciis quinque fuscis, sursum decrescentibus. ♂ gelb, mit fünf braunen Querbändern.

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 2. f. F.*

*Berlin. Mag. II. 3. t. 31. 32. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 10. f.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 17. f.*

♀ rosea,



7 rosea, fasciis quinque transuer- 7 rosenroth, mit fünf braunen  
sis fuscis, binis, infimis latiori- Querbändern.  
bus.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 2. *Helix hor-*  
*tenfis.*

N. IV. 2. Die Garten-  
schnecke.

Testa imperforata, subglo-  
bosa, labro albo.

Die undurchbohrte rund-  
liche Schale, hat eine weiße  
Mündung.

Lutea, fasciis quinque transuer-  
sis fuscis, sursum decrecentibus.

Gelb, mit fünf braunen Quer-  
bändern, davon die oberen schmä-  
ler sind.

*Gev. Belust. 31. r. 374. 375. f.*

N. IV. 3. *Helix picta.*

N. IV. 3. Die gemalte  
Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglo-  
bosa, obtusa, laeui, columel-  
la anfractuumque margini-  
bus coloratis.

Die undurchbohrte rundlich-  
te glatte Schale, ist an der  
Spindel, und an dem Rande  
der Gewinde gefärbet.

Testa subglobosa, laeui. Anfra-  
ctus quatuor conuexi, infimus ven-  
tricosus, spirales obtusi, compla-  
nati. Apertura lunata. Columella  
spiralis, patens.

Die Schale ist einigermaßen ku-  
gelförmig, und glatt. Die vier  
Gewinde sind erhabenrund, davon  
das unterste häuchig, die aber den  
Schnirkel ausmachen, stumpf und  
flach gedrückt sind. Die Mündung  
ist mondförmig. Die Spindel  
schnirkelförmig und offen.

α gri-



$\alpha$  grisea, columella lineaque suturali & transuersa dorſi fusca.

$\alpha$  lichtgrau, mit brauner Spindel, und einer braunen Querlinie nächſt der Naht, und um die Mitte des Rückens.

*Mus. Caes. Vindobon.*

$\beta$  rosea, columella lineaque suturali & transuersa dorſi fusca.

$\beta$  rosenroth, mit brauner Spindel, und einer braunen Querlinie nächſt der Naht, und um die Mitte des Rückens.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 5.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 2. f.*

$\gamma$  sulphurea, columella lineaque suturali anfractuum rubra.

$\gamma$  Schwefelgelb, mit brauner Spindel, und rothen Linie an den Rändern der Gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 4. *Helix varicolor.*

N. IV. 4. Die bunte Schnirkelschnecke.

Testa imperforata subglobosa niuea, columella rosea, lineis transuersis fasciisque intermediis discoloribus.

Die undurchbohrte, rundliche Schale hat eine rothe Spindel, dünne Querlinien, mit dazwischen liegenden Bändern von verschiedenen Farben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Te-



Testa subglobosa laevis. Anfractus connexi, infimus ventricosus, spirales obtusi. Apertura lunata. Columella spiralis, imperforata. Color niueus, lineis transversis parallelis fuscis, fasciisque intermediis sulphureis; roseisque; columella rosea.

Die Schale ist rundlich, und glatt. Die sechs Gewinde sind eben, das unterste bäuchig, die den Schnirkel bilden stumpf. Die Mündung ist ensförmig. Die Spindel schnirkelförmig, und durchbohret. Von schneeweißer Farbe mit braunen gleichweitstehenden Quertlinien, mit safrangelben, und rothrothen Zwischenbändern. Die Spindel ist rosenroth.

N. IV. 5. *Helix aperta*.

N. IV. 5. Die offene Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglobosa, spira obtusa, minima, columella spirali aperta.

Die undurchbohrte rundliche Schale hat einen stumpfen kleinen Schnirkel, und eine schnirkelförmige offene Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa, tenuis, longitudinaliter obsolete striata. Anfractus tres, infimus ventricosus, superiores spirales obtusi, breues, complanati. Apertura lunata. Columella imperforata, spiralis, aperta. Color fuscus.

Die Schale ist einigermaßen kugelförmig, dünn, und nach der Länge sehr fein gestreift. Sie bestehet aus drey Gewinden, davon das unterste bäuchig, die oberen Schnirkelgewinde aber stumpf, kurz, und flach gedrückt sind. Die Mündung ist mondformig. Die Spindel undurchbohret, schnirkelförmig, und offen. Die Farbe braun.

N. IV. 6.



N. IV. 6. Helix Haematragus.

N. IV. 6. Das Blut-  
ohr.

Testa conuexo trochiformi, castanea, fascia transuersa alba; apertura transuersim elongata rosea.

Die runderhabene kräuselförmige kastanienbraune Schale hat ein weißes Querband und eine querliegende länglichte rosenrothe Mündung.

*Liszt. Hist. Conch. l. 2. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 328. 329. f.*

Testa trochiformis. Anfractus quinque conuexi, uniformiter de crescentes, & eleuati in spiram conicam obtusam. Suturae contiguae crenulatae. Apertura transuersim elongata auriformis. Columella imperforata complanata. Color castaneus, fascia infra medium dorsi transuersa alba. Apertura, & spirae apex rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Die fünf Gewinde sind erhabend, und nehmen gleichförmig ab in einer kegelförmigen Schnirkel. Die Näthe sind an einander verwachsen und gekerbt. Die Mündung ist in die Quere verlängert und ohrförmig. Die Spindel undurchbohret und flach. Von kastanienbrauner Farbe mit einem weißen Querbande unter der Mitte des Rückens. Die Mündung und die Schnirkelspitze sind rosenroth.

N. IV. 7. Helix Melanotragus.

N. IV. 7. Das Schwarz-  
ohr.

Testa



Testa connexa, trochiformi, castanea, fasciis duabus transuersis niueis; apertura transuersim elongata nigra.

Die runderhakenförmige kastanienbraune Schale hat zwei schneeweiße Quersbänder und eine in die Quere verlängerte schwarze Mündung.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima priori: parum depressior, castanea, fascia transversa niuea, prope futuram tenui, lata vero infra medium dorsi. Apertura ex fusco nigra.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten: nur etwas flacher, von kastanienbrauner Farbe, mit zwei schneeweißen Quersbändern, davon das schwälere nächst der Naht, das breite aber unter der Mitte des Rückens liegt. Die Mündung schwarzbraun.

N. V. Tursitae.

N. V. Gethürmte.

N. V. 1. *Helix decolata*.

N. V. 1. Die abgestutzte Schnirkelnadel.

*Linn. S. N. Sp. 695.*

Testa turrita, subperforata; vertice obtuse truncato, apertura ouata-

Die gethürmte, einigermaßen durchbohrte Schale hat eine stumpf abgestuzte Schnirkelspize; mit einer eyförmigen Mündung.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 56.*

*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 12.*

*Petiv. Gaz. t. 66. f. I.*

*Gualt. Test. t. 4. f. O. P. Q.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 5.*

*Knor. Vergn. VI. 12. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. I. f. 3.*

N. V. 2. *Helix calca-*  
*rea.*

N. V. 2. Die Marmor-  
nadel.

Testa turrita, longitudinali-  
ter striata, alba; anfractibus  
decem, apertura ovata.

Die gehürnte nach der Längs-  
ge feingestreifte weiße Schale  
hat eine stumpf abgestuzte  
Schnirkelspize mit einer eyförmigen  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 6. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa priori simillima: at triplo  
major, nitens, longitudinaliter re-  
nuissime striata. Anfractus decem,  
teretes, vniformiter decrescntes.

Die Schale ist der vorigen am  
ähnlichsten: aber dreymal größer,  
glatt, und nach der Länge sehr  
fein gestreift. Die zehn Gewinde  
Aper-



Apertura ouata. Columella torta, sind rund, und nehmen gleichförmig ab. Die Mündung ist eysförmig. Die Spindel gedreht, und mit einer ausgebreiteten dünnen Lefze gedeckt. Von weißer Farbe.

An prioris varietas perfecta?

Vielleicht eine vollkommene Abänderung der vorigen Art.

N. V. 3. *Helix plicata.*

N. V. 3. Die gefaltene Schnirkelnadel.

*= plicata  
in ovata land page*

Testa subulata, anfractibus plicis longitudinalibus coronatis,

Die ablsförmige Schale ist an den Gewinden mit erhabenen nach der Länge herablaufenden Falten gekrönet.

Gualt. Test. t. 6. f. H.

Berlin. Magaz. IV. 10. t. 51. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata subpellucida. Anfractus decem conuexi, prope futuram superiorem plicis elevatis longitudinalibus coronati. Apertura ouata. Columella elabiata.

Die Schale ist ablsförmig und halb durchsichtig. Die zehn Gewinde sind erhabenrund, und an der obern Naht mit nach der Länge herablaufenden Falten gekrönet. Die Mündung ist eysförmig. Die Spindel ohne Lefze.



N. V. 4. *Helix maculata*.

N. V. 4. Die gefleckte Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, picta undis longitudinalibus rufis.

Die ahlförmige glatte Schale ist mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Wellen bemalt.

*Gualt. Test. t. 6. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subulata, laevis, striis transuersis subtilissimis circumdata. Anfractus circiter duodecim conuexi. Apertura ovata. Labium laeue. Color pallidus, fasciis undulatis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist ahlförmig und glatt, mit sehr feinen Quersstreifen umgeben. Die Gewinde deren hundert zwölf, sind erhabenrund. Die Mündung eiförmig. Die Spindelstange glatt. Von bläßer Farbe mit nach der Länge laufenden rothbraunen Wellen bemalt.

N. V. 5. *Helix fusca* tus.

N. V. 5. Die braune Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, anfractibus teretibus.

Die ahlförmige glatte braune Schale hat flachrunde Gewinde.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 6. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa subulata laevis, transuersim  
subtilissime striata, Anfractus de-  
cem reretes. Apertura ouata. La-  
bium laeu. Faux cinerea. Color  
ex lutco fuscus.

Die Schale ist eysförmig und  
glatt, in die Quere sehr fein ge-  
streift. Die zehn Gewinde sind  
flachrund. Die Mündung eysförmig.  
Die Spindelstelle ist glatt.  
Der Schlund aschengrau. Die Scha-  
le außen gelblichbraun.

N. VI. Ouatae, imperforatae.

N. IV. Eysförmige, undurchbohrte.

N. VI. 1. Helix Ama-  
rula.

N. VI. 1. Die Fluß-  
Papstkrone.

Lin. S. N. Sp. 702.

Belg. Rivier Pause - Kroon, Rumph. Angl. River - Mitter - Shell.  
Petiv. Gall. La tiare fluviatile. Dav.

Testa ouata imperforata, ni-  
gra; anfractibus sursum spino-  
so dentatis.

Die eysförmige undurchbohr-  
te schwarze Schale ist oben an  
den Gewinden mit zahnsförmig-  
gen Stacheln besetzt.

Dorsum notatum cicatricibus oua-  
libus, margine albo cinctis, quem-  
admodum Nerita pulligera.

Der Rücken ist nach Art der  
bruttragenden Schwimmschnecken,  
mit eysförmigen Narben besetzt, die  
mit einem weißen Saume eingefasst  
sind.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 33.

Rumph. amb. t. 33. f. F. F.



*Petiv. amb.* 1. 4. f. 3.

*Gualt. Test.* t. 6. f. B.

*Argenv. Conch. Pl.* 27. f. post 6tam.

*Seb. Thes.* III. t. 53. f. 24. 25.

*Berlin. Magaz.* IV. 9. t. 38. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 2. *Helix stagnalis.* N. IV. 2. Das Teichhorn.

*Linn. S. N. Sp.* 703.

Testa ovato subulata, im- Die eysförmige ohlförmig zu-  
perforata, subangulata, ven- gespizte Schale ist bäuchig und  
tricosa; apertura ovata. etwas eckig, mit einer eysför-  
migen Mündung.

*List. angl.* t. 2. f. 21.

—— *Hist. Conch.* l. 4. p. I. f. 21.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 55.

*Gualt. Test.* t. 5. f. 7.

*Argenv. Conch. Pl.* t. 27. f. 6.

—— *Zoom. Pl.* 8. f. 5.

*Seb. Thes.* III. t. 39. f. 41 — 46. 52. 53.

*Klein. Meth. Ostr.* t. 3. f. 69.

*Slotterb. Aët. helv.* V, t. 3 f. 25. 26.

Ginan.



*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. A. B. C.*

*Berlin. Mag. IV. 9. t. 33. 35. 36. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 3. *Helix auricularia.*

*Linn. S. N. Sp. 708.*

*Gall. La Conque spherique.*

N. VI. 3. Das Ohr-  
horn.

Testa subimperfectorata am-  
pullacea, spira mucronata  
breui, apertura ampliata.

Die undurchbohrte aufgebla-  
sene Schale hat kurze, ver-  
dünnte Schnirkelspize, und  
eine weite Mündung.

*List. angl. t. 2. f. 23.*

—— *Hist. Conch. l. 1. p. 1. f. 23.*

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 54.*

*Gualt. Test. t. 5. f. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 7.; Pl. 28. f. 22.*

*Schlott. Aët. belv. V. 3. t. 27. 28.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 3.*

*Berlin. Mag. III. 5. t. 66. f.*

—— ——— *IV. 11. t. 59. f.*

*Schroet. Erdk. 1 t. 3 f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



N. VI. 4. *Helix solidida*.

N. VI. 4. Die dickschalige Schirkelschnecke.

Testa ovato oblonga, imperforata solida, glabra; anfractibus convexus, columella incrassata.

Die eiförmig länglichte und durchbohrte Schale ist dicht und glatt, mit erhabenrunden Gewinden, und einer verdickten Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblonga, solida, glabra. Anfractus sex convexus, continui. Apertura rotundato oblonga. Columella imperforata, labio incrassato, breui. Color roseus, lineis transversis tenuissimis rubro alboque articulatis.

Die Schale ist länglicht, dicht, und glatt. Die sechs Gewinde sind an einander verwachsen, und erhabenrund. Die Spindel ist undurchbohret, mit einer verdickten Lefze. Von rosenrother Farbe, mit sehr feinen roth und weiß unterbrochenen Querlinien.

N. VI. 5. *Helix halioidea*.

N. VI. 5. Die Milchschale.

Linn. S. N. Sp. 713.

Belg. Witte Oor - Schulp. Angl. White Ear. Pet. Gall. Oreille de Venus. Dav.

Testa



Testa elliptica, complana-  
ta, imperforata; apertura ad  
picem usque hiante.

Die elliptische, plattgedrück-  
te undurchbohrte Schale hat  
eine Fiss in die innerste Wirbel-  
spitze offene Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 21.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 40. f. R.*

*Gualt. Test. t. 69. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 2.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 114.*

*Knor. Vergn. VI. 39. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 15. t. 151. 152. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 8.*

N. VI. 6. *Helix ambi-*  
*gua.*

*Linn. S. N. Sp. 714.*

N. VI. 6. Der Halb-  
mond.

Testa subimperforata, ro-  
tunda, a, solida; apertura se-  
miorbiculari; labio incrassa-  
to.

Die undurchbohrte, rund-  
liche, dicke Schale hat eine  
halbrunde Mündung mit einer  
verdickten Spindelkante.

*Labium citrinum.*

Die Spindelkante ist zitrongelb.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 39. 40.*

*Adans. Seneg. Pl. 1. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 319. 320. f.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 5. 6. f.*

O. Nerita.

O. Die Schwimm-  
schnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 329.*

Testa spiralis. Aper-  
turae labio transverso pla-  
niusculo.

Die Schale ist schnir-  
felförmig. Die Mündun-  
g hat eine flachgedrückt  
querliegende Spindellefze

O. I. Umbilicatae.

O. I. Genabelte.

O. I. 1. Nerita Can-  
rena.

O. I. 1. Der Knoten-  
nabel.

*Linn. S. N. Sp. 715.*

*Belg. Navel-Slak. Angl. Dice Nerit.*

Testa umbilicata, laevi;  
spira mucronata; umbilico  
gibbo bifido.

Die genabelte, glatte, spiz-  
wirblice Schale hat einen hö-  
ckerigen zweytheiligen Nabel.

α albi-



*α* albida, punctis adspersa ferrugineis. *α* weißlich, mit rostfarbigen Punkten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 228.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. Q. S.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 60. 61.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 23.*

*β* albida, seriebus transversis macularum ferruginearum. *β* weißlicht, mit Querbändern von rostfarbigen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 224.*

*Gualt. Test. t. 67. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 62. 63.*

*Gev. Belust. 27. t. 303. 304. f.*

*γ* albida, lineis longitudinalibus angulatis ferrugineis. *γ* weißlicht, mit nach der Länge laufenden rostfarbigen Winkelzügen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 67. f. X.*

*Gev. Belust. 27. t. 295. 302. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. C.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 1. 54.*

*Regensf. Samml. I. 3. t. 34. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 4. f.*

♂ grisea, fasciis transversis albo ♂ gelbgrau, mit weiß und braun  
fuscoque articulatis. unterbrochenen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 3. 4. 8.*

*Gualt. Test. t. 67. f. V.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 27. 28. 51. 52. 64. 65.*

*Gev. Belust. 27 t. 294. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 5. f.*

—— ——— II. 10. t. 5. f.

—— ——— III. 15. t. 4. f. ; 20. t. 4. f.

O. I. 2. *Nerita glau-*  
*cina.*

O. I. 2. Die dicklipp-  
ge Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 716.*

Belg.



*all. Limaçon du Rivage.*

Testa umbilicata laeui, Die genabelte glatte stumpf-  
 fra obtusa, umbilico semi-wirblige Schale hat einen halb-  
 cufo; labio gibbo decolore. gedeckten Nabel, mit einer hö-  
 ckerigen gefärbten Lippe.

*List. angl. t. 3 f. 10.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 10.*

*Rumph. amb. t. 22. f. C.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. M. P. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 7. f.*

O. I. 3. *Nerita rufa.*

O. I. 3. Die braune  
*Nerite.*

*Angl. Twin girdled Nerit. Petiv.*

Testa umbilicata, laeui, Die genabelte glatte stumpf-  
 spira obtusa, umbilico bis- wirblige Schale, hat einen  
 do, zweispaltigen Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 22. f. D.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 11. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. Z.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 30.*

*Gev. Belust. 27. t. 296. f.*

Testa subglobosa, laevis. Anfractus quatuor, infimus ventricosus, superiores efformantes spiram complanatam, obtusam. Apertura semirotonda. Labium reflexum, glabrum, non claudens umbilicum. Umbilicus profundus, costa eleuata bipartitus.

Die Schale ist einigermaßen genabelt und glatt. Von den vier Gewinden ist das unterste bündel, die obern bilden einen zusammen gedrückten stumpfen Schnirkel. Die Mündung ist halbrund. Die Epibellefze ist übergeschlagen, und glatt mit einem offenen tiefen Nabe, welcher durch eine erhabene Nabel in zwey getheilet wird.

O. I. 4. *Nerita Vitellus.*

*Linn. S. N. Sp. 717.*

*Belg. Strand - Doijer. Angl. Doyer Velk Nerit- Pet. Gall. Jaas d' oeuf. Dav.*

O. I. 4. *Der Eyer dotter.*

Testa umbilicata subglobosa laeui, umbilico aperto aequali.

Die genabelte einigermaßen kugelfunde glatte Schale hat einen offenen glatten Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 22. f. A.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 67. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. D.*

*Gev. Belust. 27. t. 292 f.*



*Seb. Thes. III. t. 38. f. 30. 31.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 2. f.*

— — II. 8. t. 5. f.

O. I. 5. *Nerita Albu-*  
n.

O. I. 5. Der geschobe-  
ne Eyerdotter.

*Linn. S. N. Sp. 718.*

*Belg. Platte Doyer. Angl. Velk Nerit. Gall. Jaune d'oeuf applati. Dav.*

Testa umbilicata conuexa, Die genabelte erhabenrunde  
umbilico subcordato, labio ex- Schale hat einen etwas herz-  
anato. förmigen Nabel, mit einer aus-  
gebreiteten Spindellippe.

*Rumph. amb. t. 22. f. B.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 67. f. A. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. T.*

*Gev. Belust. 28. t. 309. f.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 54. f.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 1. f.*

— — IV. 7. t. 4. 5. f.

O. I. 6. *Nerita Mam-*  
milla.

O. I. 6. Der Warzen-  
dotter.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 719.*

*Belg. Sleek-hoorn. Angl. White Nerit. Petiv. Gall. Mammelo blanc. Dav.*

*Testa umbilicata, ouata, Die genabelte, eysförmige*  
*glabra; umbilico obtecto, a- glatte Schale hat einen gedeck-*  
*pertura ouata. ten Nabel, mit einer eysförm-*  
*gen Mündung.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 22.*

*Rumph. amb. t. 22. f. F.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 67. f. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. X.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 9. 10.*

*Gev. Belust. 28. t. 306. f.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 6. 7. f.*

—— ——— *IV. 8. t. 4. f.*

—— ——— *VI. 40. t. 2. 3. f.*

*O. I. 7. Nerita fulca-*  
*ra.*

*O. I. 7. Die gefurchte*  
*Schwimmschnecke.*

*Testa subglobosa, sulcis Die einigermaßen kugelför-*  
*longitudinalibus, obliquatis; mige Schale hat nach der Län-*  
*umbilico bifido, ge herab, etwas schief laufen-*  
*de Strahlen, und einen zwey-*  
*spaltigen Nabel.*

*Knor.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa. Anfractus quatuor. Spira mucronata. Sulci seu sulcae incisae secundum longitudinem descendentes. Umbilicus perforatus, costa eleuata bipartitus. Color lacteus.

Die Schale ist einigermassen kugelförmig. Der Gewinde sind vier. Der Schnirkel ist zugespitzt. Nach der Länge herab und etwas schief laufen ausgeschnittene Furchen oder Falten. Der Nabel ist offen, und mit einer erhabenen Rille in zwey getheilet. Von schneeweißer Farbe.

O. II. Imperforatae, labio edentulo.

O. II. Undurchbohrte, ohne Zähnen an der Spindelstelle.

O. II. 1. Nerita Radula.

O. II. 1. Die rauhe Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 721.*

Testa transuersim sulcata, costis intermediis acute tuberculatis.

Die Schale ist der Quere nach gefurchet, und auf den Zwischenribben mit spizigen Körnern besetzt.

*Gev. Belust. 23 t. 241 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. II. 2. Nerita littoralis.

O. II. 2. Die Strandschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 723.*



Testa laeui', vertice obtusiusculo, labio acuto edentulo.

Die glatte etwas stumpfwirblige Schale hat eine scharfe Schalenleiste ohne Zähnen.

*List. angl. t. 2. f. 2.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 35 — 38.*

*Gev. Belust. 24. t. 250. 252 257. f.*

Picturis, & coloribus innumeris varians.

Davon giebt es der Farbe und Zeichnung nach unzählbare Spielarten.

O. II. 3. *Nerita lacustris.*

O. II. 3. Die Sumpferite.

*Linn. S. N. Sp. 725.*

Testa laeui, apice exquisto, labiis edentulis.

Die glatte Schale hat eine hervorragende Wirbelspitze, und ungezähnelte Leisten.

*List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 38. ; l. 4. f. 6. f. 43*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 4. f. M. LL.*

*Gev. Belust. 24. t. 258 — 255. f.*

*Berlin. Mag. IV. 8. t. 27. 28. f.*

O. III. Imperforatae, labio dentato.

O. III. Undurchbohrte mit ungezählter Spindelkeule.

O. III. 1. *Nerita puligera.*

O. III. 1. Die bruttragende Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 726.*

*Belg. Rood-Oog. Angl. Red Nerit.*

Testa



Testa laeui, spirae apice Die glatte Schale hat eine na-  
 excavato umbilicato, labio beßförmig ausgehöhlte Schnur-  
 arenulato. kelspize, und eine glatte fein-  
 gekerbte Spindellefze.

*List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 37.*

*Petiv. Gaz. t. 11. f. 4.*

— amb. t. 11. f. 4.

*Rumph. amb. t. 22. f. H.*

*Gualt. Test. t. 4. f. HH.*

*Seb. Thes. III. t. 41. f. 23 — 26.*

*Gev. Belust. 31. 23. t. 242. f.*

*Berlin. Mag. IV. 8. t. 31. f.*

*Knor. Verg. VI. 13. t. 3. f.*

O. III. 2. Nerita cor-  
 nea.

O. III. 2. Die Horn-  
 nerite.

*Linn. S. N. Sp. 722.*

Testa rotundata, obsolete  
 striata, labiis edentulis.

Die rundlichte mattgestreifte  
 Schale hat an den Lippen kei-  
 ne Zähne.

Nigra, punctis fasciisque trans-  
 versis, luteis.

Schwarz, mit gelben Punkten  
 und Querbändern.

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. M.*

*Gev. Belust. 22. t. 226. f.*

O. III. 3. Nerita viri-  
 dis.

O. III. 3. Die grüne  
 Schwimmschnecke.



*Linn. S. N. Sp. 729.*

Testa laeui viridi, labio  
crenulato.

Die glatte grüne Schale hat  
eine feingekerbte Schalenlesze.

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 4. *Nerita virgi-*  
*nea.*

O. III. 4. Der Blutz  
zahn.

*Linn. S. N. Sp. 730.*

*Belg. Ploedige Tand. Gall. Quenotts.*

Testa laeui, ouata, labio  
gibbo, crenulato.

Die glatte euförmige Schale  
hat eine höckerige feingekerbte  
Schalenlesze.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 204.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 25. 26.*

*Petiv. Gaz. t. II. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. P.*

*Geu. Belust. 24. t. 251. f.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 2. f.*

O. III. 5. *Nerita pen-*  
*nata.*

O. III. 5. Die gefieder-  
te Schwimmschnecke.

Testa



Testa rotundata, laeui, labio plano crenulato.

Die rundliche glatte Schale hat eine flache feingekerbte Schalenleſze.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 29.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, laevis. Anfractus circiter quatuor, infra suturam complanati. Spira obtusa; Apex erosus. Apertura semicircularis. Labrum acutum. Labium complanatum, crenulatum. Color olivaceus alboque varius, maculis transuersis pennatis nigris.

Die Schale ist rundlich und glatt. Die Gewinde, deren ungeſehr vier ſind, an der Naht ſammengedrückt. Der Schnirkel iſt ſtumpf; die Spitze ausgeſtreſſen. Die Mündung halbrund. Die Schalenleſze ſcharfrandig. Die Spindelſeſze flach, und gekerbet. Die Farbe olivengrün, und weiß geſpelt, mit federförmigen querliegenden ſchwarzen Flecken.

O. III. 6. Nerita polita.

O. III. 6. Die glatte Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 731.*

Testa laeui, obtusa, labio dentato, labro crenulato.

Die Schale iſt glatt und ſtumpfwirblig, die Spindelſeſze gezähnt, die Schalenleſze gekerbet.

“ fusco alboque nebulosa, fasciis transuersis rubris.

“ braun und weiß nebelicht, mit rothen Querbändern.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 66. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 43. f.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1. 3.*

*Gev. Belust. 22. t. 223. 224. f.*

♂ albo, fuscoque nebulosa,

♂ weiß, und braun nebelicht.

*Rumph. amb. t. 22. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 66. f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. K.*

*Gev. Belust. 22. t. 220 — 221. f.*

γ griseo rubroque nebulosa, fasciis γ lichtgrau, und rothnebelicht,  
transuersis niueis. mit schneeweißen Querbändern.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 221.*

*Gev. Belust. 24. t. 245. f.*

O. III. 7. Nerita Polorontje.

O. III. 7. Der Peleoront Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 732.*

*Belg. Poelorontje. Rumph. Angl. Poeloroon Nerit. Petiv.*

Testa



Testa striata, labiis den- Die gestreifte Schale hat  
tatis, interiore planiusculo gezähnte Lippen, deren innere  
rugoso. flach, und runzelicht ist.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. II.*

*Rumph. amb. t. 22. f. K.*

*Petiv. amb. t. II. f. 6.*

*Gev. Belust. 27. t. 299. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 4. f.*

O. III. 8. *Nerita Albi-*  
*cilla.*

O. III. 8. Die stumpfe  
Schwimm Schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 733.*

Testa striata, spira obtu- Die gestreifte Schale hat  
fissima, labiis dentatis, inte- einen sehr stumpfen Wirbel,  
riore tuberculato. und gezähnte Lippen, deren  
innere mit Körnern besetzt ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. 8.*

*Gev. Belust. 23. t. 229. f.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 4. f.*

O. III. 9. *Nerita plicata*.O. III. 9. Die Falten  
nerite.*Linn. S. N. Sp. 735.*

Testa sulcata, labiis den-  
tatis, interiore rotundato,  
exteriore utrinque dentibus  
acutis.

Die gefaltene Schale ha-  
t gezähnte Lippen, deren inner  
rundlicht, die äußere aber bei  
derseits mit spizigen Zähnen be-  
setzt ist.

*Knor. Vergn. V. 15. t. 4. f.**Mus. Caes. Vindobon.*O. III. 10. *Nerita grossa*.O. III. 10. Die geribbte  
Schwimmuschnecke.*Linn. S. N. Sp. 736.*

Testa sulcata, labiis den-  
tatis, interiore conuexo ru-  
goso.

Die gefurchte Schale hat  
gezähnte Lippen, deren innere  
runderhaben, und runzelicht  
ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. N.**Petiv. amb. t. 5. f. 8.**Gev. Belust. 22. t. 228. f. ?**Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 9.



O. III. 11. *Nerita Chamaeleon*.

*Linn. S. N. Sp. 737.*

O. III. 11. Das Kamelotchen.

*Pelg. Kamelotje. Rumph. Angl. Camel Nerit. Petiv.*

Testa sulcis viginti, labiis dentatis, interiore rugoso, tuberculato.

Die Schale hat zwanzig Furchen, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern besetzt ist.

*Rumph amb. t. 22. f. L.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 7.*

*Gev. Belust. 23. t. 234. f.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 26. f.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.*

*omitt. zu fast pag.*

O. III. 12. *Nerita undata*.

*Linn. S. N. Sp. 738.*

O. III. 12. Die Wellenerite.

Testa sulcis triginta, labiis dentatis, interiore rugoso, tuberculato.

Die Schale hat dreißig Runzeln, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern besetzt ist.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 215.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 22. f. 4.*



*Gev. Belust.* 22. t. 227. f.

*Knor. Vergn.* VI. 13. t. 2. f.

O. III. 13. Nerita Exuvia.

O. III. 13. Die brei-  
furchige Schwimmschnecke

*Linn. S. N. Sp.* 739.

*Belg.* Geworte Alykruyk. *Angl.* Deep-rigd Nerit. *Petiv.*

Testa sulcata, labiis dentatis, interiore tuberculato. Die gefurchte Schale mit gezähnte Lippen, deren innere mit Körnern besetzt ist.

*Bonán. Recr. cl.* 3. f. 220.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 6. f. 14.

*Petiv. Gaz.* t. 100. f. 6.

— amb. t. 11. f. 9.

*Rumph. amb.* t. 22. f. M.

*Gualt. Test.* t. 66. f. CC.

*Argenv. Conch. Pl.* 7. f. 7.

*Seb. Thes.* III. t. 59. f. 4—9.

*Gev. Belust.* 23. t. 239. 240. f.

*Knor. Vergn.* III. 1. t. 5. f.

*Da Cost. Elem. Pl.* 3. 14. 15. f.



P. Haliotis.

P. Die Ohrschnecke.

Testa auriformis , foraminibus secundum longitudinem digestis. Spira occultata laterali. Die Schale ist ohrförmig und der Länge nach mit Löchern durchbohret. Der Schnirkel stehet verborgen an der Seite.

P. I. Haliotis Midæ.

P. I. Das Hohlohr.

*Linn. S. N. Sp.* 740.

*Belg.* Groot Holzeeor. *Angl.* The great Ear-Shell. *Hill.* Gall. La grande Oreille de Mer.

Testa subrotunda , rugosa, limbo lato. Die beinahe runde und runzelichte Schale hat einen breiten Rand.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 7. f. 5.*Gualt. Test.* t. 96. f. B.*Valent. Abb.* 12. t. 102. f.*Argenv. Conch. Pl.* 3. f. A.*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 7.*Knor. Vergn. V.* 20. t. 3. f.*Mart. Konch. Kab.* I. 14. t. 136. f.



P. 2. *Haliotis striata*.

P. 2. Das gestreifte Ohr.

*Linn. S. N. Sp. 742.*

*Belg. Gestrepte Zeeohr. Gall. Oreille de mer striée.*

Testa ovata, transuersim Die eysförmige Schale  
rugosa, longitudinaliter stria- nach der Quere gerunzelt, un-  
ta. in die Länge gestreift.

*Knor. Vergn. I. 20. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 14. t. 138. f.*

P. 3. *Haliotis marmo-  
rata*.

P. 3. Das Marmorohr.

*Linn. S. N. Sp. 744.*

*Gall. Oreille marbrée.*

Testa ovata, striis longitu- Die eysförmige Schale ist in  
dinalibus, transuersis, obsole- Länge nach gestreift, und in  
tis. die Breite mit vielen Strei-  
fen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 17. t. 4. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 14. t. 139. f.*

P. 4. *Haliotis asinina*.

P. 4. Das Eselohr.

*Linn. S. N. Sp. 745.**elg. Lange Parlemoor - Schulp. Angl. Long Sea Ear. Hill. Gall. Oille d'ane. Dav.*

Testa ovato oblonga, glabra, Die eysförmige, länglichte  
 argine subsulcato, dorso glatte Schale ist am Rande  
 iato. einigermaßen gefurchet, und  
 auf dem Rücken gestreiset.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 1.**Rumph. amb. t. 40 f. E. F.**Petiv. amb. t. 16. f. 34.**Gualt. Test. t. 69. f. D.**Argenv. Conch. Pl. 3. f. E.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.**Regenf. Samml. III. 9. t. 29. f.**Knor. Vergn. III. 15. t. 1. f.**Mart. Konch. Kab. I. 16. t. 150. f.*



## Q. Patella.

## Q. Die Napfſchnecke.

Testa fornicata, subconica, absque spira.

Die Schale iſt gewölbel kegelförmig, ohne Schnirkel.

Q. I. Labio interno.

Q. I. Mit einer Lippe in der inneren Wölbung.

Q. I. I. Patella equestris-

Q. I. I. Die Reiterweiberhaube.

Linn. Sp. N. Sp. 747.

Belg. Vijſchhuiſje. Rumph. Angl. Beaked Limpet. Hill. Gall. L. Cabochon. Dav.

Testa conica, vertice obliquo, labio subverticali canaliculato.

Die kegelförmige Schale hat einen ſchiefen Wirbel, und eine rinnenförmige nahe unter dem Wirbel ſtehende Lippe.

Bonan. Recr. cl. 1. f. 12.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 39.

Rumph. amb. t. 40. f. P. O.

Petiv. amb. t. 16. f. 28.

Gualt. Test. t. 9. f. Z.

Hill.



*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Dav. Cat. syst. I. Pl. 2. f. B. b.*

*Mart. Conch. Kab. I. 13. t. 117 — 110. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 5.*

*Walch Naturf. IX. 3. t. 1. 2. f.*

Q. I. 2. *Patella fornicata*,      Q. I. 2. Der Pantosel.

*Linn. S. N. Sp. 751.*

*Belg. Pantoseltje. Angl. Small indian Canoe-Shell. Gall. Le Sante. Dav.*

Testa ovata, vertice marginali, mucronato, incuruo, lato interno concauo.      Die eiförmige Schale hat an einem Ende einen spitzigen gekrümmten Wirbel, mit einer hohlen Spitze.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 33.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. N.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 8.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 3. f.*

*Mart. Conch. Konch I. 13. t. 129. 130. f.*

Q. II.



Q. II. Margine angulato.

Q. II. Mit eckigem Rande.

Q. II. 1. Patella saccharina,

Q. II. 1. Die Sternpatelle.

*Linn. S. N. Sp. 754.**Belg. Bonnetje. Angl. White rib'd Limpet. Pet. Gall. Astrolepas. Den.*Testa margine angulato,  
costis carinatis acutis.Die Schale hat einen eckigen Rand, und scharfkielig  
Ribben.*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 10.**Rumph. amb. t. 40. f. B.*° *Petiv. amb. t. 3. f. 3.**Gualt. Test. t. 9. f. M. O.**Argenv. Conch. Pl. 3. f. M.**Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 4.**Knor. Vergn. III. 29. t. 3. f.**Mart. Conch. Kab. I. 9. t. 76. f.**Murr. Fund. Test. t. 1. f. 6.*

Q. II. 2. Patella barbara.

Q. II. 2. Die Mäse.

*Linn. S. N. Sp. 755. °**Belg. Grasje.*

Testa



Testa angulata , costis viginti undatis , tuberculatis.

Die eckige Schale hat 3. zwanzig wellenförmige knottige Rippen.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 3. f.*

Q. II. 2. *Patella plicata.*

Q. II. 2. Die Faltenpatelle.

*Gall. La tete de Meduse, Dav.*

Testa angulata , costis triginta obtusis , undulosis , transversim rugosis.

Die eckige Schale hat dreißig stumpfe , wellenförmige , in die Quere gerungelte Rippen.

*Knor. Vergn. III. 30. t. 1. f.*

*Dav. Cat. syst. I. Pl. 3. f. D.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata. Margo dentatus, dentibus 30 - 34. Costae totidem dorsales , undatae , transversim rugosae. Vertex subcentralis , obtusus. Color albus , maculis fuscis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand mit 30 — 34 Zähnen umgeben. Auf dem Rücken liegen eben so viele wellenförmige und in die Quere gerungelte Rippen. Der stumpfe Wirbel steht nahe am Mittelpunkt. Weiß mit braunen Flecken.



Q. II. 3. *Patella granularis*.

Q. II. 3. Die Festung.

Linn. S. N. Sp. 756.

Belg. De Fortresse. Angl. The Fortresse. Gall. La Forteresse. Dav.

Testa angulata, dorso squamis angulatis imbricato, fundo fusco.

Die eckige Schale hat auf dem Rücken ziegelförmig gestellte eckige Schuppen, und einen braunen Boden.

List. Hist. Conch. I. 4. f. I. f. 13.

Gualt. Test. t. 9. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 2. f. G.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Regenf. Samml. I. 9. t. 31. f.

Knor. Delic. nat. I. t. B. V. f. 8.

— Vergn. I. 30. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. I. 9. t. 71.

Q. II. 4. *Patella Oculus*.

Q. II. 4. Das Bocksaug.

Angl. Goat's Eye Limpet. Da Cost. Gall. L'oeil de bouc. Argenv.

Testa



Testa angulata, costis ca- Die eckige Schale hat viel-  
rinatis, vertice fundoque förmige Ribben, den Wirbel  
albo. und Grund von weißer Farbe.

Gualt. Test. t. 9. f. H. 1

Argenv. Conch. Pl. 2. f. B.

Mart. Conch. Kab. I. 10. t. 86. f.

Da Cost. Elem. Pl. 2. f. I.

Testa similis priori, a qua differt: Eine Art die der vorhergehenden  
colore fundi verticisque albo, squa- ähnlich ist, von der sie sich durch die  
marumque defectu. weiße Farbe des Wirbels und Grund-  
des, und durch den Mangel der  
Schuppen unterscheidet.

Q. II. 5. Patella grana-  
tina.

Q. II. 5. Das Körner-  
schild.

Linn. S. N. Sp. 757.

Belg. Gedoornd Kapje. Gall. Lepas granuleux.

Testa multifulcata, punctis Die Schale ist mit vielen  
elevatis muricata, margine Furchen und erhabenen Punk-  
dentato. ten besetzt, und mit einem er-  
habenen Rande versehen.



*List. Hist. Conch. v. 4. f. 1. f. 15.*

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 22.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 14. f.*

*Mart, Conch. Kab. I. 8. t. 61.*

Q. II. 6. *Patella coerulea.*

Q. II. 6. Die blaue  
Napfschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 759.*

Testa inaequaliter sulcata,  
cauitate coerulescente, mar-  
gine subangulato.

Die Schale ist mit unglei-  
chen Furchen besetzt, in der  
Höhlung blaulicht, und am  
Rande einigermassen eckig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. II. 7. *Patella minia-  
ra.*

Q. II. 7. Der Sonnen-  
schirm.

*Belg. Gestraalte Kapje. Gall. Le Parasol. Dav.*

Testa ovata, striis inaequali-  
bus decussatis, margine sub-  
angulato.

Die eiförmige Schale ist  
mit ungleichen Strichen durch-  
kreuzet, und am Rande eini-  
germaßen eckig.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 21.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 4 — 6. f. ; 19. t. 2. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. l. 7. t. 52. f. ; 8. t. 63. f.*

Testa ovata. Margo obsolete anguatus. Dorsum striis longitudinalibus transuersisque decussatim striatum. Vertex obtusus. Color albus, punctis minutis, radiisque roseis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand hat vollkommene Ecken. Der Rücken ist der Länge und Quere nach mit feinen Streifen durchkreuzet. Der Wirbel stumpf. Weiß mit kleinen Punkten und Strahlen von rosenrother Farbe.

Q. II. 8. Patella Cochlear,

Q. II. 8. Der Löffel.

*Gall. La Cuilliere.*

Testa ovata, complanata, postice attenuata, margine subangulato.

Die Schale ist eiförmig und plattgedrückt, hinten verschmälert, und am Rande einigermaßen eckig.

*Knor. Vergn. II. 26. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis. Margo crenatus. Dorsum antice planiusculum, postice attenuatum, utrinque compres-

Die Schale ist eiförmig. Der Rand gekerbt. Der Rücken vorne etwas flach, hinten verlängert, an beiden Enden abgerundet.



fum. Striatum, striis longitudinalibus inaequalibus. Cavitas posteriorum canali ulata. Color albus, cavitas macula lata purpureo coerulea.

den Seiten zusammengebrückt, mit ungleichen Streifen der Länge nach besetzt. Die Höhlung ist rückwärts rinnenartig ausgehöhlet. Weiß, mit einem breiten purpurblauen Flecke in der Höhlung.

Q. II. 9. Patella pentagona.

Q. II. 9. Der spanische Huth.

Testa pyramidata subquingula, margine explanato inaequali.

Die pyramidenförmige einsechseckige Schale hat einen ausgebreiteten runden Rand.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa pyramidata, angulis quinque obtusis, latere uno ampliore. Basis explanata quingula, crenata. Vertex centralis obtusus. Color albidus, Fundi rubellus.

Die Schale ist pyramidenförmig mit fünf stumpfen Ecken, und einer breiteren Seite. Der Rand ist ausgebreitet, und gekerbet. Der stumpfe Wirbel steht in der Mitte. Die Farbe ist weißlich, der Boden röthlich.

Q. III. Vertice acuminato curvato.

Q. III. Mit einem gespalzten krummen Wirbel.

Q. III. 1. Patella ungatica.

Q. III. 1. Die Matrosenfearpe.

*Linn. S. N. Sp. 761.*

*Belg.*



Belg. Lots - Kap, Rumph, Gall. Bonnet de Dragon. Dav.

Testa conica, vertice acuminato spiraliter curvato.

Die kegelförmige Schale hat einen zugespitzten schnirkelförmig gekrümmten Wirbel.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 13.

Gualt. Test. t. 9. f. IV.

Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 10.

Knor. Vergn. VI. 16. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 107. 108. f.

Q. III. 2. Patella dextra.

Q. III. 2. Die einseitige Napfschnecke.

Testa ovata, longitudinaliter sulcata, vertice dextror-um curvato.

Die Schale ist eiförmig, der Länge nach gestreift, mit einem nach der linken Seite gekrümmten Schnirkel.

Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm, IV. I. t. 2. 10. f.

Testae ambitus ovatus. Dorsum cornicatum, utrinque compressum, longitudinaliter sulcatum. Vertex obtusus, compressus, in latus dextrum decurvatus. Color fuscus, striae radiantes & fundus albus.

Der Umfang ist eiförmig. Der Rücken gewölbet, beiderseits zusammengedrückt, und der Länge nach gesurchet. Der Wirbel ist stumpf, zusammengedrückt, und nach der rechten Seite gekrümmt. Von schwarzer Farbe mit weißen Strahlen und Wirbelboden.



Q. III. 3. *Patella mamillaris*.

Q. III. 3. Die Kopfschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 764.*

*Belg. Getepelte Patelle.*

*Testa integra, conica, striata, vertice reflexo laevi.*

Die ganzrandige, kugelförmige, gestreifte Schale hat einen zurückgebogenen glatten Wirbel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 17.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. I.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 7. t. 58. 59. f.*

Q. III. 4. *Patella tricarinata*.

Q. III. 4. Die dreynkie-  
lige Napfschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 764.*

*Testa reticulato striata, antice tricarinata, vertice recurvo.*

Die nezförmig gestreifte Schale hat vorne dreyn Kiele, mit einem zurückgebogenen glatten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 5.



Q. III. 5. *Patella pectinata*.

Q. III. 5. Die Kamm-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 765.*

Testa integra, ovata, membranacea, squamis imbricatis, vertice reflexo submarginali.

Die ganzrandige, eysförmige, dünnhäutige Schale ist mit hohlen Schuppen ziegelförmig bedeckt, und nahe am Rande mit einem zurückgebo-  
genen Wirbel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 6. *Patella lutea*.

Q. III. 6. Der gelbe  
Huth.

*Linn. S. N. Sp. 766.*

Testa integra, ovali, striata, vertice submarginali reflexo mucronato.

Die ganzrandige eysförmige gestreifte Schale, hat nahe am Rande einen zurückgebogenen gespitzten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Q. IV. Integerrimae , vertice  
obtus.

Q. IV. Mit ganz glatten Rand,  
und stumpfen Wirbel.

Q. IV. 1. Patella pellu-  
cida.

Q. IV. 1. Die Glas-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 770.*

Testa ouata , ventricosa,  
membranacea pellucida , ra-  
diis coeruleis.

Die eysförmige , bäuchige ,  
dünnhäutige , und durchsichtige  
Schale , hat blaue Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 27.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. IV. 2. Patella testu-  
dinaria.

Q. IV. 2. Der Schild-  
krötennapf.

*Linn. S. N. Sp. 771.*

*Belg. Getygerd Schild, Gall. Bouclier de Tortue. Dav.*

Testa integerrima ouata ,  
glabra, fusco maculata.

Die ganzrandige , eysförmige ,  
glatte Schale ist braun  
gesteckt.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 8. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. P.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 1. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 6. t. 45 — 48. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 2. 3. f.*

Q. IV. 3. *Patella radiata,*

Q. IV. 3. Die Strahlpatelle.

Testa integerrima, ouata, striata, vertice radiisque fuscis.

Die ganzrandige, eiförmige, gestreifte Schale hat einen braunen Wirbel, mit gleichfarbigen Strahlen,

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata. Margo integerrimus. Dorsum longitudinaliter striatum. Vertex subcentralis. Color albidus. Cavitae margaritacea. Fundus & fasciae radiantes fuscae.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand ganz glatt. Der Rücken der Länge nach gestreift. Der Wirbel steht beinahe in der Mitte. Von weißlicher Farbe. Die Höhlung hat einen Perlglanz. Der Boden und die strahligen Bänder sind braun.

Q. IV. 4.



Q. IV. 4. *Patella compressa*.

Q. IV. 4. Der Stroh  
huth.

*Linn. S. N. Sp. 772.*

*Belg. Geele Kapje.*

Testa integerrima, oblonga  
striata, dorso utrinque com-  
presso.

Die ganzrandige länglicht  
gestreifte Schale hat einen bei-  
derseits zusammengeprägten  
Rücken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 25.*

*Knor. Vergn. VI. 28. t. 1. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 1. f.*

Q. IV. 5. *Patella rustica*.

Q. IV. 5. Die Bauern-  
kappe.

*Linn. S. N. Sp. 773.*

Testa integerrima, conica  
sulcato striata, obtusa.

Die Schale ist ganzrandig  
kegelförmig, stumpfwirblich, mit  
Furchen und Streifen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 8. f. P.; t. 9. f. C.*

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. I. 5. t. 35. f. ; 6. t. 43. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. I. f. I. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. IV. 6. *Patella fusca.*      Q. IV. 6. Die Trink-  
schale.

*Linn. S. N. Sp. 774.*

*Gall. l'Entonnoir,*

Testa ovata, multi sulcata,      Die eysförmige Schale ist  
auitate margaritacea, fundo mit vielen Furchen besetzt, in  
usco,      der Höhlung perlfarbig, und  
am Grunde braun.

*Bonan. Recr. cl. I. f. 4.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. I. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 5. t. 40. f.*

G. V. *Perforatae.*

Q. V. *Durchbohrte Napfschnecken.*

Q. V. I. *Patella Fissura.*      Q. V. I. Die Spalte.

*Linn. S. N. Sp. 778.*

*Angl. Crack'd Barnstable Limpet. Petiv.*

Testa



Testa ouata reticulato striata, antice fissä, vertice recuruo.

Die eysförmige nezartig gestreifte Schale, ist vorne gespalten, mit einem zurückgebo- genen Schnirkel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 28.*

*Petiv. Gaz. t. 75. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 109. 110. f.*

*Müll. Zool. Dan. t. 24. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. V. 2. *Patella graeca.* Q. V. 2. Das Kumpelgitter.

*Linn. S. N. Sp. 780.*

*Belg. Griechsche Patelle. Angl. Thimble Limpes. Pet. Gall. Le Treillis. Dav.*

Testa ouata, costata, decussatim striata, vertice perforato.

Die eysförmige geribbte, in die Quere gestreifte Schale hat einen durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 6.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Petiv. Gaz. t. 80. f. 11.*

Klein.



*Klein. Melb. Ostr. t. 8. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 9. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. J.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 7.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 23. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 98. 99. f.*

Q. V. 3. *Patella nim-*  
*bosa.*

Q. V. 3. Das Strahl-  
gitter.

*Linn. S. N. Sp. 781.*

Testa ouata longitudinali-  
ter sulcata, transversim stria-  
ta, vertice perforato.

Die eiförmige Schale ist  
nach der Länge gefurchet, und  
in die Quere gestreift, mit  
einem durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 3.*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 1. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 9. f. Q. R. S. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 91. 92. f; 12. t. 105. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3.*

Q. V. 4.

Q. V. 4. *Patella nodosa*.

Q. V. 4. Das Knottengitter.

*Angl.* Wart-rib'd Limpet.*Testa onata sulcata, costis nodosis, vertice perforato.*

Die eysförmige gefurchte Schale hat knottige Ribben, und einen durchbohrten Wirbel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 6.**Petiv. Gaz. t. 153. f. 5.**Mart. Conch. Kab. L. II. t. 94. f.**Testa ovata. Dorsum longitudinaliter sulcatum, costis intermediis nodosis. Vertex subcentralis, pertusus; foramine oblongo. Color rubellus.*

Die Schale ist eysförmig. Der Rücken der Länge nach gefurcht, mit knottigen Zwischenribben. Der durchbohrte Wirbel steht an der Mitte. Die Oefnung ist länglicht. Von röthlicher Farbe.

R. *Dentalium*.

R. Die Zahnschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 332.**Testa conico tubulosa, libera, utrinque pervia.*

Die freye Schale ist kegelförmig, hohl, und an beiden Enden offen.

R. I.



R. 1. Dentalium ele-  
phantinum.

R. 1. Der Elephantenz-  
zahn.

*Linn. S. N. Sp. 783.*

*Belg. Oliphants - tand. Rumph. Angl. Elephant's - Ttooth. Pet. Gall.*  
*Dentale. Dav.*

Testa decemangula, subar-  
cuata, striata.

Die Schale ist zehneckig,  
etwas gekrümmt, und gestrei-  
fet.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 8.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 10. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. H.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 5. f. A.*

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 19. t. 1. f.*

R. 2. Dentalium stria-  
tum.

R. 2. Das gestreifte  
Zähnen.



*Angl.* The striated Tooth - Shell. *Hill.*

Testa octangula, subarcuata, dense striata.

Die Schale ist achteckig, etwas gekrümmt, und mit Streifen dicht besetzt.

*Gualt.* Test. t. 10. f. G.

*Hill.* Hist. of. Anim. Pl. 7.

*Mart.* Konch. Kab. I. 1. t. 5. f. B.

Differt a praecedente crassitie minore, & striis densis numerosis.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch ihre Dünne, und die vielen gedrängt an einander stehenden Streifen.

R. 3. Dentalium Dentalis.

R. 3. Der Wolfszahn.

*Linn.* S. N. Sp. 785.

*Gall.* La dent de loup. *Dav.*

Testa subarcuata, longitudinaliter sulcata, tenui, rubella.

Die röthliche dünne Schale ist etwas gekrümmt, und nach der Länge gefurchet.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 41. f. 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

R. 4. Dentalium Enta-

R. 4. Der Hundszahn.

S.  
*Linn. S. N. Sp. 786.*

*Belg. Witte Wolfstand. Angl. The Dog - tooth Shell. Pet. Gall.  
Entale. Dav.*

Testa subarcuata, laevissi- Die Schale ist etwas ge-  
aa. frümmet, und ganz glatt.

*Bonon. Recr. cl. 1. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 65. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 10. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. K, K.*

*Ginan. adr. II. t. 1. f. 2.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 4. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 1. t. 1. 2. f.*

R. 5. Dentalium poli-  
tum.

R. 5. Der Polirzahn.



Linn. S. N. Sp. 788.

Testa subarcuata , striis Die etwas gekrümmte Schale ist in die Quere mit gedräng-  
annularibus confertissimis. stehenden Streifen umgürtet.

Gualt. Test. t. 10. f. F.

Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 3. f. A.

S. *Serpula*.

S. Die Röhrenschnecke

Linn. S. N. Gen. 333.

Testa tubulosa , adna- Die Schale ist röhrig  
ta , saepius isthmis inter- und angewachsen , auch öf-  
cepta. ters durch Scheidewand  
abgetheilet.

S. 1. *Serpula triquetra*.

S. 1. Die dreneckig  
Röhre.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 795.*

*Gall. Vermiculaire blanc & triangulaire.*

Testa repente, flexuosa, Die dreneckige Schale ist in  
triqueira. einander geschlungen, und fle-  
bet auf andern Körpern fest.

*Gualt. Test. t. 10. f. P.*

*Bast. subs. I. t. 9. f. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

S. 2. *Serpula filograna.* S. 2. Die Flechtenröh-  
re.

*Linn. S. N. Sp. 797.*

Testis capillaribus, fascicu- Mehrere haarförmige, bü-  
latis, ramolis, confluentibus. schelweise und ästig an einan-  
der verwachsene Schalen.

*Seb. Tbes. III. t. 100. f. 8.*

*Koelv. Nov. Comm. Petr. VII, t. 16. f. 3.*



S. 3. *Serpula contor-*  
*ruplicata.*

S. 3. Der Fischdarm.

*Linn. S. N. Sp. 799.*

*Gall. L'assemblage des bojaux.*

Testa rugosa, flexuosa, ca-  
rinata.

Die Schale ist runzelicht,  
geschlungen und gefeibet.

*Bonan. Recr. cl. 1. t. 20. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 24. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 6.*

S. 4. *Serpula glome-*  
*rata.*

S. 4. Der Vogelldarm.

*Linn. S. N. Sp. 800.*

*Gall. Bojaux des oiseaux. Dav.*

Testa decussatim striata, con-  
torta, glomerata.

Die Schale ist kreuzweise  
gestreift, und klumpenweise  
in einander geschlungen.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 20. E.*

*Gualt. Test. t. 10. f. T.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 23. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 7.*



S. 5. *Serpula lumbricilis*.

S. 5. Die Hornschlangge.

*Linn. S. N. Sp. 801.*

*Belg. Zeeslangetje. Gall. Vilebrequin. Dav.*

*Testa flexuosa, apice spirali.*

Die geschlungene Schale hat eine schnirkelförmig gewundene Endspitze.

z solitaria.

z einzeln.

*Bonon. Recr. cl. 1. f. 20. A.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 10. f. Q. V.*

*Argenv. Conch. Pl. t. 4. f. 7.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 14.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 1. f.*

—— ——— IV. 17 t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 12. f. B.*

♂ testis aggregatis.

♂ mit angehaften Eiern.

*Adans. Seneg. Pl. II. f. 1.*

S. 6. *Serpula polythalamia*.

S. 6. Die Sandpfanne.



*Linn. S. N. Sp. 802.*

*Angl. The chambered Vermiculus. Da Cost.*

Testa ponderosa, tereti, con-  
camerata, bifurcata.

Die schwere, runde Schale  
ist in Kammern abgetheilet,  
und zweytheilig.

*Seb. Tbes. III. t. 49. f. V.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 6. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 5.*

**S. 7. Serpula arenaria. S. 7. Der Ochsendarm.**

*Linn. S. N. Sp. 803.*

*Belg. Hondsdarm. Rumph. Angl. Ovenshell. Pet.*

Testa supra angulata, subtus  
planiuscula.

Die Schale ist oben eckig,  
und unten flach.

*Bonan. Recr. cl. I. f. 20. B.*

*Rumph. amb. t. 41. f. L.*

*Gualt. Test. t. 10. f. L. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 11. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. f. 19.*

S. 8. *Serpula anguina*.

S. 8. Der Hühnerdarm.

*Linn. S. N. Sp. 804.**Belg. Hornslangetje. Rumph.*

Testa tereti, rima longitu-  
dinali, apice cylindrico spi-  
rali.

Die runde Schale hat nach ih-  
rer Länge eine Spalte, und eine  
walzenartige schirnkelförmig  
gedrehte Endspitze

α laevis.

α glatt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 2.**Rumph. amb. t. 41. f. 2.**Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 13. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

β angulata, &amp; muricata.

β mit einer eckigen, und stach-  
lichten Schale.*Rumph. amb. t. 41. f. H.**Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 13. f. B.**Mus. Caes. Vindobon.*S. 9. *Serpula Penis*.

S. 9. Die Gießkanne.

*Linn. S. N. Sp. 806.*

*Belg. Venus - Schagt. Rumph. Angl. The wattering Pot. Gall. L'arro-  
soir. Dav.*



Testa tereti, extremitate Die runde Schale ist an  
lata, tubulis cylindricis per- dem breiten Ende mit walzen-  
tula. förmigen Röhrchen durchsto-  
chen.

*Bonan. Mus. Kircb. cl. I. f. 38.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 87.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 10. f. M.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.*


— — VI. 40. t. 1. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 1. t. 7. f.*

— berl. Beschaeft. II. 11. t. 1 — 5. f.

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 8.*



N O M I N A  
T R I V I A L I A  
O R D I N E A L P H A B E T I C O.

---

Benennungen  
d e r  
K o n c h y l i e n  
in alphabetischer Ordnung.

---

NOMENCLATOR GERMANICVS.  
Deutsche Benennungen.

	Seite.
<b>A</b> briskosenstein	60. K. III. 5.
Achatbirne	319. I. V. 16.
Admiralstute	134. C. II. 2.
Aentenbrut	6. B. 6.
Astersturmhaube	245. G. IV. 2.

Aster

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Astervenus blaustreifige	53. K. II. 11.
Agatmuschel	50. K. II. 8.
Arche Noah	73. N. II. 1.
Argus doppelter	158. D. I. 4.
Argus Weibchen	172. D. IV. 1.
Affel	181. D. IV. 15.
Affelschnecke	276. H. II. 8.
Auster gemeine	99. O. VI. 4.
—— gezähnelte	99. O. IV. 5.

<b>B</b> abelsturm	308. I. V. 1.
Bakassanmuschel	20. F. I. 5.
Bandnadel braune	216. F. IV. 6.
Band rothes	189. E. 11.
Bandspindel	321. I. V. 19.
Bartarche	74. N. II. 2.
Bartkneifer	12. D. 4.
Bastardarche	75. N. III. 1.
Bastardargus	156. D. I. 1.
Bastardbauernmusik	134. C. II. 1.
Bastarddrachenköpfchen	171. D. III. 3.

Bastard.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Bastardlampe	379. N. II. 10.
Bastardmuschel gestumpfte	103. P. 4.
Bastardtelline	24. F. II. 6.
Bastardvenus	45. K. I. 3.
Bauernkappe	444. Q. IV. 5.
Bauernmüß	142. C. II. 12.
Beetchen gekröntes	239. G. II. 10.
Bernstein Muster	103. P. 3.
Besansfegel	278. H. III. 3.
— — aufgewickelte	279. H. III. 4.
Besansspindel gezackte	328. I. VI. 7.
Bezeug	305. I. IV. 8.
Bezoer grauer	241. G. III. 2.
— — glatter	242. G. III. 3.
Bienenkörbchen	364. L. III. 3.
Birne getrocknete	297. I. III. 8.
Birnwalze	224. F. IV. 16.
Bischofsmütze	217. F. IV. 8.
Blase offene	187. E. 7.
Blasentasche	95. O. III. 3.
Blasenwalze	205. F. III. 1.
Blätterkamm	107. Q. I. 2.
Blaulippe	56. K. II. 17.

Blute

# MONENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Blutohr	400. N. IV. 6.
Blutzahn	420. O. III. 4.
Bocksaug	434. Q. II. 5.
Bocksschnecke	347. L. II. 1.
Bohne	208. F. III. 4.
Bohrer gefurchter	146. C. III. 3.
— — punktirter	145. C. III. 1.
Bootsacke	267. H. I. 3.
Bötcherbohrer	192. E. 14.
Brandstreck	176. D. IV. 7.
Brandhorn	291. I. II. 5.
Brandnadel braune	214. F. IV. 2.
Braunlippe	51. K. II. 9.
Breitrand	365. L. IV. 4.
Brunette	151. C. III. 9.
Buchstabennadel	327. I. VI. 6.
Buchstabenporzellane arabische	157. D. I. 3.
Bund türkischer	340. XII. 4.
Butterwecke gelbe	139. C. II. 2.

<b>C</b> auris gefleckte	174. D. IV. 4.
--------------------------	----------------

# Deutsche Benennungen.

<b>D</b> ach chinesisches	350. L. II. 5.
Delphin geribbter	361. L. III. 7.
— gezackter	360. L. III. 6.
Dienestügel	272. H. II. 3.
Dicklippe	339. K. II. 3.
Distelschnecke	304. I. IV. 7.
Doppelribbe	366. L. V. 3.
Dornspindel gefurchte	325. I. VI. 4.
Dose gefurchte	39. O. II. 15.
— gewölbte	93. O. II. 14.
Dosenschnecke	245. G. IV. 3.
Drachenhaupt	174. C. IV. 5.
Dreneck	41. I. I.
Dünnribbe	46. K. I. 4.
Dünnschale	164. D. I. 12.

<b>E</b> ckhorn	252. G. VII. 1.
Eichelmuschel	69. M. 5.
Eichenholzstutze	140. C. II. 10.
Eismuschel	94. O. III. 1.
Elephantenzahn	449. R. 1.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Elster	357. L. III. 3.
Erbfenschotte	15. E. 3.
Erdbeere rothe	33. G. 10.
Efelchen	170. D. III. 2.
Efelohr	429. P. 4.
Eftrich	131. C. I. 8.
En	183. E. 1.
Eyerdotter	414. O. I. 4.
— geschobener	415. O. I. 5.

<b>F</b> ahne	118. R. 5.
Fahnenmadel	214. E. IV. 3.
Faltenklappe	65. L. 2.
Faltenmund	376. N. II. 5.
Faltenmadel	264. G. VIII. 13.
Faltennerite	424. O. III. 9.
Faltenpatelle	433. Q. II. 5.
Faltenschnecke nezförmige	212. F. III. 10.
Faß	231. G. I. 5.
Feige	190. E. 1.
— linksgewundene	313. I. V. 8.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Feile	95. O. III. 2.
Felsengienmuschel	71. M. 8.
Fenster Scheibe	105. P. 7.
Festung	434. Q. II. 4.
Fischdarm	454. S. 3.
Fischernez	139. C. II. 8.
Fischweiberhaube	430. Q. I. 1.
Flachwirbel	376. N. II. 6.
Flechtenröhre	453. S. 2.
Fledermaus	219. F. IV. II.
Fleischhorn	273. H. II. 1.
— — — unächt	314. I. V. 9.
Fleischlinse	26. F. III. 3.
Flügelschnecke gebänderte	274. H. II. 6.
Flußpabstkrone	405. N. VI. 1.
Flußperlmuschel	11. D. 3.
Frieselporzellane	179. D. IV. 12.
Froschschnecke	294. I. III. 2.
Fuchs	160. D. I. 7.
Fuchschurm	215. F. IV. 5.
Füllhorn	371. M. 1.
Fußhorn	296. I. III. 6.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

<b>G</b> artenbeetchen	238. G. II. 9.
Gartenschnecke.	397. N. IV. 2.
Gelbschmuz	177. D. IV. 8.
Gespennst	152. C. IV. 1.
Giennamschel nierenförmige	69. M. 6.
Gieskanne	457. S. 9.
Gitterhorn	254. G. VII. 4.
Gittervenus	57. K. II. 18.
Glassohrmuschel	104. P. 6.
Glasschnirkel	394. N. III. 18.
Glaspatelle	442. Q. IV. 1.
Goldmund	349. L. III. 4.
Gondel	226. F. V. 2.
Gurke glatte	208. F. III. 5.
Gürtelschnecke	388. N. III. 10.
Gürtelspindel	317. I. V. 14.
Gürtelvenus	58. K. III. 2.

<b>H</b> ahnenherz	38. G. 18.
Hahnenkamm	106. Q. I. 1.
Halbmond	409. N. VI. 6.

Hans

# Deutsche Benennungen

Seite.

Hammer polnischer	97. O. IV. 1.
Harfe	246. G. V. 1.
Hautschnecke	297. I. III. 7.
Hermelinschwanz	141. C. II. 11.
Herz dreysseitiges	30. G. 5.
— gelbes	35. G. 13.
— gelbmündiges	34. G. 12.
— glattes	35. G. 14.
— knottiges	32. G. 8.
— schuppiges	29. G. 4.
Herzmuschel breite	37. G. 16.
— geribbte	28. G. 1.
— große	34. G. 11.
— kammähnliche	37. G. 17.
Herztute	123. C. I. 1.
Hexenmeister	334. K. I. 5.
Hochrücken	185. E. 4.
Hohlohr	427. P. 1.
Holzspindel	320. I. V. 18.
Hornmerite	419. O. III. 2.
Hornschlange	455. S. 5.
Hühnerdarm	457. S. 8.
Hundszahn	451. R. 4.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

Nuth spanischer	438. Q. II. 10.
— gelber	441. Q. III. 6.
Nuthschnirkel	190. N. III. 13.

<b>S</b> ägertasche	83. O. I. 5.
Jakobsmuschel	61. O. I. 2.
Joch	184. E. 3.
Isabelle	169. D. II. 7.
Jujubenkräusel	342. K. II. 7.

<b>S</b> äfermuschel kleine	1. A. 2.
— — schuppige	1. A. 1.
Säferschnecke	341. N. I. 1.
Sammauster	98. O. IV. 3.
Sammblat	18. Q. I. 3.
Samelschnecke	276. H. III. 1.
Samelotchen	425. O. III. 11.
Sammuschel scharfröbige	91. O. II. 12.
Sammipatelle	441. Q. III. 5.
Sampfhahn	271. H. II. 2.

Samm,

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Kammvenus	61. K. III. 8.
Kanarienschnecke breite	280. H. III. 6.
— — — höckerige	275. H. II. 7.
— — — knottige	281. H. III. 7.
Kanarienvogel	251. G. VI. 2.
Kartalschnecke	380. N. II. 11.
Käsetutte	131. C. I. 8.
Kastanie große	301. I. IV. 2.
Kätzchen geflecktes	148. C. III. 6.
Käsenzunge	17. F. I. 1.
Ke gel gedrehter	377. N. II. 7.
Ke gelschnirkel eingesäumter	375. N. II. 4.
Ke il	43. I. 1.
Ke ibizen	187. E. 8.
Ke inhorn gefurchtes	251. G. VI. 3.
— — — förniges	243. G. III. 4.
Ke lasmuschel bäuchige	10. D. 1.
Ke lappmuschel gezackte	63. L. 1.
Ke lanenmuschel	112. Q. III. 5.
Ke lbbaufter	102. P. 1.
Ke leid attralisches	235. G. II. 5.
Ke löppelküssen	129. C. I. 5.
Ke nöpschen glattes	182. D. IV. 17.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite
Knottenbund	341. K. II. 5.
Knottengitter	448. Q. V. 4.
Knottennabel	410. O. I. 1.
Knottenschelle	2 32. G. II. 1.
Knottenschnecke runzelichte	303. I. IV. 6.
Knottensturmhaube	235. G. II. 4.
Kofferhörnchen weißes	244. G. IV. 1.
Kompasmuschel	82. O. I. 4.
Königsmantel	84. O. II. 1.
Kopfspatelle	440. Q. III. 3.
Korallenmuschel	85. O. II. 2.
Korbmuschel fahle	40. H. 2.
— — sprenglerische	39. H. 1.
Korbvenus	52. K. II. 10.
Kornelkirsche	206. F. III. 2.
— — eingesäumte	207. F. III. 3.
Körnerschild	435. Q. II. 6.
Kornknöpfchen	182. D. IV. 16.
Krabbenschnecke	269. H. I. 5.
Krauschnecke	289. I. II. 3.
Kräusel geförntes	343. K. II. 8.
Kräuselschnecke gebänderte	396. K. I. 8.
Kreidenschnecke	386. N. III. 7.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Kronenbäcke	154. C. IV. 4.
Krontute	125. C. I. 2.
— — schwarzbraune	126. C. I. 3.
— — weiße	130. C. I. 6.
Kröte	166. D. II. 4.
Kröten- <i>schnecke</i>	292. I. III. 1.
Kuhaug	386. N. III. 8.

<b>L</b> agermuschel	53. K. II. 12.
Lagervenus <i>punktirte</i>	60. K. III. 6.
Lagerwalze	197. F. II. 2.
Landcharte	156. D. I. 2.
Langohr	197. F. I. 2.
Lanzennadel	261. G. VIII. 9.
Laus	179. D. IV. 13.
Livreeschnecke	298. I. III. 9.
Löffel	437. Q. II. 9.
Lorbeerblatt	97. O. IV. 2.
Löventute	144. C. II. 14.
Luchoneserschnecke	274. H. II. 5.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

<b>M</b> ahlermuschel	11. D. 2.
Mangosnadel	324. I. VI. 2.
Mantel bandirter	87. O. II. 5.
—— bunter	88. O. II. 7.
—— gefleckter	90. O. VI. 9.
—— gefurchter	86. O. II. 4.
—— gewölbter	84. O. I. 6.
—— glatter	89. O. II. 8.
—— goldgelber	91. O. II. 11.
—— langer	86. O. VI. 3.
—— menningrothe	88. O. II. 6.
Marmornadel	402. N. V. 2.
Marmorohr	428. P. 3.
Masernporzellane	168. D. I. 11.
Matrosenkappe	438. Q. III. 1.
Maul krummes	299. I. III. 11.
Maulbeere gezackte	300. IV. 1.
—— lange	302. I. IV. 4.
Maulwurf	162. D. I. 9.
—— — graue	161. D. I. 8.
Maus	163. D. I. 10.
Mennonitentate	130. C. I. 7.

Men

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Menschenherz	28. G. 2.
Meereiche grosse	2. B. 1.
Meertulpe	4. B. 2.
Messerheft	14. E. 2.
Midasohr	196. F. I. 1.
Miesmuschel gefärbte	111. Q. III. 4.
—— gekerbte	110. Q. III. 2.
—— geribbte	113. Q. III. 6.
—— gemeine	110. Q. III. 3.
Milchporzellane	163. D. I. 11.
Milchschale	408. N. VI. 5.
Mittelherz	31. G. 6.
Mohr bandirter	310. I. V. 4.
Mohrenbauch	164. D. II. 1.
Mohrenkrone	225. F. V. 1.
Mönch	137. C. II. 5.
—— grauer	138. C. II. 6.
Mondschncke aschengraue	356. L. III. 1.
— — — gefielte	361. L. III. 8.
— — — knottige	257. L. III. 3.
— — — kräuselartige	355. L. II. 12.
— — — sturmhaubenartige	354. L. II. 11.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Morgenstern ausgeschnittener	307. I. IV. 10.
Mundstück verkehrtes	378. N. II. 8.
Musik wilde	221. F. IV. 12.
Muskatenblüthe	70. M. 7.
Muskatenmuß	253. G. VII. 2.
Münze guineische	172. D. IV. 2.
Münze	432. Q. II. 2.
Münze polnische	237. G. II. 7.

<b>N</b> abelberg	29. G. 3.
Nabels anecke	387. N. III. 9.
Nadel aschengraue	262. N. VIII. 1.
—— durchgestochene	216. F. IV. 7.
—— durchstochene	263. G. VIII. 2.
—— geferbte	259. G. VIII. 6.
—— gekrönte	258. G. VIII. 5.
—— gestriegelte	260. G. VIII. 7.
—— knottige	282. H. IV. 1.
—— rostfarbige	258. G. VIII. 4.
—— umwundene	261. G. VIII. 10.

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Nadel weisse	257. G. VIII 3.
Nadelfeile	329. F. IV. 2.
Nadelwalze rauhe	213. F. VI. 8.
Nagelherz	31. G. 7.
Nähnadel	260. G. VIII. 8.
Napfischnecke blaue	436. Q. II. 7.
— — — dreykielige	439. Q. III. 2.
— — — einseitige	440. Q. III. 4.
Narrenkappe	66. M. I.
Nassauer	347. L. II. 2.
Neptunsdose	82. Q. I. 3.
Nerite braune	413. O. I. 3.
— — — brunttragende	418. O. III. 1.
Nezhorn	255. G. VII. 5.
Nezschnecke	299. I. III. 10.
Neztute bandirte	138. C. II. 7.
Notenschnecke	218. F. IV. 10.

**N**chsendarm

456. S. 7.

Nchsenherz unächtes

49. K. II. 6.

Del.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Deßkuchen eckiger	295. I. III. 6.
— — — geribbter	295. I. III. 4.
— — — knottiger	194. I. III. 3.
Deßkrug	353. L. II. 50.
Ohr gestreiftes	428. P. 2.
Ohrhorn	407. N. VI. 3.
Olivenkern	210. F. III. 7.
Olivenwalze	198. F. II. 2.
Orangenkegel	133. C. I. 11.
Oranienboprer	147. C. III. 4.
Ost, un: Westmuschel	36 G. 15.

<b>M</b>	
abstkrone	217. F. IV. 9.
Pagodenschnecke	350. L. II. 6.
Pantoffel	431. Q. I. 2.
Papierhaube	236. G. II. 6.
Papierrolle	188. E. 9.
Pavusmuschel	113. Q. III. 7.
Pellerontnerice	422. O. III. 7.
Perlmutter	108. Q. II. 1.
Perspektivschnecke	333. K. I. 3.

Pferz

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Pferdefuß	67. M. 3.
Pferdehuf dorniger	71. M. 9.
Pharaoschnecke	333. K. I. 4.
Pilgrimsmuschel	8. O. I. 1.
Pimpelchen	303. I. IV. 5.
Platwirbel	147. C. III. 5.
Poda-graschnecke	268. H. I. 4.
Polierzahn	451. R. 5.
Porzellanblase	193. E. 15.
Posthorn	122. B. 2.
Prinzenfahne	193. E. 16.
Purpurhorn gehörntes	286. I. I. 5.
Purpurschnecke dreyflüglige	287. I. II. 1.
— — — dreyseitige	288. I. III. 2.
— — — vieleckige	292. I. II. 6.
Pyramide glatte	330. K. I. 1.
— — knottige	331. K. I. 2.

**S**autenkörbchen

76. N. III. 2.

Nebhyn

229. G. I. 2.

Reisbrey Mondschnecke

346. L. I. 2.

Reis-

# NOMENCLATOR GERMANICVS,

	Seite.
Reiskorallenporzellane	180. D. IV. 14.
Ring	173. D. IV. 3.
Rinne	13. E. I.
Röhre dreyeckige	452. S. 1.
Rostfleckchen	177. D. IV. 9.
Rothmund	148. G. V. 3.
Rübe	191. E. 13.
Rübe dicke	306. I. IV. 9.
—— langschnabelige	312. I. V. 6.
Rudolphsschnecke	247. G. V. 2.
Runzelbund	352. L. II. 8.
Runzelgitter	446. Q. V. 2.
Runzelklappe	100. O. IV. 6.

<b>S</b> afranfräusel	343. K. II. 9.
Säge	42. I. 4.
Salzkornporzellane	166. D. II. 3.
Sammelmuschel	78. N. IV. 2.
Sandpfeife	455. S. 6.
Sandtelline	25. F. III. 1.
Sandtrutte	143. C. II. 13.

# Deutsche Benennungen.

Sattel polnischer	101. O. IV. 7.
Säumchen gefaltenes	241. G. III. 1.
Scharfrinne	366. L. V. 2.
Schreibenschnecke	375. N. II. 3.
Schellenhorn	228. G. I. 1.
Schellenschnecke französische	195. E. 17.
Schiffsboot dicker	121. B. 1.
Schiffsfahne	345. K. III. 2.
Schildkrötennapf	442. Q. IV. 2.
Schildkrötenpocke	5. B. 5.
Schildkrötenporzellane	159. D. I. 5.
Schildkrötentute	137. C. II. 3.
Schildmuschel achte	62. K. IV. 1.
Schindchen	24. F. II. 5.
Schinke edle	116. R. 2.
— — geräucherte	116. R. 1.
— — lange	117. R. 4.
Schlammischnacke	384. N. III. 4.
Schlangehaut	353. L. II. 9.
Schlangehorn	390. N. III. 12.
Schlangekopf	103. P. 5.
— — — der groſſe	165. D. II. 2.
Schlauchdattel dicke	202. F. II. 3.
Schminckpfläſterchen	302. I. IV. 3.

Schnauz

# NOMENCLATOR GERMANICVS

Schnauzennadel	323. I. VI. 1.
Schnepfentopf dorniger	286. I. I. 4.
— — — gezackter	285. I. I. 3.
Schnepfennadel gedörnte	326. I. VI. 5.
Schnepfenschnabel	282. I. I. 1.
Schnirkel gesteckter	380. N. II. 12.
— — — verkehrter	391. N. III. 15.
Schnirkelmondschnecke	355. L. II. 13.
Schnirkelnadel abgestuzte	401. N. V. 1.
— — — braune	404. N. V. 5.
— — — gefaltene	403. N. V. 3.
— — — gefleckte	404. N. V. 4.
Schnirkelscheibe	382. N. III. 2.
Schnirkelschnecke ausgeschnittene	378. N. II. 9.
— — blaue	392. N. III. 16.
— — bunte	398. N. IV. 4.
— — dickschalige	408. N. VI. 4.
— — gemalte	397. N. IV. 3.
— — lebendig gebährende	393. N. III. 17.
— — offene	399. N. IV. 5.
Schnurbund	342. K. II. 6.
Schnurwalze	212. F. IV. 1.
Schraube alte	567. L. V. 4.
— — bunte	365. L. V. 1.

Schup.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Schuppenbezoar	238. G. II. 8.
Schüffelchen	90. O. II. 10.
Schwalbe	170. D. III. 1.
Schwarzang	178. D. IV. 11.
Schwarzohr	400. D. IV. 7.
Schweizerhose gezackte	277. H. III. 2.
Schwimmuschnecke breitsfurchige	426. O. III. 13.
— dicklippige	412. O. I. 2.
— gesiederte	420. O. III. 5.
— gefurchte	416. O. I. 7.
— geribbte	424. O. III. 10.
— glatte	421. O. III. 6.
— grüne	419. O. III. 3.
— stumpfe	423. O. III. 8.
Seenuß	68. M. 4.
Seepocke	3. B. 2.
Seetonne	344. K. III. 1.
Segler breitkieliger	120. A. I. β.
— papierner	119. A. I.
— schmalkieliger	119. A. I. α.
Silbermund bunter	359. L. III. 5.
— geribbter	358. L. III. 4.
— grüner	348. L. II. 3.

# MONENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Skorpionschnecke	290. I. II. 4.
Smaragdschnecke	249. G. V. 5.
Sommerprosse	271. H. II. 1.
Sonnenhorn	337. K. I. 10.
Sonnenschirm	436. Q. II. 8.
Sonnenstrahl gestreifter	18. F. I. 3.
— glatter	23. F. II. 4.
— kleiner	25. F. II. 7.
Spalte	445. Q. V. 1.
Spielmuschel	52. K. II. 7.
Spindel französische	309. I. V. 3.
— gefleckte	317. I. V. 13.
— gezackte	312. I. V. 7.
— javanische	309. I. V. 2.
— indische	311. I. V. 5.
— nordische	315. I. V. 11.
— rothbraune	318. I. V. 15.
— zweyfielige	314. I. V. 10.
Spinne	283. I. I. 2.
Spizdattel	203. F. II. 4.
Spizsäule	338. K. II. 1.
Spizenrolle	150. C. III. 8.
Sporn	351. L. II. 7.

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Stachelnadel höckerige	325. I. VI. 3.
— schwarze	329. I. VI. 9.
Staatenfahne	189. E. 10.
Steinbohrer	7. C. 1.
— geribbter	8. C. 2.
Steinchen	248. G. V. 4.
Steinkern	92. O. II. 13.
Steinmuschel	109. Q. III. 1.
Steckmuschel gedornite	117. R. 3.
Sternnadel	265. H. I. 1.
Sternpatelle	432. Q. II. 1.
Sternporzellane	178. D. IV. 10.
Strahlgitter	447. Q. 5. 3.
Strahlpatelle	443. Q. IV. 3.
Strahlscheibe	61. K. III. 7.
Strahlscheide blaue	16. E. 4.
Strandmondschnecke	346. L. I. 1.
Strandnerite	417. O. II. 2.
Stricknadel	256. G. VIII. 1.
Strohhut	444. Q. IV. 4.
Stümpfchen	42. I. 3.
Stumpfmuschel stachlichte	41. I. 2.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Sturmhaube dicklippige	230. G. I. 3.
— gefurchte	230. G. I. 4.
— gestricke	233. G. II. 2.
— rothe	234. G. II. 3.
Äsche rauhe	96. O. III. 4.
— wellenförmige	94. O. II. 16.
Äubchen	279. H. III. 4.
— beutendes	209. F. III. 6.
— traurendes	211. F. III. 9.
Äubeney	186. E. 6.
Zeichhorn	406. N. IV. 2.
Zellmuschel blaßrothe	21. F. II. 1.
— dreyeckige	27. F. III. 4.
— dunkelrothe	22. F. II. 2.
— eckige	19. F. I. 4.
— runzelichte	18. F. I. 2.
— scharfrandige	22. F. II. 3.
— schuppige	26. F. III. 2.
— unächte	20. F. I. 6.
Ziegernadel	257. G. VIII. 2.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Tiegerporzellane	167. D. II. 5.
Tiegertute	127. C. I. 4.
Tiegerzunge	158. K. III. 1.
Topf	227. F. V. 3.
Treppe	250. G. VI. 1.
Trinkschale	445. Q. IV. 6.
Tritonschnecke	316. I. V. 12.
Trommelschraube	368. L. V. 6.
— gestreifte	368. L. V. 5.
Tulpe	153. C. IV. 3.
Tute guineische	136. C. II. 4.

<b>V</b> ase	221. F. IV. 13.
— gezackte	223. F. IV. 15.
— rothmündige	222. F. IV. 14.
Venusmuschel ächte	44. K. I. 1.
— aderige	59. K. III. 4.
— ausgefahlte	48. K. II. 4.
— breitblättrige	48. K. II. 3.
— gereifte	47. K. II. 2.
— schiefe	49. K. II. 5.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Venusmuschel warzige	46. K. II. 1.
— weißbackige	55. K. II. 5.
— weitlippige	54. K. II. 13.
— wellenförmige	54. K. II. 14.
Vielfußschnecke	270. H. I. 16.
Vogeldarm	454. S. 4.
Vogelfuß	266. H. I. 2.
Vogelmuschel	114. Q. III. 8.
Vortreppe	320. I. 5. 17.


Wachsschnirkel	374. N. II. 2.
Wafelmuschel	56. K. II. 17.
Waldhorn	383. N. III. 3.
Waldschnecke	395. N. IV. 1.
Walffischpocke	4. B. 4.
Walzenporzellane	169. D. II. 8.
Warzendotter	415. O. I. 6.
Warzenschnirkel	391. N. III. 14.
Waschbecken	66. M. 2.
Weberspuhl kleiner	184. E. 2.

# Deutsche Benennungen

	Seite
Weib altes	45. K. I. 2.
Weilchen armes	210. F. III. 8.
Weinbergsschnecke gemeine	385. N. III. 5.
— linksgewundene	385. N. III. 6.
Weißaug	175. D. IV. 6.
Weitaug	160. D. I. 6.
Wellenhorn	253. G. VII. 3.
Wellenmerite	425. O. III. 10.
Wellenspindel	322. I. V. 20.
Wendeltreppe ächte	362. L. IV. 1.
— gemeine	363. L. IV. 2.
Wirbelhorn	389. N. III. 11.
Wirbelschnecke	335. K. I. 7.
Widderhorn	383. N. III. 3.
Wolfszahn	450. R. 3.
Wollenbacke	153. C. IV. 2.
Wollenrolle	149. C. II. 7.
Wulst	186. E. 5.
Wulstknöpfchen	338. K. II. 2.
Würfelkräusel	336. K. I. 9.


# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
<b>Z</b> ähnen gestreiftes	449. R. 2.
Zahnschraube gefleckte	369. L. V. 7.
Zahnwirbel	381. N. II. 13.
Ziegelherz	32. G. 9.
Zirkelbohrer	145. C. III. 2.
Zirkelscheibe	59. K. III. 3.
Zwibelschale	102. P. 2.
Zwirntute	132. C. I. 10.



# NOMENCLATOR BELGICVS.

## Holländische Benennungen.



	Pag.
<b>A</b> doublet, de griekische	53. K. II. 12.
Aardbesie	33. G. 10.
Achaat - gaaper	51. K. II. 8.
Achaatje	200. F. II. 2. η.

Achaat-

# Holländische Benennungen.

Pag.

Achaat - peer	319. I. V. 16.
Achaat - toot	154. C. IV. 3.
Adama - doublet	93. O. II. 14.
Admiral , opper	134. C. II. 2.
Alykruik	346. L. I. 1.
— geworte	426. O. III. 13.
Arabische Lettershorn	157. D. I. 3.
Arakans - garen	132. C. I. 10.
Arke Noachs foort.	74. N. II. 2.
Argus, dubbelde	158. D. I. 4.
Argus Oogen, gebande	295. I. III. 4.

## B

Baardnyper .	12. D. 4.
Babilonse Tooren	308. I. V. 1.
Bacassan doublet	20. F. I. 3.
Bagyne - drolle	331. K. I. 2.
Bak gekroonde	225. F. V. 1.
Bakje bruingebandeerd	193. E. 15.
Bandpen	214. F. IV. 4.
— genobelde	216. F. IV. 6.
Banket hammetje	24. F. II. 5.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Bastert - Argus	156. D. I. 1.
Bastert - Oranje Admiral	146. C. III. 3.
Bastert - tygers katje	134. C. II. 1.
Bastert - Wewers spoeltje	184. E. 2.
Beddetje, gestreepte	239. G. II. 10.
Belhorn, fransche	195. E. 17.
— geknobbelde	232. G. II. 1.
— geplekte	231. G. I. 5.
— geribbde	228. G. I. 1.
Bernsteen - Oester	103. P. 3.
— paarsche	102. P. 3.
Beuldoulet	15. E. 3.
Bezaan Knop, getaakte	318. I. VI. 7.
Bezaantje	278. H. III. 3.
— opgerolde	279. H. III. 5.
Bezoar, geschubde	238. G. II. 8.
— gevlackte	239. G. II. 9.
Boerenjonge	252. G. VII. 1.
Boeren Myfik	142. C. II. 12.
Boetje	210. F. III. 7.
Bokje	347. L. II. 1.
Bonne je	432. Q. II. 1.
Bonje	208. F. III. 4.

# Holländische Benennungen

	Pag.
Bootshaak Wuiſje	267. H. I. 3.
Boſtrappen	320. I. V. 17.
Boterweg	140. C. II. 9.
Brana Hoorn dubbelde	291. I. II. 5.
Brandvlakje	176. D. IV. 7.
Broinet - toot	151. C. III. 9.
Buitslakje	338. K. II. 1.
Bultje	279. H. III. 4.
— gevoord	250. G. VI. 1.

<b>C</b> aſtanje, bandeerde	301. I. IV. 2.
-----------------------------	----------------

<b>D</b> aadel	198. F. II. 2.
— ſwarte	201. F. II. 2.
Davidſ harp	246. G. V. 1.
Diklip	339. K. II. 3.
Dokje huiſje	119. A. 1.
Dolphyn, getakte	360. L. III. 6.
Doyer, platte	415. O. I. 5.

Draakje

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Draakje	175. D. IV. 5.
Duifje, broedende	209. F. III. 6.
Duizend been	270. H. I. 6.

<b>E</b> cken - houts toot	140. C. II. 10.
Eende - Schulpe	6. B. 6.
Ezeltje	171. D. III. 2.

<b>F</b> oelie - Bladeren	70. M. 7.
Fonteinbak	66. M. 2.
Fortresse	434. Q. II. 3.

<b>G</b> apper, eeviger	8. C. 2.
Gelsmetje	177. D. IV. 8.
Geneefche toot	136. C. II. 4.
Gnemoe hoorn	317. I. V. 13.
Goldlaken	150. C. III. 8.

Goud-

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Goudmond	349. L. II. 4.
Grasje	432. Q. II. 2.

<b>H</b> aanekam	106. Q. I. 1.
— getakte	107. Q. I. 2.
Hammerje, gedoord	117. R. 3.
Hart, blaasagtig	37. G. 16.
Hart toot	124. C. I. I. $\alpha$ .
— roodt	124. C. I. I. $\beta$ .
Hermelin Staart	141. C. II. 11.
Holzeeor, groot	427. P. 1.
Honds darm	456. S. 7.
Hoogruggetje	186. E. 5.
Hornslangetje	457. S. 8.

<b>J</b> aager - Weytafeh	83. O. I. 5.
Jacobs - doublet, spaanfche	81. O. I. 2.
Jacobs Kruck	226. F. V. 2.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Jacobs - schulp.	81. O. I. 1.
Jamboeze, witte	185. E. 4.
Indian	311. I. V. 5.
Jokje	185. E. 3.
Joppe - doublet	82. O. I. 3.
Isabelle	169. D. II. 7.
Juffertje, rood	25. F. II. 7.

<b>K</b> aaphorn	156. D. I. 2.
Kaas, groene	132. C. I. 9.
Kamelhoorn	276. H. III. 1.
Kamelotje	425. O. III. 11.
Kanartje, gebande	275. H. II. 7.
— geblomde	280. H. III. 6.
— gebulde	281. H. III. 7.
Kapje, gedooord	435. Q. II. 5.
Kapje, geele	444. Q. IV. 4.
— — gestraalte	436. Q. II. 7.
Karkal	380. N. II. 11.
Kasket, graeuwe	241. G. III. 2.

# Holländische Benennungen

	Pag.
Katetonge	18. F. I. 1.
Katje, geplekte	148. C. III. 6.
—— blaauwe	170. D. III. 1.
Kauris blaauwe	173. D. IV. 3.
—— gemeene geele	173. D. IV. 2.
Kemphaantje	271. H. II. 2.
Kievits - Ey	188. E. 8.
—— witte	187. E. 6.
Kindje, gebakerde	364. L. IV. 3.
Kinkhorn	316. I. V. 12.
Kliphorn, getygerde	167. D. II. 5.
Knobbelhorn	321. I. V. 19.
—— bonte	354. L. II. 10.
Knoll, geknobbelde	306. I. IV. 9.
—— langestaarte gladde	312. I. V. 6.
Knollhorn	191. E. 13.
Kofferhoortje	244. G. IV. 1.
Kokhaan, bonte	38. G. 18.
Kompas - Schulp	82. O. I. 4.
Königs Mantel	84. O. II. 1.
Koral - doublet	85. O. II. 2.
Korelye - Knoopje	182. D. IV. 16.
Kornoelkersje gestippelte	207. F. III. 2. β.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Kornoeltje, gebandeerde	206. F. III. 2. 2.
Kousdoublet, getireepte	45. K. I. 3.
Krabbe, geele	269. H. I. 5.
Kroon - hoorn	125. C. I. 2.
— tuetee	126. C. I. 3.
Knipers - Boor	192. E. 14.
— gegranuleerde	145. C. III. 1.
— gladde	251. G. VI. 2.
— witte gevoorde	145. C. III. 2.
Kwaker, gestraalde	52. K. II. 10.
Kwalle - Bootje	393. N. III. 16.

<b>L</b> andcharten, westindische	144. C. II. 14.
Laurierblad	97. O. IV. 2.
— gekamd	108. Q. I. 3.
Lazarus Klappen, getakte	64. L. I.
Leger, turkische	61. K. III. 6.
Letterschulp, langaagtige	62. K. IV. 1.
Livrey - hoorn	298. I. III. 9.
Lohoensche Hoorntje	274. H. II. 5.

# Holländische Benennungen

	Pag.
Lotskap	439. Q. III. 1.
<b>M</b> aagt - Bloem	75. N. III. 1.
Malpriem	256. G. VIII. 1.
Mantel, gebandeerde	87. O. II. 5.
— — gestippelte	89. O. II. 7.
Mauger Naalde	324. I. VI. 2.
Mazelen	168. D. II. 6.
Mennonist - toot	130. C. I. 7.
Meshammer	97. O. IV. 1.
Messehecht	14. E. 2.
Midas - Oor	196. F. I. 1.
Modervlakje	244. G. III. 5.
Moerberzie, langverpige	302. I. IV. 4.
Moerbey, getakte	300. I. IV. 1.
— — graeuwe	276. H. II. 8.
Mol	162. D. I. 9.
— graeuwe	161. D. I. 8.
— roode	161. D. I. 7.
Monniks - Kappe	216. F. IV. 7.
Mossel	110. Q. III. 3.
— breede purpuragtige	113. Q. III. 5.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Muis	163. D. I. 10.
Munnik graeuwē	201. F. II. 2. 2.
— —	137. C. II. 5.
Musikhoorn	218. F. IV. 10.
— — wilde	221. F. IV. 11.
Muts poolſche	171. D. III. 3.
— —	237. G. II. 7.

<b>N</b> aalde - pen	260. G. VIII 7.
Nagel doublet , gedoornte	31. G. 7.
Nagel - ſchulp	32. G. 9.
Navel - Slak	387. N. III. 9.
— —	410. O. I. 1.
Net - tootje	138. C. II. 7.
Noachs Arck , rechte	73. N. II. 7.
Noote Moskat , getakte	253. G. VII. 3.

<b>O</b> cean - hoorn	289. I. II. 5.
Oeſter	99. O. IV. 2.

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Oester gedraaide	72. N. I. 1.
—— okergeele	71. M. 8.
Offerhoorn, witte	224. F. IV. 16.
Oiſtelhoortje	304. I. IV. 7.
Olyfaats, tand	449. R. 1.
Olyhoorn, diklippige	230. G. I. 3.
Olykock, gebulde	294. I. III. 3.
Oorhoorn	299. I. III. 11.
Oorſchulp, witte	408. N. VI. 5.
Oranje - Mantel	92. O. II. 12
Orgelpypen	13. E. 1.
Oſt en Weſt - doublet	36. G. 15.
Oude Wyfs ſchulp gerimpelde	45. K. I. 2

<b>P</b> aadehoorn	292. I. III. 1.
Paardevoetje	67. M. 3.
Paertje	182. D. IV. 17.
Pantofeltje	431. Q. I. 2.
Papier - turkſe, zonder lippen	236. G. II. 6.
— — — porcellain horn	164. D. I. 12.
Papier-Kasket, volwaſſe turkſche	235. G. II. 4.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Papiere Nautilus, breed kielde	120. A. I. 3.
Parlslakke	121. B. 1.
Patelle getepelte	440. Q. III. 3.
— — griekifche	446. Q. V. 2.
Patrys horn	229. G. I. 2.
Pauze Kroon	218. F. IV. 9.
— — — westindifche	325. I. VI. 4.
Pelicans - Poot	266. H. I. 2.
Pen, gekartede	258. G. VIII. 5.
— — — omwondene	261. G. VIII. 10.
Pennhoorn	217. F. IV. 8.
— — rauwe	213. F. IV. 2.
Peer, gedroyede	297. I. III. 8.
Perle - moer fchulp	108. Q. II. 1.
— — — — lange	429. P. 4.
Perspectiv - hoorn	333. K. I. 3.
Petool - hoorn	343. L. II. 2.
Pickenier	261. G. VIII. 9.
Pimpeltje	203. I. IV. 5.
Piffeped	181. D. IV. 15.
Podagra - Krefst	268. H. I. 4.
Poelorontje	422. O. III. 7.
Pofferdoubled, gerib'd	78. N. IV. 1.

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Pokje	174. D. IV. 4.
Porphyrt Daadel	197. F. II. 1.
Porphyrtsteene Daadel	200. F. II. 2. 5.
Porcelain hoorn	183. E. 1.
Poithoorentje	122. B. 2.
Polthoorn , europische	382. N. III. 1.
— — gebandeerde	388. N. III. 10.
Prince Begræfenis	199. F. II. 2. 9.
Prince Robertshoorn	334. K. I. 4.
Prince - Vlag	193. E. 16.
Pruim	209. F. III. 5.
Purper - Hoorn gebandeerde	287. I. I. 5.

<b>P</b> aap	312. I. V. 7.
Ramshoorn	383. N. III. 3.
Raspdoulet	95. O. III. 2.
Remies	25. F. III. 1.
Rivier Pauze Kroon	405. N. VI. 1.
Rood . bandje	190. E. II.
Rood - Oog	418. O. III. 1.
Rootshoorn met Moesjeses	302. I. IV. 3.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Rorzdoulet	71. M. 9.
Rys - Korrel	180. D. IV. 14.
Ryſtenbry - hoorentje	243. G. III. 4.
<b>S</b> cheppertje	283. I. I. 1.
Scherfje	49. K. II. 5.
Shild , getygerd	442. Q. IV. 2.
Schildpad - hoorn	159. D. I. 5.
Schildpad Luis	5. B. 5.
Schildpad - toot	136. C. II. 4.
Schildpaſtaert , gedoorende	305. I. IV. 8.
Schout by Nagt	125. C. I. I. 7.
Schwitzersbroek , capitaale	222. F. IV. 14.
— — — — getakte	223. F. IV. 15.
Scorpioentje	290. I. II. 4.
See - Noot	78. N. IV. 2.
Slange - Kop	165. D. II. 2.
— — — — kleene	164. D. II. 1.
Slangen Vellehoorn	352. L. II. 9.
Slangetje	390. N. III. 12.

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Slek - hoorn	416. O. I. 6.
Slet	61. K. III. 7.
Sluik - daadel	202. F. II. 3.
Slyk - Slek	384. N. III. 4.
Snippckop , gedoornde	285. I. I. 3.
— getakte	286. I. I. 4.
Snuite - pen, gedoornde	326. I. VI. 5.
Soldat	358. L. III. 3.
Sooftolatje	177. D. IV. 9.
Speeldoublet	50. K. II. 7.
Speldewerk kuffen	129. C. I. 5.
Spinnekop	284. I. I. 2.
Spockje	152. C. IV. 1.
Spoor	351. L. II. 7.
Spraetje	271. H. II. 1.
Staate Vlagetje	189. E. 10.
Starre - pen , dikke	265. H. I. 1.
Steenbikker	374. N. II. 1.
Steen - moffel	109. Q. III. 1.
Steenfcheede	7. C. I.
Sterretje	178. D. IV. 10.
Stombje	42. I. 3.
Stormhoed , gebreide	233. G. II. 2.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Stormhoed, geribd westindische	236. G. II. 5.
— — roode	234. G. II. 3.
Strand - Doyer	414. O. I. 4.

<b>T</b> abaks - pip	310. I. V. 3.
Tand, ploedige	420. O. III. 4.
Teepel bak	227. F. V. 3.
Telline, platzydige	24. F. II. 5.
Tellmoffel, roode with straalige	23. F. II. 4.
Toll, gevlake	331. K. I. 1.
— langleevende	351. L. II. 6.
Toornje	215. F. IV. 5.
Toover - Slak	373. N. I. 1.
Top - Slak	391. N. III. 15.
Tovenaar	334. K. I. 5.
Transparant	105. P. 7.
Trommel - Schroef	368. L. V. 5.
Tuitje, witte	323. I. VI. 1.
Tulbande	340. K. II. 4.
Tulband, gerimpelde	352. L. II. 8.
Tulpen	4. B. 3.

Tyger-

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Tyger - pen , dunne	257. G. VIII. 2.
Tyger - tong , wilde	58. K. III. 1.

<b>V</b> aas, witte	221. F. IV. 13.
Vellhorn	297. I. III. 7.
Venus - doublet , geribde	28. G. 1.
Venus hart	28. G. 2.
— driezydig	30. G. 5.
Venus Schagt	457. S. 9.
Venus schulp , rechte met Hair	44. K. I. 1.
Vjſch huifje	430. Q. I. 1.
Vlagetje	345. K. III. 2.
Vleermuis	219. F. IV. 11.
Vleeshoorn	273. H. II. 4.
Vleugelhoorn , getakte	277. H. III. 2.
Vleugelhoorntje	287. I. II. 1.
— geplekte	288. I. II. 2.
Vliegge ſchettje	143. C. II. 13.
Vloerken, italianſche	131. C. I. 8.
Voethoorn	196. I. III. 6.
Vogeltje	114. Q. III. 8.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Vorfchen - poppe	294. I. III. 2.
Vyg , fpaanfche	190. E. 12.
<b>W</b> afelyfer	56. K. II. 17.
Wenteltrap	362. L. IV. 1.
Wenteltrapje	363. L. IV. 2.
Whulk	254. G. VII. 3.
— noordfche	315. I. V. 11.
Witooge	175. D. IV. 6.
Wit - rugge , cartageenfche	167. D. II. 4.
Wolfstand, witte	451. R. 4.
Wolkbakje	153. C. IV. 2.
Wolkhoorn	149. C. III. 7.
Wolkje	154. C. IV. 4.
Wydmonder	247. G. V. 2.
Wyd - Oog	160. D. I. 6.
Wyfje , kleene, van den Argus	172. D. IV. 1.
Wynyards - Slak	385. N. III. 5.
Wyzer	272. H. II. 3.


# Hollandsche Benennungen.

Pag.

<b>Z</b> aaagertje	42. I. 4.
Zadel, poolſche	101. O. IV. 7.
Zandmoſſel	114. Q. III. 7.
Zeeohr, geſtrepte	428. P. 2.
Zeepocke	3. B. 2.
Zeepuiſten	2. B. 1.
Zeeſchelling	4. B. 4.
Zeeslangetje	455. S. 5.
Zeeton	334. L. II. 3.
Zes Vloog	179. D. IV. 13.
Zilverlaken	152. C. IV. 1.
Zilvermond	348. L. II. 3.
— — bonte	359. L. III. 5.
— — geplekte	358. L. III. 4.
Zoomtje, geſtreepte	241. G. III. 2.
— gladde	242. G. III. 3.
Zooneltraal	19. F. I. 3.
— rooſe roodt	16. E. 5.
— violet blauwe	16. E. 4.
Zotskap	66. M. 1.
Zoute Koreltje	166. D. II. 3.

NOMENCLATOR GALLICVS.

Französische Benennungen.



<b>A</b> dmiral, faux orangé	146. C. III. 3.
— — — grand	134. C. II. 2.
Agate bossue	202. F. II. 3.
Agathine	319. I. V. 16.
Aigrette	221. F. IV. 13.
Aile d'ange	271. H. II. 2.
Aile de papillon	136. C. III. 4.
Ailée bossue	275. H. II. 7.
—— grande	277. H. III. 2.
Alene	261. G. VIII. 9.
Amande	62. K. III. 8.
Amande a cils	74. N. II. 2.
Ane ; petit	171. D. III. 2.
Antale	451. R. 4.
Araignée femelle	267. H. I. 3.
— male	269. H. I. 5.
Arche de Noe	73. N. II. 1.

# Französische Benennungen.

	Pag.
Arculaire blanc	244. G. IV. 1.
Argus a boutons	295. I. III. 4.
Argus, faux	157. D. I. 3.
— — grand	158. D. I. 4.
— — petit	172. D. IV. 4.
Arlequine, la fausse	157. D. I. 3.
Arrofoir	457. S. 9.
Assemblage de bojaux	454. S. 3.
Astrolepas	432. Q. II. 1.

<b>B</b> aquet bandé	193. E. 15.
Becasse epineuse	284. I. I. 2.
Bigourneau	346. L. I. 1.
Bistournée	72. N. I. 1.
Bois de chene	140. C. II. 10.
Bonnet de Dragon	439. Q. III. 1.
— polonois	171. D. III. 2.
	237. G. II. 7.
Bossue	185. E. 3.
Bouche d' Argent	348. L. II. 3.
— — — bariolée	358. L. III. 4.

Bouche

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Bouche d'or	349. L. II. 4.
— — petite	186. E. 5.
Bouclier de Tortue	442. Q. IV. 2.
Bout de Chandelle	130. C. I. 7.
Bouton de Camifole.	334. K. I. 4.
	338 K. II. I.
Brocard de Soye	154. C. IV. 3.
Brunette	151. C. III. 9.
Buccin unique	313. I. V. 8.
Bulle d'eau	187. E. 6.

<b>C</b> abochon	430. Q. I. 1.
Cadran	333. K. I. 3.
Came coupée	41. I. 1.
— marquée de Verges	50. K. II. 7.
— truitée	51. K. II. 8.
Campement turque	61. K. III. 6.
Carte geographique	156. D. I. 2.
Casque Bezoard	241. G. III. 2.
— cannelé, gros	239. G. II. 10.
— pavé	238. G. II. 8.

Cas-

# Französische Benennungen.

Pag.

Casque plume	236. G. II. 6.
— trinangulaire	235. G. II. 4.
— tricoté	233. G. II. 2.
— truité	239. G. II. 9.
— tuberculé	232. G. II. 1.
Chagrin	18. F. I. 1.
Chameau	276. H. III. 1.
Chataigne a bandes	301. I. IV. 2.
Chausse trappe	223. F. IV. 15.
— — —	289. I. II. 3.
Chaeuve Souris	219. F. IV. 11.
Chenille blanche	223. I. VI. 1.
Chicorée	291. I. II. 5.
Clonille	46. K. II. 1.
Cloporte	181. D. IV. 15.
Cloud	256. G. VIII. 1.
Cocombre pointée	208. F. III. 4.
Coeur allongée	69. M. 5.
Cocur en Arche de Noe	75. N. III. 1.
Cocur de boeuf	66. M. 1.
— epincux	31. G. 7.
— tuillé	32. G. 9.
Cocur enflé	37. G. 16.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Coeur triangulaire	30. G. 5.
— de Venus	28. G. 2.
Colique	173. D. IV. 3.
Conque anatifere	6. B. 6.
— exotique	28. G. 1.
— de St. Jaques, bariolée	81. O. I. 1.
— persique	247. G. V. 2.
— de Venus, a pointes	44. K. I. 1.
Contre Admiral	125. C. I. 1. y.
Coq bigaré	38. G. 18.
Coquette	302. I. IV. 3.
Coquille de St. Jaques d'Espagne	81. O. I. 2.
Coralline	85. O. II. 2.
Cornalline	200. F. II 2. η.
Corne d'Amon	122. B. 2.
Cornouille fasciée	206. F. III. 2. α.
— ponctuée	207. F. III. 2. β.
Couronne d'ethiopie	225. F. V. 1.
— — imperiale	125. C. I. 2.
Crapaud	167. D. II. 4.
Crete de Coq	107. Q. I. 2.
Cuiller de Neptune	226. F. V. 2.

# Französische Benennungen.

	Pag.
Cuillere	437. Q. II. 8.
Culotte de Suisse	294. I. III. 3.

<b>D</b> ail	7. C. I.
Damier	127. C. I. 4.
Datte	109. Q. III. 1.
Dauphin	360. L. III. 6.
Degrés bordés	297. I. III. 8.
Dent de loup	450. R. 3.
Dentale	449. R. 1.
Drap d'argent	236. G. II. 5.
— mortuaire	199. F. II. 2. 8.
— d'or	150. C. III. 8.
— a reseau	139. C. II. 8.

<b>E</b> braique	221. F. IV. 12.
— — —	142. C. II. 12.
— la fausse	134. C. II. 1.
Ecaille de tortue	136. C. II. 3.
Ecorchée	149. C. III. 7.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Ecriture arabique	62. K. IV. 1.
— — grecque	53. K. II. 12.
l'Emeraude	249. G. V. 5.
Enfant au maillot	364. L. IV. 3.
Entonnoir	445. Q. IV. 6.
l'Eperon	351. L. II. 7.
l'Eventail	82. O. I. 4.

<b>F</b> aitiere	66. M. 2.
Feuille	108. Q. I. 3.
— de Choux	67. M. 3.
— de Laurier	97. O. IV. 2.
Figue	190. E. 12.
Flamboyante	129. C. I. 5.
Foret	260. G. VIII. 7.
Forteresse	434. Q. II. 3.
Fraise rouge	33. G. 10.
Fripiere	355. L. II. 12.
Furie flamboyante	77. N. III. 3.
Fuseau	310. I. V. 3.
— étoilé	265. H. I. 1.

# Französische Benennungen.

	Pag.
<b>G</b> ateau feuilleté	70. M. 7.
Gibeciere en Manteau	83. O. I. 5.
Gland de <sup>e</sup> mer rayé	3. B. 2.
— — tulipe	2. B. I.
— — turban	4. B. 3.
Gondolée rayée	189. E. 10.
Gourgandine	51. K. II. 9.
Grelée	166. D. II. 3.
Grenouillette	294. I. III. 4.
Grimace	299. I. III. 11.
Gueule de Loup	373. N. I. 1.
— — noire	274. H. II. 5.
— — de souris	115. Q. III. 6.
Guilochée	26. F. III. 2.

<b>H</b> arpe	246. G. V. 1.
Herisson	300. I. IV. 1.
Hermine	132. C. I. 9.
Hirondelle	114. Q. III. 8.
Huitre	99. O. IV. 4.
— d'ambre jaune	103. P. 3.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

Pag.

Huitre ecaillée a feuilles

couleur de citron

71. M. 8.

— électrique

102. P. 2.

— épineuse

64. L. 1.

**J**amaïque

60. K. III. 5.

Jambonneau épineux

117. R. 3.

Indienne

311. I. V. 5.

Isabelle

169. D. II. 7.

**L**ampe antique

379. N. II. 10.

Lanterne rouge rayonnée de blanc

16. E. 5.

Lard

305. I. IV. 8.

Leopard rouge

124. C. I. 1.  $\alpha$ .

Lepas granuleux

435. Q. II. 5.

Lévantine

46. K. I. 4.

Lievre

159. D. I. 5.

**M**anche de Couteau

13. E. 1.

— — courbée

15. E. 3.

# Französische Benennungen.

	Pag.
Manche de couteau femelle	13. E. 2.
Monteau bandé	87. O. II. 5.
— — ducal	84. O. II. 1.
— — d'orange	92. O. II. 12.
— — pointillé	89. O. II. 7.
Marteau	97. O. IV. 1.
Massue la grande	285. I. I. 3.
— — d'Hercule	286. I. I. 4.
— — lifse	312. I. V. 6.
Mere Perle	108. Q. II. 1.
Mignature	216. F. IV. 6.
Millepied	270. H. I. 6.
Minaret	216. F. IV. 6.
Minime	138. C. II. 6.
Misaine roulée	279. H. III. 5.
Monnoye de Guinée	173. D. IV. 2.
Moresque	201. F. II. 2. A.
Moskat	253. G. VII. 2.
Moule	110. Q. III. 3.
— arborifée	111. Q. III. 4.
— des peintres	11. D. 2.
— de la terre des Papous	114. Q. III. 7.
Mure allongée	302. I. IV. 4.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Muscade	188. E. 8.
Musique	218. F. IV. 10.

<b>N</b> appe d' Italie	131. C. I. 8.
Nassavienne	347. L. II. 2.
Navet	132. C. I. 10.
— a longue queue	312. I. V. 7.
Navette petite	184. E. 2.
Nautile a cloisons	121. B. I.
Nautile papyracé	119. A. I.
— — a carene retrecie	119. A. I. $\alpha$ .
— — a large carene	120. A. I. $\beta$ .
Noix de mer	78. N. IV. 2.

<b>O</b> belisc chinois	328. I. VI. 3.
Oeil de bouc	434. Q. II. 4.
Oeuf	183. E. I.
Olive	198. F. II. 2.
Olive de fatin	201. F. II. 2. $\kappa$ .
— fatinée a bandes	200. F. II. 2. $\zeta$ .

# Französische Benennungen.

	Pag.
Oreille d'ane	272. H. II. 3.
— — —	429. P. 4.
— de Cochon	106. Q. I. 1.
— — —	273. H. II. 4.
— de Geant	352. L. II. 9.
— de Mer, grande	427. P. 1.
— marbrée	428. P. 3.
— friée	428. P. 2.
— de Midas	196. F. I. 1.
— de Venus	408. N. VI. 5.
l'Oublie	188. E. 9.

<b>P</b> agode	351. E. II. 7.
Parasole	436. Q. II. 5.
Patte de Crapaud	290. I. VI. 4.
— — d'Oie	266. H. I. 2.
Peau d'ane	174. D. IV. 4.
— — de Chagrin	144. C. II. 6.
— — de Tigre	167. D. I. 12.
Pelote de beurre	140. C. II. 9.
Pelure d'oignon	102. P. 1.
Perdrix	229. G. I. 2.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Perdrix a grosse levre	230. G. I. 3.
Petoncle sans Oreilles	78. N. I. 1.
Pholade, grande de l'Amerique	8. C. 2.
Picotée	148. C. III. 6.
Pie	358. L. III. 3.
Pigeon couvant	209. F. III. 6.
Pigeonne	279. H. III. 4.
Pince de Chirurgien	24. F. II. 5.
Piquure de Mouche	143. C. II. 13.
Planorbe , grand	382. N. III. 1.
— — terrestre	374. N. II. 1.
Pointillage blanc	175. D. IV. 6.
Poire seche	297. I. III. 8.
Porcellaine etoilée	178. D. IV. 10.
— — marbrée	164. D. I. 12.
Porphyre	197. F. II. 1.
Pou de Baleine	4. B. 4.
— de Mer	179. D. IV. 13.
Poulette	104. P. 6.
Pourpre a bandes	287. I. I. 5.
— — tacheté	288. I. II. 2.
— — triangulaire ailé	287. I. II. 1.
Prune	209. F. III. 5.

# Französische Benennungen.

Pag.

<b>Q</b> uacre rayonné	52. K. II. 12.
Quenotte	420. O. III. 4.
Queue d'Hermine	141. C. II. 12.

<b>R</b> acrocheuse	292. I. III. 1.
Radix	191. E. 13.
— le gros	306. I. IV. 9.
Ratissoir	95. O. III. 2.
Rave	224. F. IV. 16.
Rezeau blanc	57. K. II. 18.
Rhinoceros	296. I. III. 6.
Ruban	193. E. 16.

<b>S</b> abot marbré	331. K. I. 1.
Sandale	431. Q. I. 2.
Scalata, fausse	363. L. IV. 2.
— — vraie	362. L. IV. 1.
Scarabée	103. P. 5.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Scie	42. I. 4.
Scorpion	268. H. I. 4.
Selle de Pologne	101. O. IV. 7.
Soleil levant	15. E. 4.
Sorciere	334. K. I. 5.
Souris	163. D. 10.
Spécère	152. C. IV. 1.

<b>T</b> apis	321. I. V. 19.
Tarriere	192. E. 14.
— blanche et cerclée	145. C. III. 2.
— chagrinée	145. C. III. 1.
Tasse de Neptune	227. F. V. 3.
Taupe	162. D. I. 9.
— rousse	161. D. I. 7.
Telescope	344. K. III. 1.
Telline bariolée de violet & blanc	20. F. I. 5.
— fluviatile	12. D. 3.
— radiée	19. F. I. 3.
— rayée de couleur de chair	20. F. I. 5.

# Französische Benennungen.

	Pag.
Tete de Becasse	283. I. I. 1.
— de Dragon	175. D. IV. 5.
— de Meduse	433. Q. II. 2.
— de Serpent	165. D. II. 2.
— — —	271. H. II. 1.
— — petite	164. D. II. 1.
Tiare episcopale	217. F. IV. 8.
— papale	218. F. IV. 9.
Tigre noir	124. C. I. 1.
Tonne cannelée	228. G. I. 1.
— dentelée	231. G. I. 5.
Tour de Babel	308. I. V. 1.
— de Coppenhague	250. I. VI. 1.
Tourterelle	278. H. III. 3.
Treillis	446. Q. V. 2.
Tricotée	56. K. II. 17.
Tronquée	42. I. 3.
Truitée	168. D. II. 6.
Tulipe	154. C. IV. 3.
Turban rouge	234. G. II. 3.

## NOMENCLATOR GALLICVS.

<b>V</b>	Pag.
erniculaires blanc & trian-	
gulaires	452. S. I.
Verole petite	180. D. IV. 14.
Vieille ridée	45. K. I. 2.
Vilebrequin	455. S. 5.
Vis de pressoir	260. G. VIII. 8.
Vis tigrée	257. G. VIII. 2.
Vitre chinoise	105. P. 7.
Volute panachée	152. C. III. 10.

<b>Z</b> ig - zag	54. K. II. 13.
-------------------	----------------

---

## NOMENCLATOR ANGLICVS.

### Englische Benennungen.

<b>A</b> gathe Chama	51. K. II. 8.
Amber - Oyster, small	103. P. 3.
Amboina scallop, common	83. O. I. 3.
Arabian - shell	62. K. IV. 1.
Arck, spotted	78. N. IV. 1.
— virgin	75. N. III. 1.

Ar-

# Englische Benennungen.

	Pag.
Argus, little Wife of	172. D. IV. 1.
Argus shell	158. D. I. 4.
Argus shell, girdled	293. I. III. 5.
Ass Gowry	171. D. III. 2.
Augur Peg, speckled	192. E. 14.
<b>B</b> abel Shell	308. I. V. 1.
Balanus, great, wide mouthed	4. B. 3.
— — grey, narrow mouthed	3. B. 2.
Barnacle, common english	2. B. 1.
— — tortoise wart	5. B. 5.
Batt Musik stamper, long	219. F. IV. 11.
Beetle Porcelaine	177. D. IV. 9.
Bischops Miter shell	217. F. IV. 8.
Blaaws stamper	126. C. I. 3.
Black - moors - tooth	173. D. IV. 2.
Blobber - lipt	266. H. I. 2.
Bodkin, tooth'd	258. G. VIII. 5.
Brittle Saylor, course	120. A. I. β.
— — — great	119. A. I. α.
Broadlip, horned	172. H. II. 3.

Broad

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Broadlip knobb'd	271. H. II. 1.
Buff Gowry	161. D. I. 7.
Burg's stamper	134. O. II. 3.

<b>C</b> ados Shell, wide	292. I. III. 1.
Cake Shell, thik - lipt	390. N. III. 12.
Caltrup Shell	289. I. II. 3.
Camel - Nerit	425. O. III. 11.
Camp	197. F. II. 1.
— turkische	61. K. III. 6.
Canary, broad knobbed	280. H. III. 6.
— girdled	275. H. II. 7.
— great	278. H. III. 3.
— hunch - bakt	279. H. III. 4.
— long knobbed	280. H. III. 7.
Canoe Shell, smal indian	431. Q. I. 2.
Carpe muscle, deep furowed	113. Q. III. 6.
Caroline muscle	114. Q. III. 7.
Cartagena Gowry	167. D. II. 4.
Ceram Coronet	225. F. V. 1.
Ceram Spuc - Shell	223. F. IV. 13.
Chain stamper, small	146. C. III. 3.

Cha-

# Englische Benennungen.

Pag.

Chama, truncated, smouthed	51. K. II. 9.
— violet and white	41. I. 1.
Cheefe Shell, great, girdled, Brasil	383. N. III. 3.
— great, River	382. N. III. 1.
— Land	374. N. II. 1.
Cheker Cockle, grained	58. K. III. 1.
Chesnut, great	301. I. IV. 2.
Cloudy - Stamper	154. C. IV. 4.
Cockle, with heary streaks	78. N. IV. 2.
Cocquet	302. I. IV. 2.
Conch, large	277. H. III. 2.
Corall scallop	83. O. I. 5.
Couvin	346. L. I. 1.
Cross Cokle	62. K. III. 8.
Crown, papal	218. F. IV. 9.
Crown stamper	125. C. I. 2.
Curry Comb Oyster	106. Q. I. 1.

<b>D</b> evils Claw, female	267. H. I. 3.
Diamond stamper, blak	142. C. II. 12.
Dice Gowry cloudy	250. G. VI. 1.

Dice

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Dice Nerit	410. I. 1.
Dog - tooth Shell	451. R. 4.
Doyer whelk	414. O. I. 4.
Dragon Gowry	175. D. IV. 5.
Dvelwe Fingers	270. H. I. 6.

<b>E</b> ar , hairy	299. I. III. 11.
— white	408. N. VI. 5.
Ear - Shell , great	427. P. 1.
Endive Shell	291. I. II. 4.
Egg Gowry , white	183. E. 1.
Elephan's - tooth	449. R. 1.

<b>F</b> ary stamper	152. C. IV. 1.
Feather Stamper	236. G. II. 6.
Finger Oyster great,	107. Q. I. 2.
Flying Muscle	114. Q. III. 8.
Fortresse	434. Q. II. 3.

# Englische Benennungen.

	Pag.
Furrow pen	261. G. VIII. 9.
Fyg wheelk	190. E. 12.

<b>G</b> arter stamper	132. C. I. 10.
Giants Ear , great	352. L. II. 9.
Goats Ey Limpet	434. Q. II. 4.
Goldbrocade	150. C. III. 8.
Goose Shell	6. B. 6.
Govry saffron toothed	168. D. II. 6.
Saltspekled	166. D. II. 3.
— whit eyed	175. D. IV. 6.
Grain Cockle	32. G. 8.
Grain Girdled stamper	146. C. III. 3.
Grater - scallop	95. O. III. 2.
Green stamper	132. C. I. 9.

<b>H</b> am Muscle , priley	117. R. 3.
Hammer Oyster	79. O. IV. 1.
Harp Shell	246. G. V. 1.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Heart Cockle exotic	28. G. 1.
— — girdled	58. K. III. 2.
— — human	28. G. 2.
Hebrew Gowry , great	156. D. I. 1.
Hogs Ear - Oyster	108. Q. I. 3.
Honez Comb Cockle	127. C. I. 4.
Horfe - hoof	67. M. 3.

St. <b>J</b> ames Cockle	81. O. I. 1.
Indian Dipper	188. E. 8.
Ifabelle Gowry	169. D. II. 7.

<b>K</b> asket, knot-listed	232. G. II. 1.
— — —	233. G. II. 2.
— — final curl'd	241. G. III. 1.
— — smooth, gray	241. G. III. 2.
— — smooth, lipd	242. G. III. 3.
Kasket Shell red	234. G. II. 3.
Knob fingers	268. H. I. 4.
Koffer Shell, final	244. G. IV. 1.

# Englische Benennungen.

Pag.

<b>L</b> eghorn Govry kin, small	185. E. 3.
Leopard, great	167. D. II. 5.
Leopard - stamper, great yellow	140. C. II. 9.
Lighter, twisted	27. N. I. 1.
Limped beaked	
— — craked Barnstable	445. Q. V. 1.
— — thimble	446. Q. V. 2.
— — wart rib'd	448. Q. V. 4.
— — white, rib'd	432. Q. II. 1.
Lohoe broad - lip	274. H. II. 5.
Loufe - Gowry	179. D. IV. 13.

<b>M</b> agos Peg	324. I. VI. 2.
Magpye. top Shell	358. L. III. 3.
Maiden - Muscle	44. K. I. 1.
Mantel scallop ducal	48. O. II. 1.
Map - Shell	158. D. I. 4.
Marble date, purple	200. F. II. 2. 5.
Massle Gowry, long	174. D. IV. 4.
Melon, clouded	226. F. V. 2.
Melon - tun	227. F. V. 3.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Midas Ear	196. F. I. 1.
Monk, gray	137. C. II. 5.
Mulberry Shell	302. I. IV. 4.
Murex blue and white	305. I. IV. 8.
— common, thormey	286. I. I. 4.
— pointed	313. I. V. 8.
Muscle conted	74. N. II. 2.
Musik Shell	218. F. IV. 10.
— oriental	221. F. IV. 12.
— white	221. F. IV. 13.

<b>N</b> ail scallop, wife of	66. M. 2.
Nassau Shell	347. L. II. 2.
Nerit, deep, rig'd	426. O. III. 13.
— red	419. O. III. 1.
— twin girdled	413. O. I. 3.
— white	406. O. I. 6.
Nestors - top, great	351. L. II. 6.
Nipple Gowry - kin, white	185. E. 4.
Noahs Lighter	73. N. II. 1.

# Englische Benennungen.

Pag.

<b>O</b> aker -wood Stamper	140. C. II. 10.
Olive Gowry, freckled	171. D. III. 3.
Olive Shell	198. F. II. 2.
— clouded	202. F. II. 3.
Oren Shell	456. S. 7.
Oxheart Cockle	31. G. 7.
Oxheart Shell, rough	32. G. 9.
Oyster	99. O. IV. 4.
— chinese pelluind	105. P. 7.
— great prikley	64. L. 1.

<b>P</b> aper Nautilus	119. A. 1.
Parement, italian	131. C. I. 8.
Partridge great, spat ribd	231. G. 1. 5.
— indian	229. G. I. 2.
— round	191. E. 13.
— thik lipd	230. G. I. 3.
Pearl Gowry	182. D. IV. 17.
Pearl Oyster	108. Q. II. 1.
— the flat	101. O. IV. 7.

# NOMENCLATOR ANGLICVS,

	Pag.
Pearl river muscle	11. D. 2.
Peg, white snouted	323. I. VI. 1.
Persian Shell	247. G. V. 2.
Pholas, deaeep furrowed	8. C. 2.
Pidak, oblong white	7. C. 1.
Plough	271. H. II. 2.
Poeloroon Nerit.	422. O. III. 7.
Popes Crown, knopped	325. I. VI. 3.
Porcellain, yellow zoned	162. D. I. 9.
Porphyry Shell	151. C. III. 9.
Pot wattering	457. S. 9.
Prince stamper	199. F. II. 2. 8.

<b>R</b> amshorn	122. B. 2.
Razor Shell, blueisch crooked	15. E. 3.
— — little, strait	13. E. 2.
— — thik	13. E. 1.
Rice Gowry	180. D. IV. 14.
River ragged mouth	373. N. I. 1.

# Englische Benennungen

	Pag.
Sail Shell thik	121. B. I.
Sandtamper	143. C. II. 13.
Saylor, course brittle	120. A. I. $\beta$ .
— great brittle	119. A. I. $\alpha$ .
Scallop, litte yellow	84. O. II. 1.
— thin	82. O. I. 4.
Sea Ear, long	429. P. 4.
Seeren Shell, rough	326. I. VI. 1.
Silver Gowry kin, blakspekled	208. F. III. 4.
Silvermouth	348. L. II. 3.
— — spotted	858. L. III. 4.
Snail, echinated	360. L. III. 6.
— golden mouthed	349. L. II. 4.
Snailshell, smouth girdled	384. N. III. 4.
Snake Gowry, small	164. D. II. 1.
Snippe, thorney	285. I. I. 3.
Solen, thik, red	16. E. 5.
— violet purple, papyraceons	15. E. 4.
Spider Shell	269. H. I. 5.
Spindle Shell	310. I. V. 3.
Spinnet Shell	333. K. I. 3.
Spur Shell	351. L. II. 7.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Spur Shell small	300. I. IV. 1.
Stair Cafe, royal	362. L. IV. 1.
— — small	363. L. IV. 2.
Stamper, net lifted	129. C. I. 5.
Starkake, wrinkled	4. B. 4.
Star Gowry	178. D. IV. 10.
Strawberry heart Cockle	30. G. 5.
— — red	33. G. 10.
Stone piercer	109. Q. III. 1.
Stone whelk	196. I. III. 6.

<b>T</b> abby Stamper	148. C. III. 6.
Tellin, rayed	19. F. I. 3.
Thik-top	339. K. II. 3.
Top, great waved	331. K. I. 1.
Tooth Shell, striated	449. R. 2.
Tourtlet Govry, great	159. D. I. 5.
—— Leopard great	165. D. II. 2.
Tree Oyster	97. O. IV. 2.
Tritons Trumpet	316. I. V. 12.

# Englische Benennungen.

	Pag.
Trochus , prikley	350. L. II. 5.
Trumpet - knobbed	294. I. III. 3.
Tullip tellina	23. F. II. 4.
Tulip Shell	154. C. IV. 4.
Tyger Shell	124. C. I. 1.
Tygershorn brownn	257. G. VIII. 2.
Tygerstamper	149. C. III. 7.
Tyger tooth	256. G. VIII. 1.

<b>V</b> elk Nerit	415. O. I. 5.
--------------------	---------------

<b>W</b> art Gowry	182. D. IV. 16.
Wax Stamper	130. C. I. 7.
Wedge Muscle	24. F. II. 4.
Whelk	254. G. VII. 3.
— common english	315. I. V. 11.
— great net	279. H. III. 4.
— heary	297. I. III. 8.
— least ragged	290. I. II. 4.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Whelk persian	235. G. II. 4.
— small laticed	254. G. VII. 4.
— small prikled	304. I. IV. 7.
— small rough	252. G. VII. 1.
— spiked	276. H. III. 1.
Whirligig, Indian	344. K. III. 1.
Woman, old	45. K. I. 2.
Woodcock Shell	283. I. 1.
— — thorney	284. I. I. 2.

<b>Z</b> igzag Chama	53. K. II. 12.
----------------------	----------------

---

W I E N ,  
gedruckt bei Joseph Gerold, kais. Reichshof-  
rath's- und Universitätsbuchdruckern.

I 7 7 8.

# E R R A T A.

Pag.

21. F. I. 6. Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.  
 21. F. I. 6. ——— VI. 11. t. 2. f.  
 23. F. II. 4. ——— II. 19. t.  
 23. F. II. 4. ——— IV. 2. t; 24. f.  
 24. F. II. 5. ——— II. 2. t.  
 26. F. III. 1. Litt. H. C. 1. 2.  
 26. F. III. 2. mondförmigen  
 27. F. III. 3. Litt. H. C. 1. 2.  
 29. G. 2. Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.  
 42. I. 3. Das Stümpchen  
 42. 1. 5. Donax  
 42. 1. 5. Knor. Vergn. V.  
 50. K. II. 7. ——— II.  
 54. K. II. 12. ——— I. 21. t. 4. f.  
 54. K. II. 13. Zigzag  
 63. L. dicke Zähne, zwischen eine Grube  
 71. M. 8. verlängerte Schale  
 75. N. II. 2. Knor. Vergn. II. 27. t.  
 90. O. III. 9.  
 90. O. III. 4. Ostrea  
 101. O. IV. 7. gattgedrückte  
 133. C. II. 7. breite euförmige  
 158. D. I. 4. Grand Argus  
 160. D. I. 6. Lian S. N. Sp. 320.  
 174. D. IV. 3. Knor. Vergn. II. 9. t.  
 188. E. 9. verkehrt euförmige  
 203. F. II. 4. fchief gefpaltene  
 204. F. II. 4. γ. lang mit braunen  
 204. F. II. 4. δ. Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.  
 209. Knor. Vergn. IV. 21. t. 3. 4. f.  
 215. F. IV. 5. longitudinalibus  
 221. D. Hebraique  
 224. F. IV. 16. β. Knor. Vergn. VI. 22. 2. f.  
 227. F. V. 2. Knor. Vergn. V. 28. t. 1. f.  
 233. G. II. 7. ——— III. 8. n. 2. f.  
 276. H. III. 1. tuberculato  
 283. I. I. 1. the comonon  
 309. I. V. 1. Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.  
 312. I. V. 5. ——— Pl. 10. f. A.  
 319. I. V. 16. ——— Pl. 13. f. K.  
 328. I. VI. 7. ——— Pl. 11. f. L.  
 328. I. VI. 7. Obelisc chinois  
 328. I. VI. 7. β. ex fusco luteo  
 333. K. I. 3. Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.  
 334. K. I. 4. ——— Pl. 11. f. L. Q.

corrige


- II. 20. t. 5. f.  
 V. 11. t. 2. f.  
 1; 19. t.  
 IV. 2. t. 4. f.  
 IV. 2. t.  
 Litt. H. C. 1. 3.  
 mondförmigen  
 Litt. H. C. 1. 3.  
 I. 18. t. 3. f.  
 Das Stümpchen.  
 Donax.  
 Knor. Vergn. VI.  
 ——— VI.  
 ——— I. 21. t. 5. f.  
 Zigzag.  
 dicke Zähne, und dazwi-  
 schen eine Grube.  
 verlängerte Schale.  
 II. 2. t.  
 O. II. 9.  
 Ostrea.  
 platgedrückte.  
 nezförmige.  
 Grand Argus.  
 S. N. Sp. 330.  
 IV. 9. t.  
 fast euförmige  
 fchief gefaltene.  
 weiß mit braunen  
 VI. 34. t. 4. 5. f.  
 IV. 21. t. 3. f.  
 longitudinaliter.  
 L'hebraique.  
 VI. 27. t. 2. f.  
 V. 28. t. 2. f.  
 III. 8. t. 2. f.  
 tuberculata.  
 the common.  
 Pl. 9. f. M.  
 Pl. 9. f. A.  
 Pl. 10. f. K.  
 Pl. 11. f. α.  
 Obelisc chinois.  
 ex fusco lutea.  
 Pl. 8. f. M.  
 Pl. 8. f. L. Q.

334. K. I. 5. le Sorciere  
 335. K. I. 5. Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.  
 343. K. II. 9. Turbo crocatus  
 348. Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.  
 349. L. 4. Schale hot  
 351. L. II. 6 ist mit auf den Gewinden  
 351. L. II. 7 blattgedrückten  
 352. L. II. 7 Knor. Vergn. III. 20 t. 1. f.  
 352. L. II. 8. gestreifte Schale hat  
 354. L. II. 10. convexo nodosa obtusa  
 365. L. IV. 4. Berl Mag. IV 2. t. 3. f.  
 376. N. II 5. Knor. Vergn. VI, 26. t.  
 380. N. II. 12. Helix maculata  
 381. N. III. 2 gelblicher Schale  
 403. N. V 3. Helix plicata  
 425. O. III. 11. Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.  
 449. R. I. Knor. Vergn. I. 19. t.  
 458. Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.

la Sorciere.  
 Pl. 8. f. S.  
 Trochus crocatus.  
 I 3. t. 4.  
 Schale ist  
 ist auf den Gewinden.  
 platgedrückten.  
 IV. 4 t. 2. f.  
 gestreifte Schale ist.  
 convexa obtusa.  
 omittatur.  
 V. 26 t.  
 Helix maculosa.  
 gelblicher Farbe.  
 Helix plicaria.  
 omittatur.  
 29. t.  
 IV. 28. t. 1. f.


















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00317970 2

nhmoll QL406.B73

Index rerum naturalium Musei Caesarei Vi